

발 간 등 록 번 호

11-1352477-000183-10

ISSN 2092-271X
통계승인번호 제 117075호


2008-2018

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

“11년 간 우리 지역사회 건강 기록”

지역사회 건강통계

인천광역시 연수구



Community
Health Survey



발간사



안녕하십니까, 연수구보건소장 노순호입니다.

인천광역시 연수구의 ‘2018년 지역사회건강조사’ 사업을 성공적으로 마무리하고 우리지역의 건강통계집을 발간하게 된 것을 연수구민과 함께 진심으로 기쁘게 생각합니다.

2008년 지역사회건강조사를 처음 시작으로 해마다 지역사회건강조사를 실시하여 11번째 발행된 통계자료는 지역주민의 건강인식의 변화와 건강관리 행태 변화를 확인 해 볼 수 있는 귀한 자료로 쓰일 것입니다. 이 자료를 통해 향후 추진되는 주민건강을 위한 보건사업의 수행방향과 비전을 제시함으로써 우리 구 주민 건강특성에 맞는 보건사업을 추진할 수 있는 밑거름이 될 것으로 보여집니다.

지역사회건강조사 결과를 기초로 2019년에도 우리 구는 주민눈높이에 맞는 프로그램 제공과 더불어 유관기관과의 네트워크 구축을 통하여 지역사회 건강 체계 구축 및 건강도시 연수구 이미지 제고를 위해 앞으로 나아가고자 합니다.

아울러, 그동안 연수구 지역사회건강조사 건강통계집 발간을 위하여 수고해 주신 가천대학교 교수님 및 관계자 여러분, 충실히 조사를 수행하여 주신 조사 요원들, 방문 면접조사에 성실하게 응해주신 연수구민 여러분께 깊은 감사를 드립니다.

항상 건강하시고 행복하시기 바랍니다. 감사합니다.

2019. 3.

연수구보건소장 노 순 호

발간에 즈음하여

인천광역시 연수구 ‘2018년도 지역사회건강조사’ 사업을 성공적으로 마치고 건강통계집을 발간하게 되어 기쁘게 생각합니다. 그동안 사명감을 가지고 지역사회건강조사 사업에 헌신적인 노력을 해 온 모든 조사원들에게 먼저 감사 인사를 드립니다. 인천광역시 연수구보건소의 노순호 소장님과 이영숙, 김재욱, 이경희 팀장님, 가천대학교 이진영 연구원에게도 감사 인사를 드립니다.

특히 지역사회건강조사의 수준을 높이기 위해 끊임없는 노력으로 애써주시는 질병관리본부 만성질환관리과와 관계자 여러분에게도 감사의 마음을 전합니다. 무엇보다 시민들의 자발적인 협조와 참여가 없었다면 조사는 불가능했을 것입니다. 인천광역시 연수구민 여러분에게 진심으로 감사드립니다.



2008년부터 시작된 지역사회건강조사는 시군구 등 기초자치단체 단위에서 실시되는 국내 유일의 건강조사 사업입니다.

지역사회건강조사 사업을 통하여 보건소는 지역주민의 건강수준 및 건강위험 요인에 대한 객관적이고 신뢰성이 있는 근거 자료를 확보할 수 있게 되었습니다. 이러한 근거에 기초하여 지역보건의료계획을 수립하고 지역보건의료 정책 및 사업을 추진하며 지역보건사업을 평가하는 데에 지역사회건강조사 결과가 유용한 자료로 활용되고 있습니다. 이러한 기초 정보가 잘 구축되었을 때에 지역격차 해소와 지역사회가 안고 있는 건강 문제를 잘 인식하고 좀 더 나은 방향으로 정책과 사업을 추진할 수 있다는 점에서 초심을 잃지 않고 지역사회건강조사 사업을 더 알차게 수행해야 합니다.

앞으로 지역사회건강조사 사업이 지역사회 보건을 위해 더욱 더 큰 결실을 맺고 소중한 사업으로 거듭나기를 기원하며 발간사를 마무리하고자 합니다. 감사합니다.

2019. 3.

가천대학교 의과대학 책임교수 고 광 필

이용자를 위하여

- ❖ 본 통계집은 2018. 8. 16. - 2018. 10. 31. 인천광역시 연수구에서 실시된 지역사회건강조사 결과를 수록한 자료입니다.
- ❖ 본 통계집에 제시된 추정치는 가중치를 적용한 결과(조율)이며, 가중치는 가구추출률, 조사적격 가구율, 주택유형별 가구비율, 개인응답률, 당해 연도 모집단 성·연령별 인구 구성비를 반영하여 산출하였습니다.
- ❖ 2부 주요통계결과에서 2008-2018년 비교 가능한 지표에 대해서 당해 연도의 전체·성·연령별 그래프와 함께 연수구 및 인천광역시의 연도별 추이 그래프를 제시하였으며, 지표비교 시, 오차막대가 겹치지 않는 경우에 한해 증감 현황을 기술하였습니다. 2차년도 이하의 조사지표의 경우에는 당해 연도의 전체·성·연령별 그래프를 제시하였습니다.
- ❖ 제3부 통계표에서는 당해 연도에 선정된 주요지표의 상세분석결과를 제시하였으며, 주요지표를 포함한 모든 산출지표의 통계표는 엑셀파일 형태로 지역사회건강조사 홈페이지(<http://chs.cdc.go.kr>) 자료실에서 다운로드 받으실 수 있습니다.
- ❖ 본 자료 중 2008-2017년 수치는 응답의 이상치와 논리적 오류를 수정하여 산출된 결과로 기 발간된 보고서의 수치와 일부 다를 수 있습니다.
- ❖ 분석대상자 수(N)가 20명 미만인 경우 제2부 주요통계결과에서 제시하지 않았으며 제3부 통계표에서 해당 값을 하이픈(-)으로 처리하였습니다. 변동계수(또는 상대표준오차, Coefficient of Variation, CV)가 30%이상인 경우 추정치의 신뢰도가 낮다는 것을 의미하므로, 변동계수가 30% 이상인 경우에 결과해석 시 주의를 바랍니다.
- ❖ 통계표에 수록된 숫자는 소수점 두 번째 자리에서 반올림되었으며, 반올림된 수치의 총계가 일치하지 않을 수 있으나 이는 통계표의 오류가 아닙니다.
- ❖ 본 통계집 및 조사표, 지침서 등 기타 지역사회건강조사 관련 자료는 지역사회건강조사 홈페이지 「자료실」에서 다운로드 받으실 수 있으며, 2008년부터 2017년까지의 지역사회건강조사 원시자료는 홈페이지를 통한 신청 및 승인절차를 통해 제공하고 있습니다.
- ❖ 수록된 자료 및 지역사회건강조사에 관한 문의는 연수구보건소(☎032-749-8141), 가천대학교(☎032-458-2605)로 해주시기 바랍니다.

용어정의

1 통계

 지역사회건강조사
Community Health Survey

① 모집단(Population)

조사대상이 되는 집단 전체

② 표본(Sample)

모집단 중 조사를 위해 추출된 일부 집단

③ 표본오차(Sampling Error)

모집단 중 일부를 표본으로 선정하여 조사함에 따라 발생하는 오차로서 표본조사의 정확성을 나타내는 척도

④ 비표본오차(Non-Sampling Error)

표본추출을 제외한 조사 설계, 조사 수행, 자료 집계 및 분석 과정에서 발생하는 오차로서 불명확한 조사개념, 조사문항의 객관성 결여, 조사지 구성의 논리적 오류, 면접방법, 조사원의 자질, 조사원을 감독하는 관리자의 태도, 조사대상자의 무응답, 자료 코딩 등이 비표본오차의 주요 발생 원인에 해당

⑤ 조율(Crude Rate)

총 발생건수를 전체 모집단으로 나눈 값으로, 모집단의 성·연령별 등의 인구 집단 특성을 보정하지 않은 통계치

⑥ 표준화율(Standardized Rate)

비교하고자 하는 집단 간 인구 구조 차이를 보정한 통계치



⑦ 표준오차 (Standard Error, SE)

각 표본들의 평균이 모집단의 평균과 얼마만큼의 차이가 있는지 나타내는 값

⑧ 변동계수 (Coefficient of Variation, CV)

표준오차를 평균으로 나눈 값(표준오차/추정치 $\times 100$)으로 통계치의 신뢰도를 나타내는 척도이며, 변동계수와 통계치의 신뢰도는 반비례 관계

⑨ 가중치 (Weight)

전체집단에서 개별 구성요소가 차지하는 비중이나 중요도를 수치로 나타내는 값

2 조사

 지역사회건강조사
Community Health Survey

① CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing)

컴퓨터를 이용하여 조사 자료를 수집하는 방식으로, 조사원이 전자조사표가 설치된 노트북으로 면접조사를 수행 시, 조사현장에서 직접 자료입력, 수정, 저장 및 전송 가능

② 순환조사체계

타당도, 활용성 및 수행 가능성을 고려하여 조사항목의 조사주기를 1년, 2년, 4년으로 구분하여 조사하는 체계

③ 지표뱅크

지역사회에서 보건사업 추진 시 활용 가능한 조사문항 및 산출지표를 수집·정리한 것으로 지표별 조사문항 및 응답보기, 지표정의, 산출식, 조사주기 등 상세정보 포함

CONTENTS

발간사	
발간에 즈음하여	
이용자를 위하여	
용어정의	
2018년 인천광역시 연수구 주요 건강지표 요약	2
우리 지역사회의 주요 건강이슈	4

제1부 조사체계

I. 조사개요	11
1. 조사목적	12
2. 조사방법	12
3. 조사내용	12
4. 표본설계	14
5. 조사체계	15
6. 자료관리	15
7. 조사현황	16
II. 통계 추정방법	19
1. 가중치의 사용	20
2. 자료처리	21
3. 분산추정	22

제2부 주요통계결과

I. 건강행태	25
1. 흡연	26
2. 음주	34
3. 안전의식	36
4. 신체활동	40
5. 식생활	42
6. 비만 및 체중조절	44
7. 구강건강	48
8. 정신건강	54
II. 예방접종	57
1. 예방접종	58
III. 이환 및 의료이용	61
1. 주요 질환별 평생 의사진단 경험률 및 관리행태	62
2. 의료이용	74
IV. 사고 및 중독	77
1. 연간 사고중독 경험률	78

Community Health Survey

V. 활동제한 및 삶의 질 81

1. 양호한 주관적 건강수준 인지율 82

VI. 보건기관 이용 85

1. 보건기관 이용 86

VII. 심폐소생술 89

1. 심폐소생술 인지율 90

2. 심폐소생술 교육경험률 90

VIII. 가구조사 93

1. 식품 안정성 확보율 94

2. 치매환자 가족 가구율 94

제3부 통계표

I. 통계표 99

제4부 부록

I. 개인조사표 213

II. 가구조사표 247

III. 지표정의 253

IV. 2008-2018 산출지표 285

참고문헌 296

참여연구진 297

CONTENTS

〈표목차〉

〈표 1〉 2018년 지역사회건강조사 주요지표 결과	2
〈표 2〉 황금 다이아몬드에 의한 우선순위 분석 결과(조율 비교)	7
〈표 3〉 2018년 전국공통 조사항목	13
〈표 4〉 2018년 인천 지역선택 조사항목	13
〈표 5〉 동별 표본지점 분포	14
〈표 6〉 조사현황	16
〈표 7〉 가구당 조사인원 수	16
〈표 8〉 2018년 지역사회건강조사 조사대상 가구특성	17
〈표 9〉 2018년 지역사회건강조사 조사대상 인구특성	18
〈표 10〉 가구기증치 산출 예	20
〈표 11〉 개인기증치 산출 예	21
〈표 12〉 보장기증치 산출 예	21
〈표 13〉 교육수준분류	21
〈표 14〉 직업분류	22

Community Health Survey

〈그림목차〉

〈그림 1〉 인천 연수구와 인천광역시 및 전국의 상대적 비교(1) (건강행태 및 삶의 질) ····· 4	〈그림 29〉 저염식 실천 노력 경험률 ····· 43
〈그림 2〉 인천 연수구와 인천광역시 및 전국의 상대적 비교(2) ····· 5	〈그림 30〉 비만을(자기보고) ····· 45
〈그림 3〉 주요 지표의 우선순위 결정을 위한 “황금 다이아몬드(golden diamond)” ····· 6	〈그림 31〉 비만을(신체계측) ····· 45
〈그림 4〉 표본선정과정 ····· 14	〈그림 32〉 주관적 비만인지를 ····· 45
〈그림 5〉 수행체계 ····· 15	〈그림 33〉 연간 체중조절 시도율 ····· 47
〈그림 6〉 수행과정 ····· 15	〈그림 34〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율 ····· 49
〈그림 7〉 전화점검 절차 ····· 16	〈그림 35〉 저작불편호소율(≥65) ····· 49
〈그림 8〉 가중치 산출 과정 ····· 20	〈그림 36〉 어제 아침식사 후 칫솔질 실천율 ····· 51
〈그림 9〉 현재흡연율 ····· 27	〈그림 37〉 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율 ····· 51
〈그림 10〉 남자현재흡연율 ····· 27	〈그림 38〉 어제 저녁식사 후 칫솔질 실천율 ····· 51
〈그림 11〉 매일 흡연자의 하루 평균 흡연량 ····· 27	〈그림 39〉 어제 잠자기 전 칫솔질 실천율 ····· 53
〈그림 12〉 현재흡연자의 금연시도율 ····· 29	〈그림 40〉 연간 미충족의료율(치과) ····· 53
〈그림 13〉 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률 ····· 29	〈그림 41〉 스트레스 인지를 ····· 55
〈그림 14〉 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률 · 31	〈그림 42〉 우울감 경험률 ····· 55
〈그림 15〉 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률 31	〈그림 43〉 평생 치매선별검사 수검율(≥60) ····· 55
〈그림 16〉 현재비흡연자의 공공장소 간접흡연 노출률 31	〈그림 44〉 연간 인플루엔자 예방접종률 ····· 59
〈그림 17〉 효과적인 금연프로그램 ····· 33	〈그림 45〉 고혈압 진단 경험률(≥30) ····· 63
〈그림 18〉 월간 음주율 ····· 35	〈그림 46〉 고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30) ····· 63
〈그림 19〉 연간음주자의 고위험 음주율 ····· 35	〈그림 47〉 고혈압 관리교육 이수율(≥30) ····· 65
〈그림 20〉 연간 음주폐해 경험률 ····· 35	〈그림 48〉 고혈압 관리교육 장소 선호도 ····· 65
〈그림 21〉 운전 시 안전벨트 착용률 ····· 37	〈그림 49〉 당뇨병 진단 경험률(≥30) ····· 67
〈그림 22〉 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률 ····· 37	〈그림 50〉 당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥30) ····· 67
〈그림 23〉 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률 ····· 37	〈그림 51〉 당뇨병 관리교육 이수율(≥30) ····· 67
〈그림 24〉 연간음주운전 경험률 (자동차 또는 오토바이) ····· 39	〈그림 52〉 연간 당뇨병성 안질환 합병증 검사 (안저검사) 수진율(≥30) ····· 69
〈그림 25〉 걷기 실천율 ····· 41	〈그림 53〉 연간 당뇨병성 신장질환 합병증 검사 (미세단백뇨검사) 수진율(≥30) ····· 69
〈그림 26〉 지역사회 내 운동시설 접근율 ····· 41	〈그림 54〉 대사증후군 인지를 ····· 71
〈그림 27〉 아침결식 예방연구비율 ····· 43	〈그림 55〉 심뇌혈관질환 인지를 ····· 73
〈그림 28〉 영양표시 활용률 ····· 43	〈그림 56〉 심뇌혈관질환 예방생활수칙 인지를 ····· 73
	〈그림 57〉 심뇌혈관질환 예방생활수칙 매체 경험률 · 73
	〈그림 58〉 연간 미충족의료율 ····· 75

CONTENTS

〈그림목차〉

〈그림 59〉 연간 사고중독 경험률	79
〈그림 60〉 양호한 주관적 건강수준 인지율	83
〈그림 61〉 연간 보건기관 이용률	87
〈그림 62〉 심폐소생술 인지율	91
〈그림 63〉 심폐소생술 교육경험률	91
〈그림 64〉 식품 안정성 확보율	95
〈그림 65〉 차매환자 가족 가구율	95

Community Health Survey

〈통계표목차〉

〈표 15〉 평생흡연을	100	〈표 46〉 연간 음주운전차량 동승경험률	131
〈표 16〉 흡연시작연령	101	〈표 47〉 자전거 헬멧 착용률	132
〈표 17〉 현재흡연을	102	〈표 48〉 연간 자전거 음주운전 경험률	133
〈표 18〉 매일흡연자의 하루 평균 흡연량	103	〈표 49〉 걸기 실천율	134
〈표 19〉 과거 흡연자의 금연기간	104	〈표 50〉 지역사회 내 운동시설 접근율	135
〈표 20〉 현재흡연자의 금연시도를	105	〈표 51〉 월간 규칙적 운동실천율	136
〈표 21〉 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률	106	〈표 52〉 아침식사빈도 및 아침결식예방 인구비율	137
〈표 22〉 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률	107	〈표 53〉 영양표시 인지율	138
〈표 23〉 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률	108	〈표 54〉 영양표시 독해율	139
〈표 24〉 평생 전자담배 사용 경험률	109	〈표 55〉 영양표시 활용률	139
〈표 25〉 현재 전자담배 사용 경험률	110	〈표 56〉 저염식 실천 노력 경험률	140
〈표 26〉 평생 다른담배 사용 경험률	111	〈표 57〉 비만도 분포 및 비만율(자가보고)	141
〈표 27〉 현재 다른담배 사용 경험률	112	〈표 58〉 남자 비만도 분포 및 비만율(자가보고)	142
〈표 28〉 현재흡연자 중 금연시도자의 금연행법	113	〈표 59〉 여자 비만도 분포 및 비만율(자가보고)	143
〈표 29〉 연간 금연시도 횟수	114	〈표 60〉 주관적 비만인지율	144
〈표 30〉 현재비흡연자의 공공장소 간접흡연 노출률	115	〈표 61〉 연간 체중조절 시도율	145
〈표 31〉 금연구역 인지율	116	〈표 62〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율	146
〈표 32〉 효과적인 금연 프로그램	117	〈표 63〉 자작불편호소율(65세 이상)	147
〈표 33〉 금연정책 강화 필요 영역	118	〈표 64〉 어제 하루 치솔질 실천율	148
〈표 34〉 평생음주율	119	〈표 65〉 연간 미충족의료율(치과)	149
〈표 35〉 연간음주율	120	〈표 66〉 미충족의료 이유(치과)	150
〈표 36〉 월간음주율	121	〈표 67〉 틀니 이용 행태(50세 이상)	151
〈표 37〉 연간음주자의 고위험음주율	122	〈표 68〉 주관적 틀니 필요인지율(50세 이상)	152
〈표 38〉 전체 고위험음주율	123	〈표 69〉 하루 평균 수면시간	153
〈표 39〉 연간 절주 또는 금주시도를	124	〈표 70〉 스트레스 인지율	154
〈표 40〉 연간 음주폐해 경험률	125	〈표 71〉 우울감 경험률	155
〈표 41〉 운전자석 안전벨트 착용률	126	〈표 72〉 스트레스 및 우울증상으로 인한 정신상담률	156
〈표 42〉 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률	127	〈표 73〉 우울증상유병률	157
〈표 43〉 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률	128	〈표 74〉 우울증상 경험자의 정신문제 상담경험률	158
〈표 44〉 버스 안전벨트 착용률	129	〈표 75〉 치매 상담콜센터 인지율	159
〈표 45〉 연간 음주운전 경험률 (자동차 또는 오토바이)	130	〈표 76〉 치매 상담콜센터 이용률	160

CONTENTS

〈통계표목차〉

〈표 77〉 치매 상담콜센터 미이용 이유	161	〈표 100〉 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지를	183
〈표 78〉 인지장애 경험률(≥50)	162	〈표 101〉 뇌졸중(중풍) 증상 대처 방법	184
〈표 79〉 인지장애로 인한 지장 및 도움(≥50)	163	〈표 102〉 심근경색증 조기증상 인지를	185
〈표 80〉 인지장애 상담률(≥50)	164	〈표 103〉 심근경색증 증상 대처 방법	186
〈표 81〉 연간 치매선별검사 수진율	165	〈표 104〉 심뇌혈관질환 인지를	187
〈표 82〉 연간 치매선별검사 장소	166	〈표 105〉 심뇌혈관질환 예방생활수칙 인지를	188
〈표 83〉 스트레스 원인	167	〈표 106〉 심뇌혈관질환 예방생활수칙 매체경험률 ..	189
〈표 84〉 우울감 원인	168	〈표 107〉 대사증후군 인지를	190
〈표 85〉 평생 치매 선별검사 수진율(≥60)	169	〈표 108〉 연간 미충족의료를	191
〈표 86〉 연간 인플루엔자 예방접종률	170	〈표 109〉 미충족의료 이유	192
〈표 87〉 혈압 및 혈당수치 인지를	171	〈표 110〉 연간 사고 및 중독 경험률	193
〈표 88〉 본인 인지 혈압 및 혈당조절률	172	〈표 111〉 연간 사고 및 중독 건수를	194
〈표 89〉 고혈압 최초 진단 시기	173	〈표 112〉 양호한 주관적 건강수준 인지를	195
〈표 90〉 고혈압 진단 경험률 및 현재치료를, 진단 경험자의 치료율	174	〈표 113〉 삶의 질 지수(EQ-50 Index)	196
〈표 91〉 고혈압 관리교육 장소 선호도	175	〈표 114〉 행복감지수	197
〈표 92〉 당뇨병 최초 진단 시기	176	〈표 115〉 연간 보건기관 이용률	198
〈표 93〉 당뇨병 진단 경험률 및 현재치료를, 진단 경험자의 치료율	177	〈표 116〉 현재 체감 환경	199
〈표 94〉 당뇨병 약물치료 방법	178	〈표 117〉 심폐소생술 인지를	203
〈표 95〉 당화혈색소 인지를	179	〈표 118〉 심폐소생술 교육경험률	204
〈표 96〉 연간 당화혈색소 검사 횟수	180	〈표 119〉 심폐소생술 시행능력률	205
〈표 97〉 연간 당뇨성 안질환 합병증검사(안저검사) 수진율 및 연간 당뇨성 신장질환 합병증검사(미세단백뇨검사) 수진율	181	〈표 120〉 식품 안전성 확보율	206
〈표 98〉 고혈압 관리교육 장소 및 고혈압 관리교육 이수율	182	〈표 121〉 (가구)치매환자 가족 가구율 및 동거가구율	207
〈표 99〉 당뇨병 관리교육 장소 및 당뇨병 관리교육 이수율	182	〈표 122〉 비만도 분포 및 비만율(실제계측)	208
		〈표 123〉 남자 비만도 분포 및 비만율(실제계측) ..	209
		〈표 124〉 여자 비만도 분포 및 비만율(실제계측) ..	210



요약

CHS

Community Health Survey

2018년 인천광역시 연수구 주요 건강지표 요약

2018년 인천광역시 연수구 지역사회건강조사의 주요지표 결과는 <표 1>과 같다.

<표 1> 2018년 지역사회건강조사 주요지표 결과

(단위 : %, 조율(표준오차))

분류	영역	산출지표	인천광역시 연수구											인천광역시
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
I. 건강 행태	흡연	현재흡연율	24.3 (1.4)	25.6 (1.4)	25.6 (1.6)	22.2 (1.5)	24.7 (1.5)	21.0 (1.5)	20.4 (1.4)	21.8 (1.7)	21.6 (1.4)	17.0 (1.5)	18.6 (1.3)	22.3 (0.6)
		남자 현재흡연율	47.1 (3.0)	49.5 (2.3)	47.0 (2.7)	42.0 (2.5)	44.9 (2.9)	39.7 (2.5)	36.6 (2.4)	40.1 (2.9)	39.4 (2.4)	30.5 (2.4)	33.8 (2.3)	39.8 (1.0)
		현재흡연자의 1개월 내 금연계획률 ¹⁾	22.0 (3.3)	29.7 (3.3)	7.5 (2.1)	8.1 (1.8)	7.2 (1.9)	11.6 (2.7)	8.5 (2.1)	10.8 (2.4)	3.6 (1.4)	12.3 (2.7)	4.4 (1.5)	5.3 (0.6)
		현재흡연자의 금연시도율 ¹⁾	47.5 (3.5)	46.0 (3.8)	45.2 (3.9)	40.0 (3.8)	36.5 (3.7)	31.4 (3.5)	39.5 (4.8)	47.7 (4.0)	37.4 (4.0)	40.4 (4.1)	30.2 (3.4)	28.1 (1.2)
		현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률 ²⁾	—***	—***	—***	—***	—***	—***	8.5 (1.1)	5.5 (1.1)	2.7 (0.7)	1.9 (0.5)	4.5 (0.9)	3.7 (0.3)
		현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률 ²⁾	—***	—***	—***	—***	—***	—***	34.2 (2.6)	28.5 (2.1)	22.0 (2.2)	21.2 (1.9)	21.4 (1.7)	20.9 (0.8)
	음주	월간음주율	53.5 (2.0)	49.9 (2.2)	61.4 (1.8)	59.6 (1.9)	60.3 (1.7)	59.5 (2.1)	65.1 (1.6)	61.6 (2.0)	61.9 (1.9)	63.8 (1.5)	65.9 (1.6)	61.1 (0.7)
		고위험음주율	21.2 (1.8)	15.7 (1.5)	18.2 (1.6)	23.0 (1.7)	18.0 (1.7)	17.9 (1.6)	18.8 (1.4)	18.5 (1.4)	21.6 (1.8)	19.8 (1.6)	19.8 (1.5)	19.4 (0.7)
	안전 의식	운전자석 안전벨트 착용률	90.7 (1.4)	92.3 (1.7)	85.7 (1.6)	90.4 (1.5)	88.1 (1.7)	83.8 (2.0)	89.4 (1.4)	89.4 (1.6)	93.0 (1.1)	91.2 (1.3)	93.6 (1.0)	91.9 (0.5)
		동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률	87.0 (1.6)	74.6 (2.7)	77.7 (2.2)	83.4 (1.5)	81.1 (1.9)	77.6 (2.0)	74.7 (1.7)	78.0 (1.7)	81.7 (1.5)	83.6 (1.5)	89.6 (1.2)	87.9 (0.5)
	신체 활동	걷기 실천율	41.6 (1.7)	51.1 (2.1)	35.0 (1.8)	40.3 (1.9)	45.0 (2.0)	45.3 (1.7)	49.7 (2.0)	41.5 (1.7)	43.3 (2.2)	41.5 (1.7)	52.1 (1.9)	51.8 (0.7)
	비만 및 체중 조절	비만율(자가보고)	21.8 (1.5)	21.9 (1.5)	24.4 (1.6)	25.1 (1.8)	23.1 (1.6)	25.2 (1.6)	26.0 (1.6)	28.2 (1.6)	26.7 (1.4)	28.6 (1.7)	30.3 (1.5)	32.0 (0.6)
		주관적 비만인식율	30.9 (1.6)	33.1 (1.6)	39.8 (1.9)	40.6 (1.6)	39.3 (1.7)	43.7 (1.8)	42.9 (1.6)	43.4 (1.5)	42.1 (2.0)	44.7 (1.7)	45.2 (1.9)	44.0 (0.7)
		체중조절 시도율	47.2 (2.0)	51.8 (2.3)	59.7 (1.8)	71.8 (1.4)	60.6 (1.8)	72.2 (1.6)	68.4 (1.6)	64.6 (1.5)	64.5 (1.9)	68.5 (1.6)	64.8 (1.6)	62.1 (0.7)
	구강 건강	저작불편호소율(≥65)	42.8 (5.7)	34.5 (5.1)	43.8 (6.7)	40.1 (4.2)	42.0 (5.8)	41.2 (5.8)	50.7 (4.4)	31.3 (5.0)	50.0 (5.1)	31.0 (4.0)	28.6 (4.9)	38.6 (1.2)

분류	영역	산출지표	인천광역시 연수구											인천광역시
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	정신 건강	스트레스 인지율	29.7 (1.8)	33.2 (1.9)	29.4 (1.7)	27.4 (1.5)	30.9 (1.7)	31.9 (1.9)	30.2 (1.7)	32.0 (1.8)	27.1 (1.6)	24.6 (1.5)	29.3 (1.6)	30.4 (0.7)
II. 예방접종 및 검진		연간 인플루엔자 예방접종률	29.4 (1.8)	24.3 (1.3)	29.1 (1.8)	31.0 (1.8)	37.6 (1.7)	35.8 (2.2)	36.0 (1.8)	36.6 (2.1)	40.5 (2.0)	41.4 (2.3)	40.1 (1.8)	43.1 (0.7)
III. 이환 및 의료이용		고혈압 진단 경험률(≥30)	16.8 (1.3)	15.6 (1.5)	17.6 (1.4)	17.6 (1.4)	18.1 (1.4)	19.8 (1.5)	19.3 (1.6)	20.9 (1.7)	19.9 (1.6)	19.3 (1.5)	22.6 (1.5)	24.8 (0.6)
		고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30)	94.6 (2.0)	65.6 (3.7)	81.2 (4.7)	80.6 (4.1)	83.9 (3.2)	85.4 (3.8)	81.0 (3.5)	81.9 (3.3)	87.5 (2.7)	86.4 (3.1)	89.8 (2.4)	91.7 (0.7)
		고혈압 관리교육 이수율(≥30)	56.3 (6.1)	27.1 (4.4)	-****	9.7 (2.8)	15.6 (3.7)	38.0 (4.1)	41.1 (4.1)	25.2 (3.7)	20.3 (3.9)	25.9 (3.5)	13.6 (2.6)	15.0 (0.8)
		당뇨병 진단 경험률(≥30)	6.0 (1.0)	6.0 (1.0)	6.3 (1.1)	6.3 (1.1)	6.9 (0.9)	6.8 (0.9)	7.3 (1.0)	7.4 (0.9)	8.3 (1.0)	8.5 (1.1)	8.7 (1.2)	10.9 (0.5)
		당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥30)	79.0 (4.5)	85.6 (5.7)	82.3 (5.0)	89.8 (4.7)	78.3 (5.4)	86.0 (5.2)	70.8 (6.1)	81.2 (5.9)	84.9 (4.1)	87.5 (4.3)	81.2 (3.4)	92.1 (1.0)
		당뇨병 관리교육 이수율(≥30)	74.8 (5.4)	41.4 (6.4)	-****	14.7 (3.3)	35.1 (6.4)	53.2 (7.1)	53.9 (5.3)	38.3 (7.3)	26.7 (6.5)	45.1 (5.5)	38.7 (6.4)	26.0 (1.6)
		당뇨병 안정환 합병증검사 수진율(≥30)	47.9 (6.7)	46.2 (6.3)	31.3 (8.1)	42.3 (6.8)	37.6 (7.1)	48.0 (6.9)	36.8 (4.9)	32.2 (6.0)	39.4 (6.1)	45.6 (6.1)	46.4 (7.2)	41.3 (1.8)
		당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(≥30) ⁴⁾	48.6 (5.5)	56.3 (5.2)	-*	47.6 (7.1)	42.4 (4.9)	65.8 (5.7)	30.1 (6.3)	51.2 (5.7)	45.1 (7.5)	63.7 (6.6)	44.6 (3.9)	52.0 (1.7)
		연간 미충족미치료율 ⁵⁾	13.3 (1.3)	13.7 (1.5)	-*	9.2 (1.1)	11.1 (1.0)	14.6 (1.3)	12.1 (1.1)	15.2 (1.3)	9.4 (0.9)	11.8 (1.3)	10.3 (0.9)	11.0 (0.4)
IV. 사고 및 중독(낙상)		연간 사고중독 경험률	5.3 (0.9)	4.9 (0.9)	6.0 (0.9)	4.4 (0.7)	6.3 (0.7)	9.7 (1.2)	6.2 (0.9)	10.2 (1.0)	11.9 (1.2)	8.7 (1.0)	6.3 (0.9)	5.3 (0.3)
V. 삶의 질		양호한 주관적 건강수준 인지율	44.6 (1.9)	48.5 (2.1)	46.0 (2.0)	38.5 (1.6)	40.3 (1.9)	41.4 (1.5)	41.6 (2.0)	46.7 (1.7)	44.7 (1.7)	44.5 (1.8)	38.4 (1.8)	34.9 (0.6)

-* : 문항 다름, -** : 산출식 다름, -*** : 문항 및 산출식 다름, -**** : 조사방법 다름, -***** : 산출 안함, -***** : 조사 안함

주 : 1) 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률, 현재흡연자의 금연시도율 : 2012년 설문문항 및 응답보기, 설문순서 변경되어 연도비교 시 2008-2011년 결과 제외

2) 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률, 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률 : 2009년 신규 도입되어 조사되었으나, 2014년 설문문항 및 응답보기 변경되어 연도비교 시 2009-2013년 결과 제외


3) 중등도 이상 신체활동 실천율 : 2009년부터 산출식 변경되어 연도비교 시 2008년 결과 제외

4) 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율 : 2011년부터 설문문항 및 응답보기 변경되어 연도비교 시 2008-2010년 결과 제외

5) 연간 필요의료서비스 미치료율 : 2010년 설문문항 다름으로 연도비교 시 해당연도(2010년) 결과 제외

우리 지역사회의 주요 건강이슈


2018년 인천광역시 연수구 지역사회건강조사 주요 지표 결과(표준화율)를 인천광역시의 주요지표 결과와 전국 254개 시군구 보건소 분포의 2사분위(Quartile)와 비교하였다. <표 1>의 주요지표 중 건강행태 및 삶의 질 영역의 인천시 연수구 결과와 인천광역시 및 전국 2사분위를 바탕으로 상대적 비교를 한 결과는 <그림 1>과 같다.



<그림 1> 인천 연수구와 인천광역시 및 전국의 상대적 비교(1)
(건강행태 및 삶의 질)

전국 중앙값 및 인천광역시의 상대적 비교에서 상대적으로 높은 지표는 현재흡연자의 1개월 내 금연 계획률, 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률이며, 상대적으로 낮은 지표는 현재흡연율, 남자 현재흡연율, 현재흡연자의 금연시도율, 저작불편호소율(≥ 65)이었다.

〈표 1〉의 주요지표 중 예방접종 및 검진, 이환 및 의료이용, 사고 및 중독(손상) 영역의 인천시 연구결과와 인천광역시 및 전국 2사분위를 바탕으로 상대적 비교를 한 결과는 〈그림 2〉과 같다.




〈그림 2〉 인천 연구구와 인천광역시 및 전국의 상대적 비교(2)
(예방접종 및 검진, 이환 및 의료이용, 사고 및 중독(손상))

전국 중앙값 및 인천광역시의 상대적 비교에서 상대적으로 높은 지표는 당뇨병 관리교육 이수율(≥30), 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(≥30), 연간 사고중독 경험률이며, 상대적으로 낮은 지표는 당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥30)이었다.

지역사회 건강조사에 따른 우선순위를 선정하기 위해 Maryland 황금다이아몬드(Golden Diamond)방법을 이용하였다. 황금 다이아몬드 방식은 보건지표의 상대적 크기와 변화의 경향을 이용하여 우선순위를 결정하는 방식으로 <표 1>에서 제시한 주요지표를 2018년 인천광역시 결과와 비교(A축)하고, 연수구의 2017년 대비 2018년의 지표변화 경향을 파악(B축)하여 <그림 2>과 같이 9개의 분류에 따라 5종류의 우선순위 점수를 배점하였다.

우선순위 점수가 낮을수록 시급히 추진해야 할 필요성이 높은 사업지표이고, 점수가 높을수록 우선순위의 시급성은 낮아짐을 의미한다. 연수구의 황금다이아몬드 분석 결과는 <표 2>과 같다. 그러나 제시된 우선순위 점수 외에 지역에서의 해당 건강문제의 절대적 크기와 사업의 효과를 감안하여 조정, 추진하는 것이 바람직할 것이다.



<그림 3> 주요 지표의 우선순위 결정을 위한 “황금 다이아몬드(golden diamond)”

〈표 2〉 황금 다이아몬드에 의한 우선순위 분석 결과(조율 비교)

		인천광역시와 비교 결과 (A)		
		나쁜 수준	비슷함	좋은 수준
전 년 도 결 과 와 비 교 결 과 (B)	나 빠 짐	<1> * 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(≥30)	<2> * 현재흡연자의 금연 시도율 * 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률 * 영양표시 활용률 * 고혈압 관리교육 이수율(≥30)	<3> * 당뇨병 관리교육 이수율(≥30) * 양호한 주관적 건강인지율
	변 화 없 음	<2> * 현재흡연율 * 남자 현재흡연율 * 저작불편호소율(≥65) * 당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥30)	<3> * 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률 * 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률 * 현재음주자의 고위험음주율 * 운전 시 안전벨트 착용률 * 비만율 및 주관적 비만인지율 * 체중조절 시도율 * 우울감 경험률 * 연간 인플루엔자 예방접종률 * 고혈압 진단 경험률(≥30) * 고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30) * 당뇨병 진단 경험률(≥30) * 연간 미충족 의료율 * 연간 사고중독 경험률	<4> * 월간음주율 * 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(≥30)
	좋 아 짐	<3>	<4> * 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률 * 걷기 실천율 * 스트레스 인지율	<5>

연수구의 2018년 결과를 전년도 결과 및 2018년 인천광역시 결과와 교차 비교했을 때 보건사업 우선순위가 첫 번째로 높은 지표는 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(≥30)이었다.

우선순위 두 번째 지표는 현재흡연자의 금연 시도율, 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률, 영양표시 활용률, 고혈압 관리교육 이수율(≥30), 현재흡연율, 남자 현재흡연율, 저작불편호소율(≥65), 당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥30)이었다. 우선순위 세 번째 지표는 당뇨병 관리교육 이수율(≥30), 양호한 주관적 건강인지율, 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률, 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률, 현재음주자의 고위험음주율, 운전 시 안전벨트 착용률, 비만율, 주관적 비만인지율, 체중조절 시도율, 우울감 경험률, 연간 인플루엔자 예방접종률, 고혈압 진단 경험률(≥30), 고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30), 당뇨병 진단 경험률(≥30), 연간 미충족 의료율, 연간 사고중독 경험률이었다. 우선순위 네 번째 지표는 월간음주율, 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(≥30), 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률, 걷기 실천율, 스트레스 인지율이었다. 우선순위 다섯 번째 지표는 없었다.



제1부 조사체계

I. 조사개요

II. 통계 추정방법

CHS

Community Health Survey

제 1 부 조사체계

I. 조사개요

1. 조사목적
2. 조사방법
3. 조사내용
4. 표본설계
5. 조사체계
6. 자료관리
7. 조사현황



I. 조사개요

1. 조사목적

1995년 지방자치단체의 보건사업계획 수립을 의무화하는 지역보건법이 제정되었으나 시·군·구 단위의 대표성과 신뢰성 있는 통계가 부재한 상황이었다. 이에 질병관리본부에서는 지역보건법 제4조(지역사회 건강실태조사) 및 동법시행령 제2조(지역사회 건강실태조사의 방법 및 내용)에 의거, 지역보건의료계획 수립 및 보건사업수행에 필요한 건강통계를 생산하기 위하여 2008년 이후 매년 시·군·구에서 지역사회건강조사를 수행하고 있다. 생산된 통계자료는 지역보건의료계획 수립 및 보건사업의 성과를 평가하는 자료로 활용되고 있다.

2. 조사방법

가. 조사대상

조사시점 표본가구에 거주하는 만 19세 이상 가구원 (1999년 7월 31일 이전 출생자)

나. 조사시기

2018년 8월 16일 - 10월 31일

다. 조사방법

조사원이 표본가구를 방문하여 노트북에 탑재된 전자조사표를 이용해 조사대상자와 1:1 면접 조사하는 방법

3. 조사내용

지역사회건강조사에서는 2010년부터 4년 주기의 순환조사체계를 도입하여 지표의 중요도와 활용성, 표본의 크기 등을 고려하여 각각의 조사항목을 1년, 2년, 4년 주기로 구분하여 조사하고 있다.

2018년부터 제3기 순환조사가 시작되었으며, 전국의 모든 시·군·구에서 조사하는 전국공통문항 외에 각 시·도별로 지역선택문항을 선정하여 조사하였다.

가. 전국공통 조사항목

총 21개 영역, 총 201개 문항으로 구성된 전국 공통조사표는 가구원 대표 1인이 참여하는 가구 조사와 만 19세 이상 가구원이 참여하는 개인조사로 구성하였다.

개인조사 영역에는 계측조사(혈압측정, 신체계측), 건강행태(흡연, 음주, 안전의식, 신체활동, 식생활, 비만 및 체중조절, 구강건강, 정신건강), 예방접종 및 검진, 이환, 의료이용, 사고 및 중독, 활동제한 및 삶의 질, 보건기관 이용, 사회 물리적 환경, 심폐소생술, 여성건강, 교육 및 경제활동이 포함되었다.

〈표 3〉 2018년 전국공통 조사항목

영역	조사항목
가구조사 (*가구대표 1인 참여)	세대유형, 기초생활수급자 여부, 가구 소득, 가구 식생활 형편, 치매환자 동거여부 등
혈압측정 기초설문	현재부터 30분 이내 활동, 금일 혈압약 복용, 혈압수치 인지 여부, 마지막 음식섭취 시간
신체계측 사전설문	평소 알고 있는 키, 평소 알고 있는 몸무게
흡연	평생흡연, 흡연시작연령, 현재흡연, 금연기간, 금연 시도, 금연계획, 간접흡연, 전자담배 사용, 다른 담배 사용 등
음주	평생음주, 음주시작연령, 음주빈도, 음주량, 절주 및 금주 시도, 음주폐해
안전의식	안전벨트 착용(자동차, 택시, 버스, 오토바이, 자전거), 음주운전 경험(자동차, 오토바이, 자전거), 음주운전차량 동승경험 등
운동 및 신체활동	유산소 신체활동 실천, 걷기 실천, 지역사회 내 운동시설 접근성
식생활	아침식사, 영양표시 인지·해독·활용
비만 및 체중조절	본인인지체형, 체중조절 경험
구강건강	주관적 구강건강, 저작불편, 치솔질, 치과진료 등
정신건강	수면시간, 스트레스 및 우울감, 정신상담, 주요 우울장애 경험, 수면의 질, 치매 등
예방접종	인플루엔자 예방접종 경험
이환	고혈압 진단 경험, 당뇨병 진단 경험, 뇌졸중 조기증상 인지, 심근경색증 조기증상 인지 등
의료이용	미충족 의료 경험, 미충족 의료 이유
사고 및 중독	사고중독 경험 및 건수, 사고중독 원인 등
활동제한 및 삶의 질	주관적 건강수준, 삶의 질 지수
보건기관 이용	보건기관 이용
사회 물리적 환경	현재 체감 환경, 광역 시·도 및 시·군·구 거주기간
심폐소생술	심폐소생술 인지, 심폐소생술 교육 경험, 마네킹 실습 경험, 심폐소생술 시행능력 정도
여성건강	임신여부, 최근 출산 경험, 모유수유 경험
교육 및 경제활동	직업, 학력, 혼인상태
혈압측정	혈압 측정(2회)
신체계측	키(2회), 몸무게(1회)

나. 지역선택 조사항목

총 7개 영역, 총 19개 문항으로 구성된 인천지역선택조사표는 개인조사영역에서 건강행태(흡연, 운동, 식생활, 구강건강, 정신건강), 이환, 활동제한 및 삶의 질이 포함되었다.

〈표 4〉 2018년 인천 지역선택 조사항목

영역	조사항목
흡연	현재흡연자 중 금연시도자의 금연방법, 연간 금연 시도 횟수, 현재비흡자의 공공장소 간접 흡연 노출률, 금연구역 인지율, 효과적인 금연 프로그램, 금연정책 강화 필요 영역
운동	월간 규칙적 운동실천율
식생활	저염식 실천 노력 경험률
구강건강	틀니 이용 행태(50세 이상), 주관적 틀니 필요 인지율(50세 이상)
정신건강	스트레스 원인, 우울감 원인, 평생 치매 선별검사 수진율:60세 이상
이환	고혈압 관리교육 장소 선호도, 심뇌혈관질환 인지율, 심뇌혈관질환 예방생활수칙 인지율 및 매체 경험률, 대시증후군 인지율
활동제한 및 삶의 질	행복감지수

4. 표본설계

가. 모집단

(1) 목표 모집단은 2018년 7월 기준으로 시·군·구에 거주하는 만 19세 이상의 성인이다.

(2) 조사 모집단은 시·군·구의 동/읍·면 내 통·반/리의 표본지점을 1차 추출단위로 하며, 선정된 통·반/리의 표본지점 내 주거용 주택(아파트, 일반주택)에 거주하는 만 19세 이상의 성인이다.


나. 표본추출

(1) 1차 추출(표본지점)

통·반/리 내 주택유형별 가구 수를 기준으로 주민등록인구자료와 주택자료를 연계하여 작성된 표본추출틀에서 각 동/읍·면 별로 할당된 표본지점을 추출하는데, 이때 통·반/리를 명칭기준으로 정렬한 후 가구 수 크기를 고려하여 추출확률이 비례하도록 추출하였다.

(2) 2차 추출(표본가구)

표본가구는 표본지점으로 선정된 통·반/리의 가구 수를 파악하여 계통추출법으로 선정하였다. 이 때 통·반/리의 규모가 커서 2개 이상의 표본지점이 할당된 경우 표본오차를 최소화하기 위해 표본가구가 가능한 고르게 분포하도록 하였다. 최종적으로 표본지점별로 평균 5개 가구를 표본가구로 선정하였다.



〈그림 4〉 표본선정과정

〈표 5〉 동/읍·면별 표본지점 분포


동	전체 가구 수			표본지점 수		
	일반	아파트	합계	일반	아파트	합계
동춘1동	729	5,358	6,087	1	4	5
동춘2동	48	7,075	7,123		5	5
동춘3동	44	5,980	6,024		5	5
선학동	2,764	5,221	7,985	2	4	6
송도1동	33	10,787	10,820		8	8
송도2동		16,045	16,045		11	11
송도3동	14	12,871	12,885		9	9
연수1동	6,787	3,806	10,593	4	3	7
연수2동	1,425	8,106	9,531	1	6	7
연수3동	180	7,637	7,817		6	6
옥련1동	3,168	4,940	8,108	2	4	6
옥련2동	1,658	6,376	8,034	1	5	6
청학동	7,306	5,167	12,473	5	4	9
합계	24,156	99,369	123,525	16	74	90

5. 조사체계


가. 수행체계

질병관리본부는 지역사회건강조사 사업계획을 수립하여 시·도에 배포하고, 표본설계, 조사문항 및 지침표준화, 교육 및 홍보물 개발 등의 사업수행과 관련한 기술지원을 하였다. 사업 관련 주요 현안에 대한 검토 및 심의는 시·도 및 책임대학교 위원회, 전문 분과위원회로 구성된 운영위원회를 통해 이루어졌다.

시·도는 권역대표대학교를 지정하여 지역사회건강조사 수행을 위한 지역 거점센터를 운영하고, 중앙 정부로부터 사업예산을 받아 시·군·구 보건소로 배정하는 역할을 담당하여 수행하였다. 시·군·구 보건소는 책임 대학교와 협약을 체결하고, 조사수행 관련한 행정 지원을 하였다.



〈그림 6〉 수행과정



〈그림 5〉 수행체계

나. 수행과정

질병관리본부에서 설문지 개발 및 표본추출을 담당하였고, 책임대학교에서 조사원 교육을 실시하였다. 조사원은 가구선정통지서 발송 1-2주 후 표본가구를 방문하여 면접조사를 진행하여 조사 자료를 중앙서버로 전송하였다. 이후 질병관리 본부의 조사자료 확인 및 책임대학교의 자료분석 절차를 거쳐 통계집을 발간하였다.

6. 자료관리


가. 콜센터 운영

2018년 지역사회건강조사에서는 조사원에게 표준화된 조사수행 및 조사문항지침을 전달하고자 책임대학교 단위의 콜센터를 운영하였다.

콜센터에서는 표본가구 및 가구원 선정, 가구대체, 조사문항, 노트북 관련 질의사항을 처리하고, 담당자는 질의사항에 대한 조치내역을 질병보건통합관리 시스템에 일단위로 등록하였다.

나. 자료검증

2018년 지역사회건강조사에서는 조사완료자 중 10%를 무작위로 추출하여 제3기관을 통해 전화 점검을 실시하였다. 전화점검은 조사완료 후 평균 3일 이내 실시하였으며, 책임대학교에서 전화점검 결과에 대해 확인 후 최종적으로 조사자료의 사용 여부를 결정하였다.



〈그림 7〉 전화점검 절차

〈표 7〉 가구당 조사인원 수

	일반	아파트	계
계	1.7	2.0	2.0

나. 조사가구 및 인구 특성

2018년 지역사회건강조사 대상자의 가구원수는 4명인 경우가 가장 많았고 31.5%, 평균은 3.0명이었다. 조사자의 세대유형은 2세대가 65.2%, 1세대가 29.8%의 순이었으며, 월 가구소득은 400만원 이상이 53.2%로 가장 많았고, 다음이 300~400만원 미만이 18.4%의 순이었다.

성별분포는 남자가 43.9%, 여자가 56.1%이었다. 연령은 40대가 23.4%로 가장 높았고, 다음이 30대 20.8%의 순이었다. 대상자의 평균연령은 46.5세였다. 결혼은 유배우가 71.2%이고, 교육수준은 대학교 이상이 48.0%로 가장 많았고, 다음이 고등학교 졸업이 36.8% 순이었다.

7. 조사현황

가. 조사현황

조사현황은 〈표 6〉과 같다. 총 조사가구 수는 460가구였고, 조사완료자 수는 902명이었다. 가구당 평균 2.0명이 조사되었다.

〈표 6〉 조사현황

동/읍·면	조사가구 수			조사완료자 수(명)		
	일반	아파트	합계	일반	아파트	합계
동춘1동	5	20	25	10	42	52
동춘2동		25	25		51	51
동춘3동		25	25		48	48
선학동	10	22	32	20	42	62
송도1동		40	40		87	87
송도2동		57	57		114	114
송도3동		47	47		95	95
연수1동	20	17	37	30	28	58
연수2동	5	32	37	9	63	72
연수3동		30	30		51	51
옥련1동	10	20	30	18	42	60
옥련2동	5	25	30	8	61	69
청학동	25	20	45	42	41	83
합계	80	380	460	137	765	902

〈표 8〉 2018년 지역사회건강조사 조사대상 가구특성

(단위 : 명, %)

조사대상 가구특성(N=460)		
	N	(%)
가구원 수		
1명	65	14.1
2명	100	21.7
3명	116	25.2
4명	145	31.5
5명	29	6.3
6명	4	0.9
7명 이상	1	0.2
평균(명)	3	.
세대유형		
1세대	137	29.8
2세대	300	65.2
3세대	23	5.0
기초생활수급자 여부		
현재 수급자	14	3.0
과거 수급자	4	0.9
미수급자	442	96.1
월 가구소득		
100만원 미만	36	7.9
100~200만원 미만	26	5.7
200~300만원 미만	68	14.9
300~400만원 미만	84	18.4
400만원 이상	243	53.2
치매환자 동거가구	6	13.3

* '치매환자 동거가구'는 2018년 문항구조 변경으로, 가족 중 치매환자가 있는 경우에만 응답가능

〈표 9〉 2018년 지역사회건강조사 조사대상 인구특성

(단위 : 명, %)

조사대상 인구특성 (N=902)		
	N	(%)
성별		
남자	396	43.9
여자	506	56.1
연령(10세 간격)		
19-29세	135	15.0
30-39세	188	20.8
40-49세	211	23.4
50-59세	182	20.2
60-69세	112	12.4
70세 이상	74	8.2
평균(세)	46.5	.
생애주기별		
19-64세	780	86.5
65세 이상	122	13.5
결혼상태		
미혼	169	18.7
유배우	642	71.2
사별, 이혼, 별거	91	10.1
교육수준 ¹⁾		
무학	25	2.8
초등학교	50	5.5
중학교	62	6.9
고등학교	332	36.8
대학교 이상	433	48.0
직업		
전문행정관리직	162	18.0
사무직	160	17.7
판매·서비스직	110	12.2
농림어업	2	0.2
기능단순노무직	158	17.5
기타 ²⁾	310	34.4

1) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

2) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

제 1 부 조사체계

Ⅱ. 통계 추정방법

1. 가중치의 사용
2. 자료처리
3. 분산추정



II. 통계 추정방법

1. 가중치의 사용

가. 소개

2018년 지역사회건강조사는 표본설계를 통하여 추출한 표본을 조사하여 설계 구조를 바탕으로 가중치를 부여함으로써 모집단의 건강수준 등을 추정하였다. 가중치는 가구단위 분석을 위한 가구가중치와 개인단위 분석을 위한 개인가중치로 분류하였다.

나. 가중치 산출 과정

가구가중치는 가구추출률과 조사적격 가구율을 반영하였고, 개인가중치는 가구가중치에 개인 응답률을 반영하였다. 추정에 쓰이는 보정가중치는 개인가중치를 성별, 연령별 인구구조(2018년 7월 주민등록인구)와 같도록 보정하여 산출하였다.

설계가중치		벤치마킹 가중치
가구가중치	→ 개인가중치	→ 보정가중치
· 가구추출률 · 조사적격가구율 · 주택유형별 가구 비율	· 개인 응답률	· 성별·연령별 인구보정 - 성별 : 남, 여 - 연령별 : 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+ - 주민등록인구 기준 (2018. 07)

〈그림 8〉 가중치 산출 과정

(1) 가구가중치

- 표본설계의 표본추출과정을 고려한 가구추출률, 조사적격 가구율, 주택유형별 가구비율을 반영한 가중치

$$W_{hi} = \frac{M_{hi}}{n_{hi}} = \frac{e_{hi} \cdot N_{hi}}{n_{hi}}$$

- N_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 가구 수
- M_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 적격가구 수
- n_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 조사가구 수
- e_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 조사적격 가구율

〈표 10〉 가구가중치 산출 예

내역	값
구분 1(①) : 동/읍·면	(00동)
구분 2(②) : 주택유형	(아파트)
①, ②의 가구 수(③)	(2,620)
①, ②의 조사된 가구 수(④)	(7)
①, ②의 조사접촉 가구 수(⑤)	(9)
①, ②의 조사적격 가구 수(⑥)	(8)
가구가중치(⑦) = ③ ÷ ④ × ⑥ ÷ ⑤	(332,698 = 2620/7 × 8/9)
전체 가구가중치 합(⑧)	(8569,456)
전체 ②의 가구 수 합(⑨)	(10,356)
가구가중치 보정(⑩) = ⑦ × (⑨/⑧)	(402,0583 = 332,698 × 10,356/8569,456)

(2) 개인가중치

- 가구가중치에 개인 응답률을 반영한 가중치
- $W_{hjk} = W_{hjk} \times \frac{P_{hjk}}{p_{hjk}}$
 - h : 읍·면/동, j : 표본지점
 - k : 가구, l : 가구원
 - P_{hjk} : 가구내 만 19세 이상 가구원수
 - p_{hjk} : 가구내 만 19세 이상 조사 가구원수

〈표 11〉 개인가중치 산출 예

내역	값
구분 1(①) : 동/읍·면	(00동)
구분 2(②) : 주택유형	(아파트)
①, ②의 가구가중치(③)	(402, 0583)
만 19세 이상 가구원수(④)	(4)
만 19세 이상 조사 가구원수(⑤)	(3)
개인가중치(⑥)=③×④/⑤	(536. 0777=402. 0583×4/3)

(3) 보정가중치

- 2018년 7월 주민등록인구 기준으로 성별, 연령별 인구구조를 보정한 가중치

$$W'_{ijkl} = BF_d \cdot W_{ijkl}$$

$$BF_d = \frac{d(\text{성별} \cdot \text{연령대별}) \text{ 주민등록인구수}}{\sum_h \sum_i \sum_{jkl} W_{ijkl} I_{d= \text{성별} \cdot \text{연령대별}}}$$

〈표 12〉 보정가중치 산출 예

내역	값
구분 1(①) : 동/읍·면	(00동)
구분 2(②) : 주택유형	(아파트)
①, ②의 개인가중치(③)	(536. 0777)
주민등록인구(④)	(14, 693)
성·연령별 개인가중치 합(⑤)	(12, 157. 23)
성·연령별 보정비(⑥)=④/⑤	(1. 208=14, 693/12, 157. 23)
보정가중치(⑦)=③×⑥	(647. 89=536. 0777×1. 208)

(4) 가중치의 이상치 제거

특정 조사대상자의 개인가중치가 다른 조사대상자의 개인가중치보다 월등히 클 경우, 해당 조사대상자의 응답값에 의해 조사결과에 바이어스(bias, 편향성)가 생길 수 있으므로 보정가중치의 이상치를 Raking Ratio 방법으로 제거하여 재보정 하였다.

$Q_3(W'_g) + 3 \times IQR$ 보다 큰 가중치는 이상치로 정의하였으며, $Q_3(W'_g) + 3 \times IQR$ 로 변경하였다.

- $IQR: Q_3(W') - Q_1(W')$
- $Q_1(W')$: 가중치 중 1사분위수
- $Q_3(W')$: 가중치 중 3사분위수

2. 자료처리

가. 무응답처리

무응답은 대체하지 않았으며 지표 산출 시 제외하였다. 무응답은 개체 무응답과 항목 무응답으로 구분하는데 개체 무응답은 조사에 참여하지 않음으로써 모든 문항에 대해 발생한 결측치를 의미하고, 항목 무응답은 조사에 참여한 대상자가 일부 항목에 응답하지 않아 발생한 결측치이다.

나. 사회경제적 특성분류

(1) 연령

연령은 2018년 8월 1일 기준으로 만 연령을 정의하였다. 연령분류는 10세 단위로 “19-29세, 30-39세, 40-49세, 50-59세, 60-69세, 70세 이상”으로 분류하였고, 생애주기별 특성을 알아보기 위해 “19-64세, 65세 이상”의 연령구분을 추가하였다.

(2) 교육수준

교육수준은 <교육 및 경제활동> 영역에서 교육 정도와 졸업여부 2개 문항으로 조사하고 있으며 최종 교육수준은 두 문항을 조합하여 “무학, 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교 이상”으로 구분하였다. 졸업여부가 ‘졸업’인 경우만 해당 교육수준을 의미하며 졸업여부가 ‘수료, 중퇴, 재학/휴학’인 경우에는 이전 정도의 교육수준으로 분류하였다.

〈표 13〉 교육수준분류

교육수준	졸업여부	분류
무학	-	무학
서당/한학	-	
초등학교	졸업	초등학교
중학교	졸업	중학교
고등학교	졸업	고등학교
2년/3년제 대학	졸업	대학교 이상
4년제 대학	졸업	
대학원 이상	전체	

(3) 직업

직업분류는 통계청 한국표준직업분류(KSCO, 제6차 개정)의 대분류 직업군에서 유사한 직업 분류를 묶어서 6개 직업군으로 분류하였다.

〈표 14〉 직업분류

제6차 한국표준직업분류	직업분류 재구분
관리자	전문행정관리
전문가 및 관련 종사자	
사무 종사자	사무직
서비스 종사자	판매·서비스직
판매 종사자	
농업, 임업 및 어업숙련 종사자	농림어업
기능원 및 관련 기능 종사자	기능단순노무직
장치, 기계조작 및 조립 종사자	
단순노무 종사자	
군인	기타
학생	
주부	
무직	

(4) 가구소득

소득수준은 월 단위로 “100만원 미만, 100-200만원 미만, 200-300만원 미만, 300-400만원 미만, 400만원 이상”의 5개 그룹으로 분류하였다.

(5) 거주유형

거주유형은 “동”과 “읍·면”으로 구분하였다.

3. 분산추정

지역사회건강조사에서는 모집단의 특성을 추정하기 위해 가중치를 적용한 표본가중평균을 제시하였다.

표본조사로 모집단의 특성을 추정할 때 일반적으로 표본오차(sampling error) 및 비표본오차(non-sampling error)가 수반된다. 표본오차는 표본이 모집단의 특성과 어긋나는 정도를 나타내며, 비표본오차는 표본추출과정을 제외한 자료수집 과정이나 분석 과정에서 발생하는 오류를 말한다. 표준오차(standard error)로 표현되는 표본오차는 추정치의 신뢰도에 대한 척도가 되며 분산추정에 의해 측정할 수 있다. 인천광역시 연수구 지역사회건강조사는 SAS 9.4를 활용하여 분산을 추정하였다.

• 표본가중평균

$$\hat{Y} = \frac{\left(\sum_h \sum_j \sum_k \sum_l W_{h j k l} y_{h j k l} \right)}{W_{....}}$$

- h : 동/읍·면, j : 표본지점
- k : 가구, l : 가구원
- $W_{....} = \sum_h \sum_j \sum_k \sum_l W_{h j k l}$: 가중치 계
- $y_{h j k l}$: 해당 문항의 응답값

• 표본오차

$$SE(\hat{Y}) = \sqrt{\sum_{h=1} \sum_{j=1} \frac{n_{hj}(1-f_{hj})}{n_{hj}-1} \sum_{k=1}^{n_{hj}} (e_{hjk} - \overline{e_{hj}})^2}$$

$$\text{여기서 } e_{hjk} = \frac{\left(\sum_{l=1} W_{h j k l} (y_{h j k l} - \hat{Y}) \right)}{W_{....}} \text{이고,}$$

$$\overline{e_{hj}} = \left(\sum_{k=1} e_{hjk} \right) / n_{hj} \text{이다.}$$

• 변동계수

$$cv(\hat{Y}) = \frac{SE(\hat{Y})}{\hat{Y}}$$



제2부 주요통계결과

- I. 건강행태
- II. 예방접종 및 검진
- III. 이환 및 의료이용
- IV. 사고 및 중독
- V. 활동제한 및 삶의 질
- VI. 보건기관 이용
- VII. 사회 물리적 환경
- VIII. 심폐소생술
- IX. 여성건강
- X. 가구조사

CHS

Community Health Survey

제 2 부 주요통계결과

I. 건강행태

1. 흡연
2. 음주
3. 안전의식
4. 신체활동
5. 식생활
6. 비만 및 체중조절
7. 구강건강
8. 정신건강



I. 건강행태

1. 흡연

가. 현재흡연율

- 정의

$$\frac{\text{평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 현재흡연율은 2008년 24.3%, 2009년 25.6%, 2010년 25.6%, 2011년 22.2%, 2012년 24.7%, 2013년 21.0%, 2014년 20.4%, 2015년 21.8%, 2016년 21.6%, 2017년 18.6%였고, 2018년 결과 전체 18.6%였다. 남자 38.8%, 여자 3.8%로 남자가 높았다. 연령별로는 30대가 23.0%, 50대 21.6%, 20대 20.6%, 40대 17.5%, 60대 12.2%, 70세 이상 6.4%였다. 2018년 인천광역시 결과는 22.3%로 연수구보다 높았다.

- 정의

$$\frac{\text{평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수} \times 100}{\text{남자 조사대상 응답자 수}}$$


- 남자 현재흡연율은 2008년 47.1%, 2009년 49.5%, 2010년 47.0%, 2011년 42.0%, 2012년 44.9%, 2013년 39.7%, 2014년 36.6%, 2015년 40.1%, 2016년 39.4%, 2017년 30.5%였다. 2018년 결과 전체 33.8%이고, 연령별로는 50대 41.4%, 30대 40.9%, 40대 32.4%, 20대 32.2%, 60대 25.4%, 70세 이상 13.5%였다. 2018년 인천광역시 결과는 39.8%로 연수구보다 높았다.

나. 매일 흡연자의 하루 평균 흡연량


- 정의

$$\frac{\text{평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 매일 흡연자의 하루 평균 흡연개비수의 총 합}}{\text{평생 5갑(100개비) 이상 피운 매일 흡연자 수}}$$


- 매일 흡연자의 하루 평균 흡연량은 2009년 15.8개비, 2010년 14.4개비, 2011년 15.9개비, 2012년 15.7개비, 2013년 15.1개비, 2014년 14.8개비, 2015년 15.8개비, 2016년 13.0개비, 2017년 14.9개비였다. 2018년 결과 전체 14.7개비, 남자 14.9개비였다. 연령대별로는 50대 16.0개비, 30대 14.8개비, 40대 14.7개비였다.



〈그림 9〉 현재흡연율



〈그림 10〉 남자현재흡연율



〈그림 11〉 매일 흡연자의 하루 평균 흡연량

다. 현재흡연자의 금연시도율

- 정의

$$\frac{\text{최근 1년(365일) 동안 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 현재 흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수} \times 100}{\text{현재 흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움") 수}}$$


- 현재흡연자의 금연시도율은 2010년 45.2%, 2011년 40.0%, 2012년 36.5%, 2013년 31.4%, 2014년 39.5%, 2015년 47.7%, 2016년 37.4%, 2017년 40.4%였다. 2018년 결과 전체 30.2%, 남자 29.7%였다. 연령대별로는 20대 44.4%, 30대 35.8%, 40대 34.9%, 50대 9.4%였다. 2018년 인천광역시 결과는 28.1%로 연수구와 유의한 차이는 없었다.

라. 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률


- 정의

$$\frac{\text{현재 흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움") 중 1개월(30일) 내 금연계획이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{현재 흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움") 수}}$$

- 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률은 2010년 7.5%, 2011년 8.1%, 2012년 7.2%, 2013년 11.6%, 2014년 8.5%, 2015년 10.8%, 2016년 3.6%, 2017년 12.3%였다. 2018년 결과 전체 4.4%, 남자 3.9%였다. 연령대별로는 40대 10.4%, 30대 4.8%, 50대 1.7%였다. 2018년 인천광역시 결과는 5.3%로 연수구와 유의한 차이는 없었다.



〈그림 12〉 현재흡연자의 금연시도율



〈그림 13〉 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률

마. 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률

- 정의

최근 1주일 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적 있는 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연율은 전체 4.5%로 남자 3.7%, 여자 5.0%로 남자에서 높았다. 연령대별로는 60대 7.3%, 50대 6.2%, 40대 4.0%, 20대 3.5%, 30대 3.2%, 70세 이상 2.5%였다.

사. 현재비흡연자의 공공장소 간접흡연 노출률¹⁾

- 정의

공공장소에서 다른 사람이 피우는 담배연기로 인한 간접흡연 경험자 수×100
조사대상 응답자 수

*③ 직장에 다니지 않음(일을 하지 않음) 대상자 제외

- 현재비흡연자의 공공장소 간접흡연 노출률은 전체 92.5%로 남자 90.8%, 여자 93.7%였다. 연령대별로는 20대 98.0%, 60대 94.5%, 40대 93.4%, 30대 92.7%, 50대 89.7%, 70세 이상 81.8%였다.

바. 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률


- 정의

최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수×100
조사대상 응답자 수


*③ 직장에 다니지 않음(일을 하지 않음) 대상자 제외

- 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연율은 전체 21.4%로 남자 26.6%, 여자 16.0%로 남자에서 높았다. 연령대별로는 60대 35.5%, 20대 30.9%, 50대 20.4%, 40대 18.9%, 30대 11.0%였다.


1) 2013년 지표정의 : 공공장소에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 경험이 있는 사람의 수*100 / 조사대상 응답자 수



〈그림 14〉 현재비흡자의 가정실내 간접흡연 노출률



〈그림 15〉 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률




〈그림 16〉 현재비흡연자의 공공장소 간접흡연 노출률

아. 효과적인 금연프로그램

- 정의

$\frac{\text{응답보기별 응답자 수} \times 100}{\text{평생 5갑 (100개비) 이상 피운 흡연자 수}}$
--

- 효과적인 금연프로그램은 금연클리닉 42.4%, 공익광고 35.1%, 금연교육 15.1%, 금연상담 전화 7.4%로 가장 낮았다.



〈그림 17〉 효과적인 금연프로그램

2. 음주

가. 월간 음주율

- 정의

최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 월간 음주율은 2008년 53.5%, 2009년 49.9%, 2010년 61.4%, 2011년 59.6%, 2012년 60.3%, 2013년 59.5%, 2014년 65.1%, 2015년 61.6%, 2016년 61.9%, 2017년 63.8%였다. 2018년 결과 전체 65.9%, 남자 78.4%, 여자 53.8%로 남자가 높았다. 연령대별로는 30대 79.0%, 20대 72.7%, 40대 71.3%, 50대 64.0%, 60대 51.0%, 70세 이상 25.4%였다. 2018년 인천광역시 결과는 61.1%로 연수구보다 낮았다.

다. 연간 음주폐해 경험률

- 정의

최근 1년 동안 타인의 음주로 인하여 소란, 폭행, 성추행, 작업 또는 일상생활 중 사고(몸을 다침), 음주운전사고 등을 경험한 적이 있는 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 연간 음주폐해 경험률은 전체 2.2%, 남자 2.6%, 여자 1.8%로 남자에서 높았다. 연령대별로는 30대 4.1%, 20대 3.9%, 50대 1.4%, 40대 1.2%, 60대 0.9%였다.


나. 연간음주자의 고위험 음주율²⁾

- 정의


최근 1년 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔) 이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 수×100
최근 1년 동안 음주한 사람의 수

- 연간음주자의 고위험 음주율은 2008년 21.2%, 2009년 15.7%, 2010년 18.2%, 2011년 23.0%, 2012년 18.0%, 2013년 17.9%, 2014년 18.8%, 2015년 18.5%, 2016년 21.6%, 2017년 19.8%였다. 2018년 결과 전체 19.8%, 남자 30.4%, 여자 7.7%로 남자가 높았다. 연령별로는 20대 22.5%, 40대 21.4%, 60대 20.7%, 50대 19.6%, 30대 17.3%였고, 70세 이상은 5.9%로 가장 낮았다. 2018년 인천광역시 결과는 19.4%로 연수구와 유의한 차이는 없었다.


2) 2008년 지표정의 : 한 번의 술좌석에서 남자는 7잔 또는 맥주 5캔(여자의 경우 5잔 또는 맥주 3캔 정도) 이상을 한 달(30일) 동안 1회 이상 마신 적이 있다고 응답한 사람의 수*100 / 조사대상자 중 최근 1년간 음주한 사람의 수



〈그림 18〉 월간 음주율



〈그림 19〉 연간음주자의 고위험 음주율



〈그림 20〉 연간 음주폐해 경험률

3. 안전의식

가. 운전 시 안전벨트 착용률

- 정의

자동차 운전 시 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수×100
자동차 운전자 수

- 자동차 운전 시 안전벨트 착용률은 2008년 90.7%, 2009년 92.3%, 2010년 85.7%, 2011년 90.4%, 2012년 88.1%, 2013년 83.8%, 2014년 89.4%, 2015년 89.4%, 2016년 93.0%, 2017년 91.2%였다. 2018년 결과 전체 93.6%, 남자 91.3%, 여자 97.4%였다. 연령대별로는 60대 96.4%, 50대 93.6%, 20대 93.2%, 40대 93.0%, 30대 92.7%였다. 2018년 인천광역시 결과는 91.9%로 연수구와 유의한 차이는 없었다.

나. 동승차량 안전벨트 착용률

- 정의


승용차나 택시 앞좌석에 탈 때 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수×100
동승차량 앞좌석 탑승자 수

- 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률은 2008년 87.0%, 2009년 74.6%, 2010년 77.7%, 2011년 83.4%, 2012년 81.1%, 2013년 77.6%, 2014년 전체 74.7%, 2015년 78.0%, 2016년 81.7%, 2017년 83.6%였다. 2018년 결과 전체 89.6%, 남자 88.3%, 여자 90.8%였다. 연령대별로는 70세 이상 96.2%, 50대 95.9%, 60대 92.7%, 40대 89.3%, 30대 87.3%, 20대 81.4%였다. 2018년 인천광역시 결과는 87.9%로 연수구와 유의한 차이는 없었다.


- 정의

승용차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수×100
동승차량 뒷좌석 탑승자 수


- 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률은 전체 15.9%, 남자 14.6%, 여자 17.0%였다. 연령대별로는 70세 이상 32.1%, 60대 26.2%, 40대 16.3%, 30대 12.2%, 20대 11.9%, 50대 11.4%였다.



〈그림 21〉 운전 시 안전벨트 착용률



〈그림 22〉 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률




〈그림 23〉 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률

다. 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)

- 정의

$$\frac{\text{최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 사람의 수} \times 100}{\text{자동차 또는 오토바이 운전자 수}}$$

- 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)은 2009년 6.4%, 2010년 9.9%, 2011년 8.6%, 2012년 11.3%, 2013년 12.5%, 2014년 12.0%, 2015년 12.6%, 2016년 6.3%, 2017년 5.0% 였다. 2018년 결과 전체 5.4%, 남자 6.8%, 여자 2.9%로 남자가 높았다. 연령대별로는 40대 7.2%, 60대 6.9%, 30대 6.3%, 50대 3.9%, 20대 2.4% 였다. 2018년 인천광역시 결과는 5.3%로 연수구와 유의한 차이는 없었다.



〈그림 24〉 연간음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)

4. 신체활동

가. 걷기 실천율

- 정의

최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 수×100
조사대상 응답자 수


- 걷기 실천율은 2008년 41.4%, 2009년 51.1%, 2010년 35.0%, 2011년 40.3%, 2012년 45.0%, 2013년 45.3%, 2014년 49.7%, 2015년 41.5%, 2016년 43.3%, 2017년 41.5%였다. 2018년 결과 전체 52.1%, 남자 53.9%, 여자 50.3%로 성별에 유의한 차이는 없었다. 연령대별로는 20대 60.8%, 60대 58.9%, 70세 이상 52.7%, 50대 51.9%, 40대 46.6%, 30대 46.0%였다. 2018년 인천광역시 결과는 51.8%로 연수구와 유의한 차이는 없었다.

나. 지역사회 내 운동시설 접근율


- 정의

최근 1년 동안 본인이 거주하고 있는 지역에서 운동을 할 수 있는 장소를 찾기 “매우 쉬웠다” 또는 “쉬운 편이었다”에 응답한 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 지역사회 내 운동시설 접근율은 전체 89.3%, 남자 88.8%, 여자 89.7%였다. 연령대별로는 70세 이상 98.1%, 50대 90.6%, 60대 90.4%, 40대 88.6%, 30대 87.7%, 20대 86.3%였다.



〈그림 25〉 걷기 실천율



〈그림 26〉 지역사회 내 운동시설 접근율

5. 식생활

가. 아침결식 예방인구비율

- 정의

최근 1주일 동안 5일 이상 아침식사를 한 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 아침결식 예방인구비율은 전체 67.2%, 남자 64.4%, 여자 70.0%로 여자에서 조금 높았다. 연령대별로는 70세 이상 97.7%, 60대 87.4%, 50대 78.1%, 40대 64.0%, 20대 53.5%, 30대 49.4%였다.

다. 저염식 실천 노력 경험률

- 정의

평소 덜 짜게 먹으려고 “항상 노력한다” 또는 “대체로 노력한다”에 응답한 사람의 수×100
조사대상 응답자 수


- 저염식 실천 노력 경험률은 전체 60.3%, 남자 52.0%, 여자 68.4%로 여자에서 높았다. 연령대별로는 50대 71.1%, 70세 이상 70.4%, 60대 69.7%, 40대 65.4%, 30대 53.2%, 20대 40.3%였다.

나. 영양표시 활용률


- 정의

영양표시 내용이 가공식품을 사거나 고를 때 영향을 미친다고 응답한 사람의 수×100
가공식품을 사거나 고를 때 영양표시를 읽는 사람의 수


- 영양표시 활용률은 전체 78.3%, 남자 78.4%, 여자 78.3%로 성별에 유의한 차이는 없었다. 연령대별로는 40대 88.3%, 30대 78.3%, 60대 77.5%, 50대 74.7%, 20대 69.3%였다.



〈그림 27〉 아침결식 예방인구비율



〈그림 28〉 영양표시 활용률



〈그림 29〉 저염식 실천 노력 경험률

6. 비만 및 체중조절

가. 비만을

- 정의

$\text{체질량지수(kg/m}^2\text{)} \geq 25 \text{ 이인 사람의 수} \times 100$
조사대상 응답자 수


- 비만율은 2008년 21.8%, 2009년 21.9%, 2010년 24.4%, 2011년 25.1%, 2012년 23.1%, 2013년 25.2%, 2014년 26.0%, 2015년 28.2%, 2016년 26.7%, 2017년 28.6%였다. 2018년 결과 전체 30.3%, 남자 36.7%, 여자 24.0%로 남자가 높게 나타났다. 연령대별로는 60대 44.6%, 40대 37.2%, 50대 32.0%, 70세 이상 24.3%, 30대 22.4%, 20대 22.0%였다. 2018년 인천광역시 결과는 32.0%로 연수구와 유의한 차이는 없었다.
- 비만율(실제계측)은 전체 34.0%, 남자 41.7%, 여자 26.5%로 남자에서 높았다. 연령대별로는 60대 52.2%, 70세 이상 40.4%, 40대 38.7%, 50대 38.6%, 30대 24.4%, 20대가 20.2%로 가장 낮았다.

나. 주관적 비만인지율


- 정의

“약간 비만임” 또는 “매우 비만임”에 응답한 사람의 수 $\times 100$
조사대상 응답자 수


- 주관적 비만인지율은 2008년 30.9%, 2009년 33.1%, 2010년 39.8%, 2011년 40.6%, 2012년 39.3%, 2013년 43.7%, 2014년 42.9%, 2015년 43.4%, 2016년 42.1%, 2017년 44.7%였다. 2018년 결과 전체 45.2%, 남자 43.2%, 여자 47.2%였다. 연령대별로는 60대 52.5%, 40대 49.9%, 50대 46.7%, 30대 44.4%, 70세 이상 39.1%, 20대 37.2%였다. 2018년 인천광역시 결과는 44.0%로 연수구와 유의한 차이는 없었다.



〈그림 30〉 비만율(자가보고)



〈그림 31〉 비만율(신체계측)




〈그림 32〉 주관적 비만인식율

다. 연간 체중조절 시도율

- 정의

최근 1년 동안 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 했던 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 연간 체중조절 시도율은 2008년 47.2%, 2009년 51.8%, 2010년 59.7%, 2011년 71.8%, 2012년 60.6%, 2013년 72.2%, 2014년 68.4%, 2015년 64.6%, 2016년 64.5%, 2017년 68.5%였다. 2018년 결과 전체 64.8%, 남자 57.6%, 여자 71.9%로 여자가 높았다. 연령대별로는 40대 71.6%, 30대 69.1%, 20대 65.3%, 60대 63.5%, 50대 63.0%, 70세 이상 38.7%였다. 2018년 인천광역시 결과는 62.1%로 연수구와 유의한 차이는 없었다.



〈그림 33〉 연간 체중조절 시도율

7. 구강건강

가. 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율

- 정의

“나쁨” 또는 “매우 나쁨”에 응답한 사람의 수×100
조사대상 응답자 수


- 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율은 2008년 33.2%, 2009년 28.2%, 2010년 33.4%, 2011년 29.1%, 2012년 28.8%, 2013년 30.1%, 2014년 31.9%, 2015년 29.2%, 2016년 31.7%, 2017년 29.4%였다. 2018년 결과 전체 26.3%, 남자 27.4%, 여자 25.2%였다. 연령대별로는 60대 41.8%, 70세 이상 41.7%, 50대 31.4%, 40대 22.6%, 30대 21.1%, 20대 15.7%였다. 2018년 인천광역시 결과는 32.7%로 연수구보다 높았다.

나. 저작불편호소율(65세 이상)


- 정의

“매우 불편하다” 또는 “불편하다”에 응답한 사람의 수×100
65세 이상 조사대상 응답자 수

- 65세 이상 노인의 저작불편호소율은 2008년 42.8%, 2009년 34.5%, 2010년 43.8%, 2011년 40.1%, 2012년 42.0%, 2013년 41.2%, 2014년 50.7%, 2015년 31.3%, 2016년 50.0%, 2017년 31.0%였다. 2018년 결과 전체 28.6%, 남자 26.5%, 여자 30.5%였다. 연령대별로는 75~80세 32.6%, 70~74세 29.2%, 65~69세 24.1%였다. 2018년 인천광역시 결과는 38.6%로 연수구보다 높았다.



〈그림 34〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율



〈그림 35〉 저작불편호소율(≥65)

다. 치솔질 실천율

(1) 어제 아침식사 후 치솔질 실천율

- 정의

$\frac{\text{아침식사 후 치솔질 한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$
--

- 어제 아침식사 후 치솔질 실천율은 전체 90.6%, 남자 88.6%, 여자 92.5%로 여자가 높았다. 연령대별로는 60대 97.8%, 50대 91.4%, 70세 이상 89.9%, 40대 89.8%, 20대 88.6%, 30대 87.5%였다.

(2) 어제 점심식사 후 치솔질 실천율

- 정의

$\frac{\text{점심식사 후 치솔질 한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$
--


- 어제 점심식사 후 치솔질 실천율은 전체 58.4%, 남자 52.3%, 여자 64.4%로 여자가 높았다. 연령대별로는 30대 65.3%, 40대 62.3%, 50대 57.6%, 20대와 70세 이상 54.3%, 60대 49.9%였다.

(3) 어제 저녁식사 후 치솔질 실천율


- 정의

$\frac{\text{저녁식사 후 치솔질 한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$
--


- 어제 저녁식사 후 치솔질 실천율은 전체 73.9%, 남자 72.7%, 여자 75.0%로 여자가 조금 높았다. 연령대별로는 60대 82.5%, 20대 74.9%, 70세 이상 74.3%, 50대 74.1%, 40대 71.0%, 30대 70.8%였다.



〈그림 36〉 어제 아침식사 후 칫솔질 실천율



〈그림 37〉 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율



〈그림 38〉 어제 저녁식사 후 칫솔질 실천율

(4) 어제 잠자기 전 칫솔질 실천율

- 정의

$\frac{\text{잠자기 전 칫솔질 한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$


- 어제 잠자기 전 칫솔질 실천율은 전체 82.1%, 남자 78.6%, 여자 85.5%였다. 연령대별로는 50대 85.8%, 20대 84.1%, 70세 이상 83.8%, 30대 82.5%, 40대 79.2%, 60대 75.4%였다.

라. 연간 미충족의료율(치과)


- 정의

$\frac{\text{최근 1년 동안 치과진료가 필요하다고 생각하였으나진료를 받지 못한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$
--

- 연간 미충족의료율(치과)은 전체 23.6%, 남자 21.7%, 여자 25.4%로 여자가 높았다. 연령대별로는 60대 26.2%, 20대 26.0%, 50대 24.2%, 40대 23.6%, 30대 21.3%, 70세 이상 16.8%였다.



〈그림 39〉 어제 잠자기 전 칫솔질 실천율



〈그림 40〉 연간 미충족의료를(치과)

8. 정신건강

가. 스트레스 인지율

- 정의

평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이 느낀다” 또는 “많이 느끼는 편이다”에 응답한 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 스트레스 인지율은 2008년 29.7%, 2009년 33.2%, 2010년 29.4%, 2011년 27.4%, 2012년 30.9%, 2013년 31.9%, 2014년 30.2%, 2015년 32.0%, 2016년 27.1%, 2017년 24.6%였다. 2018년 결과 전체 29.3%, 남자 29.2%, 여자 29.3%였다. 연령대별로는 30대 37.1%, 40대 32.1%, 20대 29.7%, 50대 27.7%, 60대 21.5%, 70세 이상 15.2%였다. 2018년 인천광역시 결과는 30.4%로 연수구와 유의한 차이는 없었다.

나. 우울감 경험률

- 정의

최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 슬픔이나 절망감을 경험한 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 우울감 경험률은 2008년 10.1%, 2009년 6.0%, 2010년 8.2%, 2011년 5.7%, 2012년 5.3%, 2013년 9.5%, 2014년 10.2%, 2015년 9.1%, 2016년 6.2%, 2017년 6.3%였다. 2018년 결과 전체 7.3%, 남자 5.5%, 여자 9.1%였다. 연령대별로는 60대 9.2%, 30대 7.8%, 70세 이상 7.6%, 40대 7.5%, 20대 7.1%, 50대 6.1%였다. 2018년 인천광역시 결과는 8.4%로 연수구와 유의한 차이는 없었다.


다. 치매

(1) 평생 치매선별검사 수검율(≥60)


- 정의

평생동안 치매 선별검사를 받은 적이 있는 사람의 수×100
60세 이상 조사대상 응답자 수


- 평생 치매선별검사 수검율(≥60)은 전체 28.3%, 남자 16.6%, 여자 38.3%로 여자에서 높았다. 연령대별로는 70세 이상 47.5%, 60대 15.0%였다.



〈그림 41〉 스트레스 인지율



〈그림 42〉 우울감 경험률



〈그림 43〉 평생 치매선별검사 수검율(≥60)

제 2 부 주요통계결과

Ⅱ. 예방접종

1. 예방접종



II. 예방접종


1. 예방접종

가. 연간 인플루엔자 예방접종률

- 정의

$$\frac{\text{최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 연간 인플루엔자 예방접종률은 2008년 29.4%, 2009년 24.3%, 2010년 29.1%, 2011년 31.0%, 2012년 37.6%, 2013년 35.8%, 2014년 36.0%, 2015년 36.6%, 2016년 40.5%, 2017년 41.4%였다. 2018년 결과 전체 40.1%, 남자 36.9%, 여자 43.2%로 여자가 높았다. 연령대별로는 70세 이상에서 96.9%로 가장 높았고, 60대 65.9%, 30대 42.0%, 40대 34.4%, 50대 29.1%, 20대 21.8%였다. 2018년 인천광역시 결과는 43.1%로 연수구보다 조금 높았다.



〈그림 44〉 연간 인플루엔자 예방접종률

제 2 부 주요통계결과

Ⅲ. 이환 및 의료이용

1. 주요 질환별 진단 경험률
및 관리행태
2. 의료이용



Ⅲ. 이환 및 의료이용

1. 주요 질환별 평생 의사진단 경험률 및 관리행태

가. 고혈압

(1) 고혈압 진단 경험률(≥30)

• 정의

의사에게 고혈압을 진단 받은 사람의 수×100

30세 이상 조사대상 응답자 수

- 고혈압 진단 경험률(≥30)은 2008년 16.8%, 2009년 16.7%, 2010년 17.6%, 2011년 17.6%, 2012년 18.1%, 2013년 19.8%, 2014년 19.3%, 2015년 20.9%, 2016년 19.9%, 2017년 19.3%였다. 2018년 결과 전체 22.6%, 남자 28.3%, 여자 17.1%로 남자가 높았다. 연령대별로는 70세 이상 57.6%, 60대 44.4%, 50대 27.3%, 40대 12.8%, 30대 2.6%였다. 2018년 인천광역시 결과는 24.8%로 연수구보다 조금 높았다.

(2) 고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30)


• 정의

현재 혈압조절약을 “한 달에 20일 이상 복용”하고 있는 사람의 수×100


의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수

- 고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30)은 2008년 94.6%, 2009년 82.1%, 2010년 81.2%, 2011년 80.6%, 2012년 83.9%, 2013년 85.4%, 2014년 81.0%, 2015년 81.9%, 2016년 87.5%, 2017년

86.4%였다. 2018년 결과 전체 89.8%, 남자 85.0%, 여자 97.5%였다. 연령대별로는 60대 92.6%, 40대 92.5%, 50대 92.3%, 70세 이상 87.4%였다. 2018년 인천광역시 결과는 91.7%로 연수구와 유의한 차이는 없었다.



〈그림 45〉 고혈압 진단 경험률(≥30)



〈그림 46〉 고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30)

(3) 고혈압 관리교육 이수율(≥30)

- 정의

고혈압 관리 교육을 받은 사람의 수×100
의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수


- 고혈압 관리교육 이수율(≥30)은 전체 13.6%, 남자 13.9%, 여자 13.2%로 성별에 유의한 차이는 없었다. 연령대별로는 70세 이상 23.5%, 40대 18.9%, 50대 10.3%, 60대 7.0%였다.

(4) 고혈압 관리교육 장소 선호도


- 정의

응답보기별 응답자 수×100
의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수

- 고혈압 관리교육 장소 선호도는 병의원인 49.0%로 가장 높았고, 보건기관 31.6%, 학교나 직장 9.9%, 거주지내 공동이용시설 9.0%, 기타 0.5%였다.



〈그림 47〉 고혈압 관리교육 이수율(≥30)



〈그림 48〉 고혈압 관리교육 장소 선호도

나. 당뇨병

(1) 당뇨병 진단 경험률(≥ 30)

- 정의

의사에게 당뇨병을 진단 받은 사람의 수 $\times 100$
30세 이상 조사대상 응답자 수

- 당뇨병 진단 경험률(≥ 30)은 2008년 6.0%, 2009년 6.0%, 2010년 6.3%, 2011년 6.3%, 2012년 6.9%, 2013년 6.8%, 2014년 7.3%, 2015년 7.4%, 2016년 8.3%, 2017년 8.5%였다. 2018년 결과 전체 8.7%, 남자 10.2%, 여자 7.2%로 남자가 높았다. 연령대별로는 70세 이상 32.4%, 60대 17.5%, 50대 7.2%, 40대 4.5%, 30대 1.0%였다. 2018년 인천광역시 결과는 10.9%로 연수구보다 높았다.

(2) 당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥ 30)

- 정의

현재 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구혈당강하제)을 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 사용한다고 응답한 사람의 수 $\times 100$
의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수


- 당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥ 30)은 2008년 79.0%, 2009년 85.6%, 2010년 82.3%, 2011년 89.8%, 2012년 78.3%, 2013년 86.0%, 2014년 70.8%, 2015년 81.2%, 2016년 84.9%, 2017년 85.2%였다. 2018년 결과 전체 81.2%, 남자 73.1%, 여자 92.1%였다. 연령대별로는 70세 이상 84.6%, 60대 75.7%였다. 2018년 인천광역시 결과는 92.1%로 연수구보다 높았다.

(3) 당뇨병 관리교육 이수율(≥ 30)


- 정의

당뇨병 관리 교육을 받은 사람의 수 $\times 100$
의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수


- 당뇨병 관리교육 이수율(≥ 30)은 전체 38.7%, 남자 38.2%, 여자 39.4%로 성별에 유의한 차이는 없었다. 연령대별로는 60대 43.6%, 70세 이상 42.6%였다.



〈그림 49〉 당뇨병 진단 경험률(≥30)



〈그림 50〉 당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥30)



〈그림 51〉 당뇨병 관리교육 이수율(≥30)

(4) 연간 당뇨병 안질환 합병증 검사(안저검사) 수진율(≥ 30)

- 정의

최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 $\times 100$
의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수

- 연간 당뇨병 안질환 합병증 검사(안저검사) 수진율(≥ 30)은 2008년 47.9%, 2009년 46.2%, 2010년 31.3%, 2011년 42.3%, 2012년 37.6%, 2013년 48.0%, 2014년 36.8%, 2015년 32.2%, 2016년 39.4%, 2017년 45.6%였다. 2018년 결과 전체 46.4%, 남자 46.2%, 여자 46.6%였다. 연령대별로는 70세 이상 60.8%, 60대 39.0%였다. 2018년 인천광역시 결과는 41.3%로 연수구보다 낮았다.


(5) 연간 당뇨병 신장질환 합병증 검사(미세단백뇨검사) 수진율(≥ 30)³⁾

- 정의


최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 $\times 100$
의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수

- 연간 당뇨병 신장합병증 검사(미세단백뇨검사) 수진율(≥ 30)은 2011년 47.6%, 2012년 42.4%, 2013년 65.8%, 2014년 30.1%, 2015년 51.2%, 2016년 45.1%, 2017년 63.7%였다. 2018년 결과 전체 44.6%, 남자 43.4%, 여자 46.3%였다. 연령대별로는 70세 이상 49.6%, 60대 34.4%였다. 2018년 인천광역시 결과는 52.0%로 연수구보다 높았다.

3) 2009년 지표정의 : 최근 1년 동안 미세단백뇨검사를 받은 적이 있는 사람의 수 $\times 100$ / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
2010년 지표정의 : 최근 1년 동안 소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 $\times 100$ / 의사진단을 받은 30세 이상인 사람의 수



〈그림 52〉 연간 당뇨병 안질환 합병증 검사(안저검사) 수진율(≥30)



〈그림 53〉 연간 당뇨병 신장질환 합병증 검사(미세단백뇨검사) 수진율(≥30)


다. 대사증후군

(1) 대사증후군 인지율

- 정의

대사증후군에 대한 내용을 보거나 들어본 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수

- 대사증후군 인지율은 전체 56.9%, 남자 52.8%, 여자 61.0%로 여자에서 높게 나타났다. 연령대 별로는 40대 72.2%, 50대 71.1%, 30대 55.1%, 60대 52.8%, 70세 이상 39.1%, 20대 34.1%였다.



〈그림 54〉 대사증후군 인지율

라. 심뇌혈관질환

(1) 심뇌혈관질환 인지율

- 정의

$$\frac{\text{심뇌혈관질환에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 심뇌혈관질환 인지율은 전체 50.4%, 남자 45.3%, 여자 55.4%였다. 연령대별로는 50대 65.1%, 40대 62.0%, 60대 59.2%, 30대 39.3%, 70세 이상 34.2%, 20대 32.1%였다.

(2) 심뇌혈관질환 예방관리수칙 인지율

- 정의

$$\frac{\text{심뇌혈관질환에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$


- 심뇌혈관질환 예방관리수칙 인지율은 전체 16.4%, 남자 14.6%, 여자 18.2%였다. 연령대별로는 60대 31.4%, 50대 25.8%, 70세 이상 23.0%, 40대 16.1%, 30대 6.3%, 20대 5.4%였다.

(3) 심뇌혈관질환 예방관리수칙 매체 경험률


- 정의

$$\frac{\text{심뇌혈관질환에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$


- 심뇌혈관질환 예방관리수칙 매체 경험률은 병의원이 전체 63.3%, TV, 라디오, 옥외광고, 지하철 등 49.7%, 인터넷 30.6%, 보건기관 17.3%였다.



〈그림 55〉 심뇌혈관질환 인지도



〈그림 56〉 심뇌혈관질환 예방생활수칙 인지도



〈그림 57〉 심뇌혈관질환 예방생활수칙 매체 경험률

2. 의료이용


가. 연간 미충족의료율⁴⁾

- 정의

최근 1년 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 연간 미충족의료율은 2008년 13.3%, 2009년 13.7%, 2011년 9.2%, 2012년 11.1%, 2013년 14.6%, 2014년 12.1%, 2015년 15.2%, 2016년 9.4%, 2017년 11.8%였다. 2018년 결과 전체 10.3%, 남자 8.6%, 여자 12.0%로 여자가 조금 높았다. 연령대별로는 20대 15.9%, 30대 13.5%, 40대 11.9%, 70세 이상 8.0%, 60대 5.5%, 50대 4.0%였다. 2018년 인천광역시 결과는 11.0%로 연수구와 유의한 차이는 없었다.

4) 2008년 지표정의 : 최근 1년간 필요한 의료서비스를 받지 못한 사람 수×100 / 조사대상 인구 수
 2009년 지표정의 : 최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 수×100 / 조사대상 응답자 수
 2010년 지표정의 : 최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스(치과 포함)를 받지 못한 사람의 수×100 / 조사대상 응답자 수



〈그림 58〉 연간 미충족의료율

제 2 부 주요통계결과

IV. 사고 및 중독

1. 연간 사고 및 중독 경험률




IV. 사고 및 중독

1. 연간 사고중독 경험률

- 정의

$\frac{\text{연간 사고중독 경험자 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$

- 연간 사고중독 경험률은 2008년 5.3%, 2009년 4.9%, 2010년 6.0%, 2011년 4.4%, 2012년 6.3%, 2013년 9.7%, 2014년 6.2%, 2015년 10.2%, 2016년 11.9%, 2017년 8.7%였다. 2018년 결과 전체 6.3%, 남자 6.0%, 여자 6.6%였다. 연령대별로는 50대 8.8%, 20대 6.8%, 40대 6.6%, 60대 5.7%, 70세 이상 4.0%, 30대 3.9%였다. 2018년 인천광역시 결과는 5.3%로 연수구와 유의한 차이는 없었다.



〈그림 59〉 연간 사고중독 경험률

제 2 부 주요통계결과

V. 활동제한 및 삶의 질

1. 양호한 주관적 건강수준 인지율



V. 활동제한 및 삶의 질


1. 양호한 주관적 건강수준 인지율

- 정의

주관적 건강수준을 “매우 좋음” 혹은 “좋음”에 응답한 사람의 수 × 100

조사대상 응답자 수

- 양호한 주관적 건강수준 인지율은 2008년 44.6%, 2009년 48.5%, 2010년 46.0%, 2011년 38.5%, 2012년 40.3%, 2013년 41.4%, 2014년 41.6%, 2015년 46.7%, 2016년 44.7%, 2017년 44.5%였다. 2018년 결과 전체 38.4%, 남자 43.4%, 여자 33.6%로 남자가 높았다. 연령대별로는 20대에서 46.9%, 40대 40.4%, 50대 37.9%, 60대 34.4%, 70세 이상 32.9%, 30대 32.0%였다. 2018년 인천광역시 결과는 34.9%로 연수구보다 낮았다.



〈그림 60〉 양호한 주관적 건강수준 인지율

제 2 부 주요통계결과

Ⅵ. 보건기관 이용

1. 보건기관 이용



VI. 보건기관 이용

1. 보건기관 이용


가. 연간 보건기관 이용률

- 정의

최근 1년 동안 보건소(보건의료원), 보건지소,
보건진료소를 이용한 적이 있는 사람의 수×100

조사대상 응답자 수

- 연간 보건기관 이용률은 2009년 19.5%, 2010년 24.2%, 2011년 20.0%, 2012년 21.4%, 2013년 23.0%, 2014년 25.8%, 2015년 22.7%, 2016년 22.2%, 2017년 23.2%였다. 2018년 결과 전체 22.5%, 남자 17.1%, 여자 27.7%로 여자가 높았다. 연령대별로는 70세 이상 42.6%, 20대 30.1%, 60대 27.6%, 30대 22.4%, 50대 18.9%, 40대 10.6%였다. 2018년 인천광역시 결과는 20.4%로 연수구보다 조금 낮았다.



〈그림 61〉 연간 보건기관 이용률

제 2 부 주요통계결과

VII. 심폐소생술

1. 심폐소생술 인지율
2. 심폐소생술 교육경험률



VII. 심폐소생술

1. 심폐소생술 인지율

- 정의

$$\frac{\text{심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$


- 심폐소생술 인지율은 전체 96.2%, 남자 96.6%, 여자 95.9%였다. 연령대별로는 40대 99.7%, 20대 99.5%, 30대 98.5%, 50대 94.0%, 60대 92.8%였고, 70세 이상이 82.9%로 가장 낮았다.

2. 심폐소생술 교육경험률


- 정의

$$\frac{\text{최근 2년 동안 심폐소생술 교육을 받은 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 심폐소생술 교육경험률 전체 30.2%, 남자 43.7%, 여자 17.0%로 남자에서 높았다. 연령대별로는 20대 51.1%, 30대 40.3%, 50대 26.6%, 40대 23.9%, 60대 12.0%, 70세 이상 5.2%였다.



〈그림 62〉 심폐소생술 인지도



〈그림 63〉 심폐소생술 교육경험률

제 2 부 주요통계결과

Ⅷ. 가구조사

1. 식품 안정성 확보율
2. 치매환자 가족 가구율



VIII. 가구조사

1. 식품 안정성 확보율

- 정의

우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다” 혹은 “우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다”에 응답한 가구의 수×100

조사대상 응답자 수

- 식품 안정성 확보율은 우리 식구는 충분한 양, 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다 58.3%, 우리 식구는 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었다 37.8%, 우리 식구는 먹을 것이 가끔 부족했다 3.1%, 우리 식구는 먹을 것이 자주 부족했다 0.8%였다.


2. 치매환자 가족 가구율

- 정의


가족 중에 의사로부터 치매를 진단받은 환자가 있는
응답가구의 수×100

조사대상 가구 수

- 치매환자 가족 가구율은 전체 9.6%, 남자 6.0%, 여자 11.2%로 여자에서 높았다. 연령대별로는 50대 15.7%, 40대 12.0%, 70세 이상 10.0%, 60대 5.2%, 30대 4.5%였다.



〈그림 64〉 식품 안정성 확보율



〈그림 65〉 치매환자 가족 가구율



제3부 통계표

I. 통계표

CHS

Community Health Survey

제 3 부 통계표

I. 통계표



<표 15> 평생흡연율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	37.5(1.3)	3.5	396	68.6(2.4)	3.5	506	7.2(1.2)	16.4
연령									
19-29	135	26.9(3.8)	14.2	56	42.2(6.1)	14.5	79	10.2(3.3)	32.0
30-39	188	38.1(3.0)	7.8	85	64.2(4.5)	7.1	103	13.0(3.3)	25.3
40-49	211	41.0(3.0)	7.4	96	73.8(4.3)	5.8	115	9.7(3.1)	32.0
50-59	182	42.8(3.2)	7.6	78	82.7(4.5)	5.4	104	2.4(1.3)	55.4
60-69	112	41.1(3.9)	9.4	48	89.2(4.9)	5.5	64	1.3(1.3)	100.4
70 이상	74	32.8(5.2)	15.8	33	69.0(7.9)	11.5	41	0.0(0.0)	.
19-64	780	37.5(1.4)	3.8	341	67.3(2.5)	3.7	439	8.2(1.3)	16.3
65 이상	122	37.5(3.8)	10.2	55	78.9(5.4)	6.8	67	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	25	16.9(6.9)	40.7	5	-(-)	-	20	0.0(0.0)	.
초등학교	50	32.7(6.7)	20.4	17	-(-)	-	33	0.0(0.0)	.
중학교	62	31.4(6.5)	20.8	22	79.8(10.0)	12.5	40	3.7(2.5)	67.8
고등학교	332	36.6(2.6)	7.0	146	65.7(4.0)	6.1	186	8.1(1.9)	23.7
대학교 이상	433	40.6(2.1)	5.1	206	68.3(3.3)	4.8	227	8.6(2.0)	23.4
직업									
전문행정관리	162	43.6(3.8)	8.7	87	69.9(5.3)	7.5	75	5.0(2.9)	56.8
사무직	160	44.2(3.7)	8.4	84	70.6(5.1)	7.2	76	6.5(3.5)	54.4
판매·서비스직	110	43.1(4.4)	10.1	44	78.3(6.5)	8.3	66	13.2(3.9)	29.5
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	158	55.5(4.0)	7.2	109	75.0(3.9)	5.2	49	5.2(2.8)	54.5
기타 ³⁾	310	19.3(2.4)	12.5	70	51.3(6.8)	13.3	240	6.7(1.6)	24.1
월 가구소득									
100만원 미만	54	29.7(5.1)	17.1	19	-(-)	-	35	3.3(3.3)	99.0
100-200만원 미만	44	25.6(5.7)	22.2	15	-(-)	-	29	5.4(3.3)	60.1
200-300만원 미만	121	45.1(4.0)	8.8	60	70.0(5.3)	7.5	61	15.2(4.0)	26.1
300-400만원 미만	157	41.0(3.6)	8.9	72	73.0(5.5)	7.5	85	7.5(3.1)	41.4
400만원 이상	521	36.5(1.6)	4.3	228	67.6(2.9)	4.3	293	6.2(1.4)	23.1

주 : 1) 평생흡연율 : (평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 16> 흡연시작연령¹⁾

(단위: 세)

구분	전체			남자			여자		
	N	세(표준오차)	변동계수	N	세(표준오차)	변동계수	N	세(표준오차)	변동계수
전체	316	20.0(0.2)	1.2	280	19.7(0.2)	1.0	36	23.0(1.0)	4.5
연령									
19-29	32	18.0(0.5)	3.0	24	17.6(0.6)	3.6	8	-(-)	-
30-39	67	19.4(0.6)	3.1	55	18.9(0.5)	2.6	12	-(-)	-
40-49	84	20.0(0.3)	1.4	72	19.7(0.3)	1.5	12	-(-)	-
50-59	66	20.1(0.5)	2.5	63	19.5(0.3)	1.6	3	-(-)	-
60-69	44	22.9(1.0)	4.3	43	22.5(0.9)	4.2	1	-(-)	-
70 이상	23	21.0(0.8)	3.7	23	21.0(0.8)	3.7	0	-(-)	-
19-64	272	19.8(0.2)	1.3	236	19.4(0.2)	1.1	36	23.0(1.0)	4.5
65 이상	44	21.5(0.7)	3.4	44	21.5(0.7)	3.4	0	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	4	-(-)	-	4	-(-)	-	0	-(-)	-
초등학교	14	-(-)	-	14	-(-)	-	0	-(-)	-
중학교	20	20.8(1.2)	5.7	18	-(-)	-	2	-(-)	-
고등학교	117	19.8(0.4)	2.2	101	19.2(0.3)	1.8	16	-(-)	-
대학교 이상	161	20.0(0.2)	1.2	143	19.8(0.2)	1.2	18	-(-)	-
직업									
전문·행정관리	64	20.3(0.4)	2.1	61	20.2(0.4)	2.1	3	-(-)	-
사무직	64	19.2(0.4)	2.0	60	19.1(0.4)	2.1	4	-(-)	-
판매·서비스직	45	18.8(0.7)	3.9	35	17.7(0.4)	2.5	10	-(-)	-
농림어업	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	86	20.5(0.3)	1.7	83	20.3(0.3)	1.3	3	-(-)	-
기타 ³⁾	56	21.1(0.7)	3.2	40	20.8(0.6)	3.1	16	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 미만	14	-(-)	-	13	-(-)	-	1	-(-)	-
100-200만원 미만	11	-(-)	-	9	-(-)	-	2	-(-)	-
200-300만원 미만	51	20.4(0.5)	2.6	42	20.4(0.6)	3.0	9	-(-)	-
300-400만원 미만	59	19.1(0.4)	2.0	53	19.1(0.4)	1.9	6	-(-)	-
400만원 이상	179	20.2(0.3)	1.7	161	19.7(0.2)	1.3	18	-(-)	-

주 : 1) 흡연시작연령 : 처음으로 담배 한 대를 다 피운 만 나이의 총 합 / 평생 5갑(100개비) 이상 피운 흡연자 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 17> 현재흡연율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	18.6(1.3)	7.1	396	33.8(2.3)	6.9	506	3.8(0.9)	25.0
연령									
19-29	135	20.6(3.7)	17.9	56	32.2(5.8)	18.0	79	7.9(3.2)	40.7
30-39	188	23.0(3.0)	13.1	85	40.9(5.5)	13.4	103	5.8(2.5)	43.1
40-49	211	17.5(2.5)	14.0	96	32.4(4.3)	13.3	115	3.4(1.5)	45.6
50-59	182	21.6(3.3)	15.2	78	41.4(5.9)	14.1	104	1.6(1.1)	68.6
60-69	112	12.2(3.0)	24.9	48	25.4(6.1)	24.2	64	1.3(1.3)	100.4
70 이상	74	6.4(2.4)	37.0	33	13.5(5.1)	37.5	41	0.0(0.0)	.
19-64	780	20.1(1.4)	7.2	341	36.1(2.5)	7.0	439	4.3(1.1)	25.1
65 이상	122	7.4(2.1)	28.7	55	15.7(4.2)	26.9	67	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	25	0.0(0.0)	.	5	-(-)	-	20	0.0(0.0)	.
초등학교	50	13.0(4.7)	35.9	17	-(-)	-	33	0.0(0.0)	.
중학교	62	14.6(4.4)	30.2	22	40.2(9.2)	22.8	40	0.0(0.0)	.
고등학교	332	21.4(2.3)	10.6	146	39.2(3.8)	9.6	186	4.1(1.4)	33.4
대학교 이상	433	18.3(2.1)	11.4	206	29.8(3.4)	11.6	227	5.1(1.8)	35.0
직업									
전문행정관리	162	20.5(3.1)	15.0	87	33.7(4.7)	13.9	75	1.3(1.2)	96.8
사무직	160	22.2(3.4)	15.3	84	33.9(5.3)	15.6	76	5.4(3.4)	63.3
판매·서비스직	110	28.0(4.2)	14.9	44	52.2(7.4)	14.1	66	7.5(3.2)	43.2
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	158	24.3(3.3)	13.6	109	32.4(4.5)	14.0	49	3.6(2.4)	67.0
기타 ³⁾	310	8.9(1.9)	21.0	70	23.9(5.4)	22.5	240	3.0(1.2)	40.8
월 가구소득									
100만원 미만	54	19.6(5.8)	29.7	19	-(-)	-	35	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	44	9.5(5.3)	55.6	15	-(-)	-	29	2.7(2.7)	101.4
200-300만원 미만	121	21.4(4.3)	20.3	60	33.0(6.8)	20.7	61	7.5(3.3)	44.4
300-400만원 미만	157	20.9(3.2)	15.3	72	37.3(5.9)	15.9	85	3.6(2.6)	73.0
400만원 이상	521	18.2(1.8)	9.9	228	33.1(3.2)	9.6	293	3.7(1.1)	29.4

주 : 1) 현재흡연율 : (평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 18> 매일흡연자의 하루 평균 흡연량¹⁾

(단위: %, 개비)

구분	N ²⁾	10개비 미만		10~19개비		20~39개비		40개비 이상		평균	
		% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	개비 (표준 오차)	변동 계수
전체	130	8.4(2.1)	25.3	57.1(4.0)	6.9	33.4(4.0)	12.1	1.1(1.0)	98.3	14.7(0.5)	3.4
성											
남자	118	6.9(2.3)	33.5	57.3(4.2)	7.4	34.6(4.4)	12.8	1.1(1.1)	98.2	14.9(0.6)	3.7
여자	12	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
연령											
19-29	19	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	33	3.0(3.0)	99.7	59.5(7.7)	12.9	37.5(7.4)	19.6	0.0(0.0)	.	14.8(0.7)	5.0
40-49	34	9.1(5.2)	57.1	55.1(8.3)	15.0	35.7(7.8)	21.7	0.0(0.0)	.	14.7(1.1)	7.6
50-59	30	6.1(4.3)	70.3	59.9(9.4)	15.7	30.1(8.6)	28.6	3.9(3.8)	97.7	16.0(1.1)	7.1
60-69	10	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
70 이상	4	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
19-64	122	8.3(2.2)	26.4	57.3(4.1)	7.1	33.3(4.2)	12.5	1.1(1.1)	98.1	14.7(0.5)	3.5
65 이상	8	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
교육수준 ³⁾											
무학	0	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	3	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
중학교	9	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
고등학교	58	4.2(2.4)	56.1	51.5(6.6)	12.9	44.3(6.2)	14.0	0.0(0.0)	.	15.5(0.7)	4.3
대학교 이상	60	12.2(3.9)	32.1	60.2(6.2)	10.3	25.3(5.4)	21.4	2.3(2.3)	97.5	14.0(0.9)	6.1
직업											
전문행정관리	28	15.8(6.5)	40.8	43.9(9.3)	21.3	40.3(8.6)	21.4	0.0(0.0)	.	14.1(1.1)	7.9
사무직	27	0.0(0.0)	.	68.5(8.9)	12.9	26.1(8.6)	32.8	5.4(5.3)	98.2	15.8(1.5)	9.5
판매·서비스직	25	0.0(0.0)	.	67.6(7.6)	11.2	32.4(7.6)	23.3	0.0(0.0)	.	15.1(0.9)	6.0
농림어업	1	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	33	6.6(4.7)	70.9	50.7(8.3)	16.3	42.8(8.4)	19.7	0.0(0.0)	.	15.7(0.9)	5.4
기타 ⁴⁾	16	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
월 가구소득											
100만원 미만	6	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
100~200만원 미만	2	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
200~300만원 미만	22	17.2(8.4)	49.0	60.2(8.8)	14.6	22.5(7.1)	31.3	0.0(0.0)	.	12.3(1.1)	9.1
300~400만원 미만	26	2.4(2.3)	95.3	58.3(9.7)	16.7	39.3(10.0)	25.4	0.0(0.0)	.	15.0(0.9)	5.9
400만원 이상	74	9.0(2.9)	32.8	52.5(6.3)	12.0	36.6(6.0)	16.4	1.9(1.8)	95.6	15.6(0.7)	4.5

주 : 1) 매일흡연자의 하루 평균 흡연량 : 하루 평균 흡연개비 수의 총 합 / 평생 5갑(100개비) 이상 피운 매일흡연자 수

2) 평생 5갑(100개비) 이상 피운 매일흡연자 수

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 19> 과거흡연자의 금연기간¹⁾

(단위: %)

구분	N ²⁾	1년 미만		1년~5년 미만		5년~10년 미만		10년~15년 미만		15년~20년 미만		20년 이상	
		% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수
전체	165	4.5(1.7)	37.1	19.2(3.6)	18.8	20.2(3.5)	17.6	20.7(3.5)	17.1	10.0(2.6)	25.8	25.4(3.5)	13.9
성													
남자	148	4.4(1.8)	42.1	16.7(3.2)	19.0	19.0(3.6)	19.1	21.8(3.7)	17.1	10.6(2.8)	26.6	27.5(3.7)	13.4
여자	17	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
연령													
19-29	8	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	28	11.0(4.9)	44.1	26.7(7.6)	28.4	36.3(9.4)	25.8	26.0(7.9)	30.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
40-49	46	3.5(3.5)	99.1	22.7(6.3)	27.6	18.5(6.6)	35.5	26.2(6.4)	24.4	15.1(5.5)	36.3	14.0(4.9)	35.0
50-59	33	2.5(2.5)	99.6	9.9(5.5)	56.1	20.3(7.9)	38.8	20.1(7.3)	36.5	18.0(6.5)	36.3	29.2(8.7)	29.7
60-69	32	3.1(3.0)	98.7	12.7(5.3)	41.3	15.0(6.5)	43.5	16.0(8.0)	49.9	8.5(4.7)	55.2	44.7(9.4)	21.1
70 이상	18	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
19-64	130	4.9(2.0)	39.7	22.4(4.1)	18.5	20.5(3.9)	19.2	22.9(4.3)	18.8	11.7(3.1)	26.6	17.6(3.5)	19.9
65 이상	35	2.7(2.7)	99.7	5.2(3.6)	70.3	18.6(7.0)	37.7	10.7(4.1)	38.4	2.5(2.4)	95.9	60.3(7.6)	12.6
교육수준 ³⁾													
무학	4	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	9	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
중학교	11	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
고등학교	51	4.3(2.5)	58.8	20.6(6.1)	29.4	14.0(4.8)	34.5	25.0(6.7)	26.6	10.6(5.5)	52.3	25.5(5.3)	20.8
대학교 이상	90	4.8(2.5)	50.9	21.4(5.0)	23.2	20.8(4.8)	22.9	20.4(4.5)	22.1	11.2(3.1)	27.7	21.4(5.1)	23.8
직업													
전문행정관리	33	4.5(4.5)	99.9	10.2(5.2)	50.8	28.4(8.2)	28.9	16.5(6.4)	38.5	13.5(5.2)	38.3	26.9(7.8)	29.0
사무직	32	5.5(3.5)	64.0	23.4(7.8)	33.1	11.4(6.6)	58.3	32.3(8.1)	25.1	6.3(4.4)	70.6	21.1(8.1)	38.4
판매·서비스직	17	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
농림어업	0	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	50	2.1(2.0)	94.8	17.9(4.8)	26.9	17.8(5.8)	32.6	20.5(5.6)	27.3	13.8(5.5)	40.1	27.9(5.9)	21.3
기타 ⁴⁾	33	9.8(4.8)	49.3	19.8(8.3)	41.7	24.3(6.8)	28.0	11.6(6.2)	53.5	2.4(2.4)	97.6	32.0(8.1)	25.4
월 가구소득													
100만원 미만	6	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
100-200만원 미만	7	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
200-300만원 미만	29	0.0(0.0)	.	29.4(7.6)	25.9	16.5(6.1)	37.0	17.4(7.4)	42.6	10.1(5.8)	57.6	26.6(7.6)	28.7
300-400만원 미만	31	10.8(5.8)	53.2	10.9(5.4)	50.1	33.1(9.5)	28.8	11.1(4.4)	39.7	8.4(4.9)	58.3	25.7(8.0)	31.1
400만원 이상	90	3.5(2.0)	57.2	20.1(4.5)	22.4	16.7(4.3)	25.5	25.6(5.3)	20.8	12.0(3.8)	32.0	22.2(4.6)	20.9

주 : 1) 과거흡연자의 금연기간 : (응답보기별 응답자 수 / 평생 5갑(100개비) 이상 피웠고 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않는 사람의 수) × 100

2) 평생 5갑(100개비) 이상 피웠고 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않는 사람의 수

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 20> 현재흡연자의 금연시도율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	151	30.2(3.4)	11.3	132	29.7(3.5)	11.8	19	-(-)	-
연령									
19-29	24	44.4(10.1)	22.8	18	-(-)	-	6	-(-)	-
30-39	39	35.8(7.8)	21.7	34	34.1(7.9)	23.0	5	-(-)	-
40-49	38	34.9(7.9)	22.7	33	34.2(7.9)	23.0	5	-(-)	-
50-59	33	9.4(4.9)	51.8	31	9.8(5.1)	51.7	2	-(-)	-
60-69	12	-(-)	-	11	-(-)	-	1	-(-)	-
70 이상	5	-(-)	-	5	-(-)	-	0	-(-)	-
19-64	142	29.9(3.7)	12.4	123	29.4(3.9)	13.2	19	-(-)	-
65 이상	9	-(-)	-	9	-(-)	-	0	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
초등학교	5	-(-)	-	5	-(-)	-	0	-(-)	-
중학교	9	-(-)	-	9	-(-)	-	0	-(-)	-
고등학교	66	33.9(4.9)	14.5	57	35.8(5.6)	15.7	9	-(-)	-
대학교 이상	71	27.7(5.1)	18.5	61	24.8(5.2)	21.1	10	-(-)	-
직업									
전문·행정관리	31	39.5(9.7)	24.6	30	40.5(9.7)	23.9	1	-(-)	-
사무직	32	29.4(7.3)	24.9	29	27.7(7.6)	27.4	3	-(-)	-
판매·서비스직	28	28.0(8.7)	30.9	22	29.4(9.2)	31.4	6	-(-)	-
농림어업	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	36	27.7(7.6)	27.2	34	29.0(7.6)	26.3	2	-(-)	-
기타 ³⁾	23	27.2(8.8)	32.4	16	-(-)	-	7	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 미만	8	-(-)	-	8	-(-)	-	0	-(-)	-
100-200만원 미만	4	-(-)	-	3	-(-)	-	1	-(-)	-
200-300만원 미만	22	33.7(13.5)	40.0	17	-(-)	-	5	-(-)	-
300-400만원 미만	28	32.7(9.2)	28.1	26	35.7(9.9)	27.6	2	-(-)	-
400만원 이상	89	27.1(4.9)	17.9	78	25.4(5.0)	19.5	11	-(-)	-

주 : 1) 현재흡연자의 금연시도율 : (최근 1년 동안 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 사람의 수 / 현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 21> 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	151	4.4(1.5)	33.6	132	3.9(1.5)	39.2	19	-(-)	-
연령									
19-29	24	0.0(0.0)	.	18	-(-)	-	6	-(-)	-
30-39	39	4.8(3.4)	70.9	34	5.5(3.9)	70.7	5	-(-)	-
40-49	38	10.4(4.9)	47.5	33	9.2(5.1)	55.5	5	-(-)	-
50-59	33	1.7(1.6)	97.4	31	0.0(0.0)	.	2	-(-)	-
60-69	12	-(-)	-	11	-(-)	-	1	-(-)	-
70 이상	5	-(-)	-	5	-(-)	-	0	-(-)	-
19-64	142	3.9(1.4)	35.3	123	3.4(1.4)	42.5	19	-(-)	-
65 이상	9	-(-)	-	9	-(-)	-	0	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
초등학교	5	-(-)	-	5	-(-)	-	0	-(-)	-
중학교	9	-(-)	-	9	-(-)	-	0	-(-)	-
고등학교	66	2.1(1.4)	66.6	57	1.3(1.2)	95.8	9	-(-)	-
대학교 이상	71	6.0(2.6)	43.8	61	5.8(2.9)	49.6	10	-(-)	-
직업									
전문행정관리	31	2.9(2.9)	102.1	30	3.0(3.0)	101.6	1	-(-)	-
사무직	32	5.0(3.3)	67.4	29	3.1(3.1)	99.8	3	-(-)	-
판매·서비스직	28	3.1(3.1)	100.9	22	3.6(3.6)	101.1	6	-(-)	-
농림어업	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	36	6.7(3.7)	55.0	34	5.1(3.4)	66.3	2	-(-)	-
기타 ³⁾	23	3.9(4.0)	101.1	16	-(-)	-	7	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 미만	8	-(-)	-	8	-(-)	-	0	-(-)	-
100-200만원 미만	4	-(-)	-	3	-(-)	-	1	-(-)	-
200-300만원 미만	22	0.0(0.0)	.	17	-(-)	-	5	-(-)	-
300-400만원 미만	28	0.0(0.0)	.	26	0.0(0.0)	.	2	-(-)	-
400만원 이상	89	5.8(2.3)	39.4	78	5.6(2.4)	43.5	11	-(-)	-

주 : 1) 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률 : 1개월 내 금연계획이 있는 사람의 수 / 현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 22> 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	751	4.5(0.9)	21.1	264	3.7(1.4)	38.3	487	5.0(1.0)	20.3
연령									
19-29	111	3.5(1.7)	49.7	38	4.6(3.2)	70.3	73	2.6(1.9)	72.0
30-39	149	3.2(1.4)	43.0	51	4.0(2.7)	68.3	98	2.8(1.6)	58.3
40-49	173	4.0(1.4)	35.8	63	1.4(1.4)	101.0	110	5.7(2.1)	37.6
50-59	149	6.2(2.3)	36.6	47	5.7(4.2)	74.8	102	6.5(2.3)	36.2
60-69	100	7.3(3.3)	44.9	37	5.9(4.2)	70.5	63	8.1(3.9)	47.5
70 이상	69	2.5(2.4)	99.5	28	0.0(0.0)	.	41	4.4(4.3)	97.4
19-64	638	4.3(0.9)	21.7	218	3.9(1.6)	40.5	420	4.6(1.1)	23.0
65 이상	113	5.3(2.6)	49.4	46	2.5(2.5)	100.7	67	7.4(4.3)	57.3
교육수준 ²⁾									
무학	25	0.0(0.0)	.	5	-(-)	-	20	0.0(0.0)	.
초등학교	45	4.1(3.0)	71.9	12	-(-)	-	33	2.7(2.7)	99.9
중학교	53	15.1(6.1)	40.7	13	-(-)	-	40	12.1(6.0)	49.3
고등학교	266	5.3(1.5)	28.7	89	2.7(1.6)	58.9	177	6.9(2.2)	31.6
대학교 이상	362	2.4(0.7)	30.2	145	2.4(1.4)	57.9	217	2.5(0.7)	29.6
직업									
전문행정관리	131	5.0(2.1)	41.4	57	5.6(4.0)	71.9	74	4.4(1.1)	25.4
사무직	128	0.0(0.0)	.	55	0.0(0.0)	.	73	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	82	6.9(2.9)	42.3	22	12.8(7.3)	57.1	60	4.3(2.5)	58.0
농림어업	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	122	7.6(2.9)	38.4	75	3.7(1.9)	52.6	47	14.8(5.6)	37.6
기타 ³⁾	287	4.0(1.2)	30.2	54	1.6(1.6)	99.1	233	4.7(1.5)	32.0
월 가구소득									
100만원 미만	46	2.2(2.2)	101.5	11	-(-)	-	35	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	40	3.2(3.1)	99.1	12	-(-)	-	28	4.9(4.8)	97.5
200-300만원 미만	99	5.3(3.1)	58.7	43	4.6(3.3)	71.5	56	6.0(3.6)	59.9
300-400만원 미만	129	8.8(3.7)	41.6	46	11.1(6.1)	55.3	83	7.2(3.7)	51.7
400만원 이상	432	3.4(0.9)	25.9	150	1.4(1.0)	71.8	282	4.8(1.2)	25.0

주 : 1) 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률 : (최근 1주일 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수 / 현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 23> 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	451	21.4(1.7)	8.1	208	26.6(3.1)	11.8	243	16.0(2.4)	15.0
연령									
19-29	64	30.9(4.5)	14.6	18	-(-)	-	46	23.7(5.9)	25.1
30-39	98	11.0(3.3)	29.5	48	12.2(4.6)	38.0	50	9.7(4.2)	43.7
40-49	122	18.9(3.7)	19.6	61	27.6(5.8)	21.1	61	8.2(3.7)	45.2
50-59	109	20.4(4.6)	22.5	45	22.3(6.6)	29.8	64	18.6(5.2)	28.1
60-69	47	35.5(7.5)	21.1	30	42.7(8.4)	19.8	17	-(-)	-
70 이상	11	-(-)	-	6	-(-)	-	5	-(-)	-
19-64	421	21.3(1.8)	8.6	188	26.9(3.3)	12.3	233	15.7(2.4)	15.6
65 이상	30	22.7(7.4)	32.6	20	22.3(8.8)	39.6	10	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	2	-(-)	-	1	-(-)	-	1	-(-)	-
초등학교	16	-(-)	-	5	-(-)	-	11	-(-)	-
중학교	27	34.6(11.2)	32.4	9	-(-)	-	18	-(-)	-
고등학교	155	28.1(3.3)	11.8	66	40.7(5.9)	14.6	89	16.8(3.6)	21.5
대학교 이상	251	15.2(2.1)	13.7	127	16.4(3.3)	20.1	124	13.5(2.8)	21.1
직업									
전문·행정관리	127	11.4(2.9)	25.5	57	11.2(4.5)	40.2	70	11.6(3.7)	31.8
사무직	125	13.8(3.3)	24.0	55	11.6(4.6)	39.7	70	16.1(4.5)	27.9
판매·서비스직	80	21.6(5.1)	23.5	22	34.9(11.2)	32.0	58	15.7(5.0)	31.7
농림어업	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	118	40.2(4.3)	10.6	73	49.5(6.2)	12.4	45	23.1(7.1)	30.9
기타 ³⁾	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 미만	11	-(-)	-	3	-(-)	-	8	-(-)	-
100-200만원 미만	19	-(-)	-	7	-(-)	-	12	-(-)	-
200-300만원 미만	53	32.2(6.4)	19.8	32	43.0(8.9)	20.6	21	13.3(7.2)	54.6
300-400만원 미만	72	23.7(5.5)	23.3	37	27.4(7.9)	28.9	35	19.0(6.2)	32.9
400만원 이상	295	20.2(2.1)	10.6	128	23.9(4.1)	17.1	167	16.8(3.0)	17.8

주 : 1) 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률 : (최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수 /일을 하고 있는 현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 24> 평생 전자담배 사용 경험률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	9.9(1.0)	10.6	396	17.8(1.9)	10.6	506	2.3(0.8)	34.3
연령									
19-29	135	16.2(3.4)	20.8	56	25.8(5.4)	21.0	79	5.6(2.9)	51.7
30-39	188	17.3(3.1)	17.7	85	30.0(5.3)	17.8	103	5.1(2.3)	46.0
40-49	211	8.1(1.8)	22.5	96	15.9(3.6)	22.9	115	0.6(0.6)	101.1
50-59	182	6.1(1.9)	31.4	78	12.1(3.8)	31.4	104	0.0(0.0)	.
60-69	112	3.3(1.7)	51.3	48	5.7(3.3)	58.0	64	1.3(1.3)	100.4
70 이상	74	1.6(1.6)	99.5	33	3.4(3.5)	102.1	41	0.0(0.0)	.
19-64	780	10.9(1.2)	10.9	341	19.3(2.1)	11.0	439	2.6(0.9)	34.2
65 이상	122	2.6(1.5)	57.6	55	5.4(3.2)	58.9	67	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	25	0.0(0.0)	.	5	-(-)	-	20	0.0(0.0)	.
초등학교	50	2.5(2.3)	95.4	17	-(-)	-	33	0.0(0.0)	.
중학교	62	3.9(2.8)	71.7	22	10.7(7.3)	67.9	40	0.0(0.0)	.
고등학교	332	12.5(2.1)	16.6	146	22.8(3.5)	15.2	186	2.4(1.0)	41.2
대학교 이상	433	9.9(1.4)	14.1	206	15.9(2.2)	13.8	227	3.1(1.5)	47.7
직업									
전문·행정관리	162	9.5(2.3)	24.3	87	15.2(3.9)	25.4	75	1.3(1.2)	96.8
사무직	160	13.2(2.7)	20.7	84	20.4(4.1)	20.1	76	3.0(3.0)	99.5
판매·서비스직	110	15.0(3.5)	23.3	44	26.8(6.8)	25.4	66	4.9(2.3)	47.1
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	158	13.7(2.8)	20.2	109	18.2(3.8)	20.8	49	2.1(2.0)	96.3
기타 ³⁾	310	4.2(1.2)	29.1	70	10.9(3.6)	33.5	240	1.6(0.9)	57.8
월 가구소득									
100만원 미만	54	6.8(3.2)	46.3	19	-(-)	-	35	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	44	5.8(4.0)	69.3	15	-(-)	-	29	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	121	7.4(2.4)	32.2	60	11.1(4.2)	37.6	61	3.0(2.1)	71.3
300-400만원 미만	157	15.5(2.9)	18.8	72	25.8(5.0)	19.4	85	4.8(2.8)	58.3
400만원 이상	521	9.6(1.4)	14.4	228	17.4(2.4)	13.9	293	1.9(0.9)	45.5

주 : 1) 평생 전자담배 사용 경험률 : (평생 전자담배를 사용한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 25> 현재 전자담배 사용 경험률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	3.0(0.7)	22.7	396	5.1(1.1)	22.2	506	0.9(0.5)	51.9
연령									
19-29	135	3.0(1.9)	63.2	56	3.6(2.5)	69.7	79	2.3(1.6)	69.1
30-39	188	6.3(2.2)	34.5	85	10.9(3.6)	33.2	103	1.8(1.8)	98.3
40-49	211	2.9(1.1)	38.7	96	5.9(2.3)	38.3	115	0.0(0.0)	.
50-59	182	1.9(1.1)	58.5	78	3.8(2.2)	57.9	104	0.0(0.0)	.
60-69	112	1.6(1.1)	71.2	48	2.0(2.0)	99.3	64	1.3(1.3)	100.4
70 이상	74	0.0(0.0)	.	33	0.0(0.0)	.	41	0.0(0.0)	.
19-64	780	3.4(0.8)	22.5	341	5.7(1.3)	22.1	439	1.0(0.5)	51.8
65 이상	122	0.0(0.0)	.	55	0.0(0.0)	.	67	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	25	0.0(0.0)	.	5	-(-)	-	20	0.0(0.0)	.
초등학교	50	0.0(0.0)	.	17	-(-)	-	33	0.0(0.0)	.
중학교	62	0.0(0.0)	.	22	0.0(0.0)	.	40	0.0(0.0)	.
고등학교	332	2.7(1.2)	43.3	146	4.4(1.7)	39.2	186	1.0(0.7)	72.5
대학교 이상	433	4.1(1.0)	25.5	206	6.6(1.7)	26.1	227	1.2(0.9)	72.9
직업									
전문·행정관리	162	5.3(1.8)	34.8	87	8.0(3.1)	38.4	75	1.3(1.2)	96.8
사무직	160	6.0(1.9)	30.8	84	10.2(3.2)	31.1	76	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	110	0.6(0.6)	99.6	44	0.0(0.0)	.	66	1.1(1.0)	96.8
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	158	2.8(1.4)	50.1	109	3.8(1.9)	49.8	49	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	310	1.3(0.7)	54.9	70	1.5(1.5)	98.7	240	1.2(0.8)	70.0
월 가구소득									
100만원 미만	54	0.0(0.0)	.	19	-(-)	-	35	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	44	0.0(0.0)	.	15	-(-)	-	29	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	121	2.9(1.6)	57.4	60	5.3(3.0)	56.6	61	0.0(0.0)	.
300-400만원 미만	157	2.7(1.3)	49.8	72	5.2(2.6)	49.8	85	0.0(0.0)	.
400만원 이상	521	3.6(1.0)	28.1	228	5.8(1.6)	27.6	293	1.6(0.8)	51.4

주 : 1) 현재 전자담배 사용 경험률 : (최근 1달 동안 전자담배를 사용한 적이 있는 사람의 수 / 평생 전자담배를 사용한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 26> 평생 다른담배 사용 경험률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	10.2(1.2)	11.9	396	19.4(2.4)	12.6	506	1.2(0.5)	42.3
연령									
19-29	135	13.5(3.0)	21.9	56	25.0(5.6)	22.5	79	1.1(1.1)	100.0
30-39	188	14.4(2.3)	16.0	85	25.3(4.2)	16.6	103	3.9(2.3)	59.0
40-49	211	9.2(2.2)	24.3	96	17.4(4.4)	25.0	115	1.3(0.9)	70.5
50-59	182	6.2(2.0)	32.0	78	12.3(3.9)	32.1	104	0.0(0.0)	.
60-69	112	8.3(2.2)	26.7	48	18.4(5.0)	27.4	64	0.0(0.0)	.
70 이상	74	8.1(4.7)	57.7	33	17.0(9.2)	54.1	41	0.0(0.0)	.
19-64	780	10.2(1.2)	11.8	341	19.2(2.4)	12.3	439	1.4(0.6)	42.2
65 이상	122	9.8(3.3)	33.5	55	20.6(6.7)	32.6	67	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	25	4.0(3.9)	96.8	5	-(-)	-	20	0.0(0.0)	.
초등학교	50	5.6(3.2)	58.1	17	-(-)	-	33	0.0(0.0)	.
중학교	62	5.7(3.4)	59.4	22	15.6(8.7)	55.7	40	0.0(0.0)	.
고등학교	332	12.1(1.8)	15.0	146	22.7(3.4)	15.0	186	1.7(1.0)	62.0
대학교 이상	433	10.0(1.7)	17.0	206	17.5(3.1)	17.6	227	1.3(0.7)	56.8
직업									
전문·행정관리	162	8.6(2.7)	31.0	87	14.5(4.4)	30.1	75	0.0(0.0)	.
사무직	160	12.1(2.7)	22.5	84	20.6(4.6)	22.3	76	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	110	22.7(4.7)	20.9	44	42.0(8.0)	19.1	66	6.3(3.2)	50.9
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	158	9.3(2.5)	26.5	109	13.0(3.4)	26.3	49	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	310	5.2(1.7)	31.7	70	16.7(5.3)	31.5	240	0.7(0.5)	70.6
월 가구소득									
100만원 미만	54	14.6(5.9)	40.6	19	-(-)	-	35	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	44	7.1(3.9)	55.1	15	-(-)	-	29	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	121	8.8(3.1)	34.6	60	14.0(4.8)	34.3	61	2.7(1.8)	66.1
300-400만원 미만	157	10.9(2.6)	24.0	72	20.2(5.2)	25.5	85	1.2(1.2)	98.9
400만원 이상	521	10.2(1.4)	14.1	228	19.4(2.8)	14.6	293	1.2(0.7)	59.6

주 : 1) 평생 다른담배 사용 경험률 : (평생 다른담배를 사용한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 27> 현재 다른담배 사용 경험률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	4.6(0.7)	15.5	396	8.9(1.4)	15.6	506	0.5(0.3)	58.0
연령									
19-29	135	8.3(2.5)	30.4	56	15.9(4.8)	30.1	79	0.0(0.0)	.
30-39	188	5.7(1.7)	29.5	85	9.5(2.9)	30.6	103	2.0(1.4)	71.5
40-49	211	5.0(1.4)	27.1	96	9.7(2.8)	28.8	115	0.6(0.6)	101.1
50-59	182	3.1(1.4)	44.2	78	6.1(2.7)	43.7	104	0.0(0.0)	.
60-69	112	0.8(0.8)	101.0	48	1.8(1.8)	100.5	64	0.0(0.0)	.
70 이상	74	1.1(1.1)	97.8	33	2.3(2.2)	94.4	41	0.0(0.0)	.
19-64	780	5.1(0.8)	15.5	341	9.6(1.5)	15.6	439	0.6(0.3)	58.1
65 이상	122	1.4(1.0)	70.7	55	3.0(2.1)	69.3	67	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	25	0.0(0.0)	.	5	-(-)	-	20	0.0(0.0)	.
초등학교	50	0.0(0.0)	.	17	-(-)	-	33	0.0(0.0)	.
중학교	62	0.0(0.0)	.	22	0.0(0.0)	.	40	0.0(0.0)	.
고등학교	332	6.1(1.3)	21.8	146	12.0(2.6)	21.9	186	0.4(0.4)	99.3
대학교 이상	433	4.8(1.1)	22.5	206	8.2(1.9)	23.2	227	0.8(0.6)	72.1
직업									
전문·행정관리	162	5.5(2.0)	35.9	87	9.3(3.2)	34.9	75	0.0(0.0)	.
사무직	160	7.1(2.0)	27.7	84	12.0(3.4)	28.1	76	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	110	10.4(3.2)	30.5	44	19.8(6.1)	30.9	66	2.5(1.8)	71.1
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	158	2.8(1.3)	48.7	109	3.8(1.9)	49.1	49	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	310	1.7(0.9)	55.1	70	5.2(3.2)	60.8	240	0.3(0.3)	100.0
월 가구소득									
100만원 미만	54	7.4(4.5)	61.2	19	-(-)	-	35	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	44	0.0(0.0)	.	15	-(-)	-	29	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	121	4.1(2.2)	53.3	60	6.4(3.8)	58.3	61	1.2(1.2)	96.3
300-400만원 미만	157	4.6(1.7)	36.2	72	7.8(3.0)	38.8	85	1.2(1.2)	98.9
400만원 이상	521	5.0(1.0)	19.9	228	9.7(1.9)	19.9	293	0.3(0.3)	101.1

주 : 1) 현재 다른담배 사용 경험률 : (최근 1달 동안 다른담배를 사용한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 28> 현재흡연자 중 금연시도자의 금연방법¹⁾

(단위: %)

구분	N ²⁾	자신의 의지		니코틴 대체용품		금연초		보건소 금연클리닉		금연상담센터		의사 처방		금연침		기타	
		% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수
전체	114	92.1(2.0)	2.2	18.4(4.1)	22.1	7.0(3.3)	47.5	9.4(2.3)	24.4	4.4(1.8)	40.4	4.3(2.1)	49.0	3.2(2.0)	63.1	3.8(2.0)	51.8
성																	
남자	100	91.8(2.2)	2.4	19.3(4.6)	23.7	7.8(3.7)	47.1	10.5(2.6)	24.7	4.9(2.0)	41.1	4.2(2.3)	54.7	3.6(2.3)	62.9	4.2(2.2)	52.2
여자	14	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
연령																	
19-29	20	91.0(4.9)	5.4	19.5(10.1)	52.0	22.9(11.9)	52.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	7.4(7.0)	95.4	7.4(7.2)	97.7	6.1(5.9)	95.7
30-39	28	89.9(5.3)	5.9	29.8(7.6)	25.4	0.0(0.0)	.	19.5(6.4)	33.0	13.0(6.0)	46.1	6.6(4.4)	66.3	3.2(3.1)	99.5	3.4(3.4)	100.7
40-49	28	100.0(0.0)	0.0	8.8(5.0)	56.4	0.0(0.0)	.	3.6(3.5)	97.8	3.6(3.6)	100.6	0.0(0.0)	.	3.8(3.7)	98.6	3.8(3.7)	98.6
50-59	24	89.5(5.4)	6.0	20.0(8.4)	42.2	3.6(3.6)	97.8	14.1(6.8)	48.4	3.6(3.6)	97.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	3.4(3.5)	101.4
60-69	10	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
70 이상	4	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
19-64	106	92.3(2.0)	2.2	19.4(4.2)	21.8	7.4(3.5)	47.3	8.7(2.4)	27.7	4.6(1.9)	40.2	3.9(2.1)	54.4	3.4(2.2)	63.0	4.0(2.1)	51.8
65 이상	8	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
교육수준 ³⁾																	
무학	0	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	4	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
중학교	8	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
고등학교	50	93.2(2.6)	2.8	20.0(6.4)	32.2	9.3(5.4)	58.3	4.5(2.6)	58.2	3.1(2.2)	70.2	4.9(3.8)	77.3	3.8(3.8)	100.9	4.9(3.5)	72.3
대학교 이상	52	90.6(4.0)	4.4	18.8(4.9)	26.1	4.5(3.1)	69.6	13.3(4.1)	30.9	6.7(3.3)	49.5	3.3(2.3)	69.7	3.4(2.4)	70.5	3.5(2.5)	71.3
직업																	
전문행정관리	21	96.3(3.6)	3.7	14.6(8.4)	57.3	10.6(7.3)	68.7	8.2(5.8)	70.8	4.5(4.6)	100.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
사무직	26	89.0(6.2)	7.0	28.4(8.8)	30.8	0.0(0.0)	.	20.2(7.4)	36.5	6.6(4.6)	70.4	3.5(3.5)	100.4	0.0(0.0)	.	3.4(3.3)	99.2
판매·서비스직	19	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
농림어업	1	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	29	96.9(3.1)	3.2	9.2(4.4)	47.9	6.0(5.7)	95.6	6.4(4.6)	71.4	8.7(5.1)	58.2	2.8(2.8)	98.9	2.8(2.8)	98.9	0.0(0.0)	.
기타 ⁴⁾	18	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
월 가구소득																	
100만원 미만	8	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
100~200만원 미만	3	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
200~300만원 미만	18	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
300~400만원 미만	21	96.6(3.3)	3.5	21.7(9.1)	41.8	7.3(7.4)	101.3	10.5(5.7)	54.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	3.7(3.6)	97.9
400만원 이상	64	90.6(2.7)	3.0	16.5(5.3)	32.3	3.6(2.5)	68.1	9.9(3.5)	35.8	6.8(2.9)	42.9	6.9(3.6)	52.6	2.7(1.9)	69.9	5.6(3.2)	56.8

주 : 1) 현재흡연자 중 금연시도자의 금연방법 : (각 금연시도 경험 방법 / 현재흡연자 "매일 피움" 또는 "가끔 피움" 중 금연시도자) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 29> 연간 금연 시도 횟수¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	46	2.5(0.2)	9.5	40	2.7(0.3)	10.1	6	-(-)	-
연령									
19-29	11	-(-)	-	9	-(-)	-	2	-(-)	-
30-39	14	-(-)	-	12	-(-)	-	2	-(-)	-
40-49	13	-(-)	-	11	-(-)	-	2	-(-)	-
50-59	3	-(-)	-	3	-(-)	-	0	-(-)	-
60-69	4	-(-)	-	4	-(-)	-	0	-(-)	-
70 이상	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
19-64	43	2.5(0.2)	9.8	37	2.7(0.3)	10.4	6	-(-)	-
65 이상	3	-(-)	-	3	-(-)	-	0	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
초등학교	3	-(-)	-	3	-(-)	-	0	-(-)	-
중학교	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
고등학교	21	3.1(0.4)	11.9	20	3.2(0.4)	12.3	1	-(-)	-
대학교 이상	21	2.0(0.4)	19.5	16	-(-)	-	5	-(-)	-
직업									
전문행정관리	12	-(-)	-	12	-(-)	-	0	-(-)	-
사무직	10	-(-)	-	8	-(-)	-	2	-(-)	-
판매·서비스직	7	-(-)	-	6	-(-)	-	1	-(-)	-
농림어업	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	10	-(-)	-	10	-(-)	-	0	-(-)	-
기타 ³⁾	7	-(-)	-	4	-(-)	-	3	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 미만	3	-(-)	-	3	-(-)	-	0	-(-)	-
100-200만원 미만	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
200-300만원 미만	8	-(-)	-	6	-(-)	-	2	-(-)	-
300-400만원 미만	9	-(-)	-	9	-(-)	-	0	-(-)	-
400만원 이상	24	2.3(0.4)	18.4	20	2.5(0.5)	19.2	4	-(-)	-

주 : 1) 연간 금연 시도 횟수 : (최근 1년 동안 금연 시도 횟수의 총 합 / 최근 1년 동안 금연을 시도한 적이 있는 현재흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수)

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 30> 현재비흡연자의 공공장소 간접흡연 노출률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	751	92.5(1.0)	1.1	264	90.8(1.8)	2.0	487	93.7(1.0)	1.0
연령									
19-29	111	98.0(1.5)	1.5	38	97.0(3.0)	3.1	73	98.8(1.2)	1.2
30-39	149	92.7(2.2)	2.4	51	91.1(3.3)	3.6	98	93.6(2.7)	2.9
40-49	173	93.4(1.8)	1.9	63	91.6(3.8)	4.1	110	94.6(1.8)	2.0
50-59	149	89.7(2.6)	2.9	47	88.3(4.5)	5.1	102	90.6(2.7)	3.0
60-69	100	94.5(1.9)	2.1	37	97.4(2.7)	2.8	63	92.6(2.8)	3.0
70 이상	69	81.8(5.8)	7.1	28	71.6(9.4)	13.1	41	89.8(5.3)	5.9
19-64	638	93.4(0.9)	1.0	218	92.7(2.0)	2.2	420	93.9(0.9)	1.0
65 이상	113	86.7(3.9)	4.5	46	79.6(6.6)	8.3	67	92.2(3.6)	3.9
교육수준 ²⁾									
무학	25	100.0(0.0)	0.0	5	-(-)	-	20	100.0(0.0)	0.0
초등학교	45	88.9(5.7)	6.4	12	-(-)	-	33	92.5(4.4)	4.8
중학교	53	88.4(5.7)	6.4	13	-(-)	-	40	91.4(4.6)	5.0
고등학교	266	94.8(1.3)	1.3	89	94.6(2.9)	3.1	177	94.9(1.2)	1.3
대학교 이상	362	91.4(1.6)	1.8	145	89.8(2.7)	3.0	217	92.8(1.6)	1.7
직업									
전문행정관리	131	92.5(2.8)	3.0	57	90.9(4.0)	4.5	74	94.2(2.8)	2.9
사무직	128	92.7(2.1)	2.3	55	92.8(3.6)	3.9	73	92.7(2.7)	3.0
판매·서비스직	82	91.4(2.8)	3.0	22	89.2(6.3)	7.0	60	92.3(3.3)	3.6
농림어업	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	122	89.5(3.4)	3.8	75	89.2(4.0)	4.4	47	89.9(4.3)	4.8
기타 ³⁾	287	94.1(1.3)	1.4	54	91.3(3.6)	3.9	233	95.0(1.4)	1.5
월 가구소득									
100만원 미만	46	93.0(4.9)	5.3	11	-(-)	-	35	100.0(0.0)	0.0
100-200만원 미만	40	85.8(6.4)	7.4	12	-(-)	-	28	97.3(2.7)	2.8
200-300만원 미만	99	93.0(2.1)	2.3	43	93.4(3.1)	3.3	56	92.6(3.4)	3.7
300-400만원 미만	129	93.7(2.2)	2.3	46	93.1(4.0)	4.3	83	94.2(2.4)	2.5
400만원 이상	432	92.6(1.4)	1.5	150	92.5(2.0)	2.2	282	92.6(1.4)	1.6

주 : 1) 현재비흡연자의 공공장소 간접흡연 노출률 : (공공장소에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 경험이 있는 사람의 수 / 현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 31> 금연구역 인지율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	97.0(0.6)	0.6	396	97.5(0.8)	0.8	506	96.5(0.8)	0.8
연령									
19-29	135	97.0(1.5)	1.6	56	96.7(2.3)	2.4	79	97.3(1.9)	2.0
30-39	188	96.0(1.4)	1.5	85	96.5(1.9)	2.0	103	95.6(1.6)	1.7
40-49	211	98.1(1.0)	1.0	96	98.0(1.4)	1.5	115	98.2(1.3)	1.3
50-59	182	98.8(0.9)	0.9	78	100.0(0.0)	0.0	104	97.5(1.8)	1.8
60-69	112	97.4(1.9)	1.9	48	94.2(4.0)	4.3	64	100.0(0.0)	0.0
70 이상	74	90.1(3.4)	3.8	33	97.4(2.6)	2.7	41	83.5(6.1)	7.3
19-64	780	97.4(0.6)	0.6	341	97.4(0.8)	0.8	439	97.4(0.7)	0.8
65 이상	122	93.8(2.2)	2.4	55	98.3(1.7)	1.7	67	89.6(3.8)	4.3
교육수준 ²⁾									
무학	25	83.7(7.6)	9.1	5	-(-)	-	20	79.4(9.6)	12.1
초등학교	50	94.7(3.1)	3.3	17	-(-)	-	33	97.7(2.3)	2.4
중학교	62	98.0(2.0)	2.1	22	100.0(0.0)	0.0	40	96.8(3.1)	3.2
고등학교	332	97.6(0.9)	0.9	146	98.0(1.2)	1.2	186	97.1(1.4)	1.5
대학교 이상	433	97.2(0.7)	0.7	206	97.3(1.1)	1.2	227	97.1(0.9)	1.0
직업									
전문행정관리	162	97.8(1.3)	1.3	87	97.0(1.6)	1.7	75	98.9(1.1)	1.1
사무직	160	97.4(1.5)	1.6	84	95.5(2.5)	2.7	76	100.0(0.0)	0.0
판매·서비스직	110	98.8(1.2)	1.2	44	100.0(0.0)	0.0	66	97.8(2.2)	2.2
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	158	98.0(1.1)	1.2	109	98.4(1.2)	1.2	49	97.2(2.7)	2.8
기타 ³⁾	310	95.1(1.1)	1.1	70	97.2(2.0)	2.1	240	94.3(1.4)	1.5
월 가구소득									
100만원 미만	54	92.8(3.7)	4.0	19	-(-)	-	35	90.7(5.5)	6.1
100-200만원 미만	44	100.0(0.0)	0.0	15	-(-)	-	29	100.0(0.0)	0.0
200-300만원 미만	121	93.1(2.6)	2.8	60	90.9(4.1)	4.5	61	95.7(2.5)	2.6
300-400만원 미만	157	98.4(1.2)	1.2	72	98.7(1.2)	1.3	85	98.1(1.3)	1.3
400만원 이상	521	97.5(0.8)	0.8	228	98.7(0.8)	0.8	293	96.5(1.2)	1.2

주 : 1) 금연구역 인지율 : (금연구역이 “지정된 사실 및 구체적인 구역을 알고 있다” 또는 “지정된 사실은 알지만, 구체적으로 어느 구역인 지는 모른다”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 32> 효과적인 금연 프로그램¹⁾

(단위: %)

구분	N ²⁾	공익광고 (TV, 라디오, 포스터 등)		금연교육		금연클리닉		금연상담전화	
		% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수
전체	316	35.1(2.4)	6.8	15.1(2.3)	15.4	42.4(2.6)	6.1	7.4(1.6)	22.0
성									
남자	280	35.4(2.5)	7.2	15.8(2.5)	16.1	41.1(2.6)	6.3	7.7(1.8)	22.9
여자	36	31.9(7.6)	23.8	9.3(4.5)	49.1	54.4(7.9)	14.6	4.4(3.1)	70.9
연령									
19-29	32	32.8(8.7)	26.5	10.1(5.6)	55.4	57.1(9.7)	17.0	0.0(0.0)	.
30-39	67	32.2(5.9)	18.4	9.5(3.6)	38.3	53.9(6.5)	12.0	4.4(2.6)	58.8
40-49	84	31.8(5.5)	17.3	14.6(3.8)	26.3	45.7(5.7)	12.5	7.9(3.4)	43.5
50-59	66	43.0(6.3)	14.7	9.5(4.1)	43.1	40.9(5.9)	14.4	6.5(2.9)	43.6
60-69	44	33.7(7.4)	21.8	29.2(6.7)	22.9	21.1(5.3)	25.1	15.9(5.6)	35.2
70 이상	23	33.9(9.8)	29.0	40.8(11.6)	28.5	7.2(5.3)	73.3	18.1(12.3)	68.0
19-64	272	36.0(2.5)	7.1	10.9(1.9)	17.3	46.6(2.8)	5.9	6.6(1.5)	22.8
65 이상	44	28.2(7.6)	26.9	47.8(8.8)	18.3	10.1(5.2)	51.8	13.9(7.5)	54.0
교육수준 ³⁾									
무학	4	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	14	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
중학교	20	24.3(10.5)	43.1	13.5(7.6)	56.0	36.9(11.7)	31.8	25.3(10.7)	42.3
고등학교	117	38.2(5.0)	13.0	15.3(3.8)	25.1	39.7(5.4)	13.5	6.8(2.4)	35.4
대학교 이상	161	34.7(3.4)	9.9	10.5(2.5)	23.7	48.8(3.2)	6.5	6.1(2.1)	34.1
직업									
전문행정관리	64	27.4(6.3)	23.1	5.4(3.1)	58.1	59.8(6.3)	10.6	7.4(3.6)	48.8
사무직	64	42.9(5.9)	13.8	11.1(3.8)	34.5	41.4(6.3)	15.2	4.6(2.6)	55.3
판매·서비스직	45	38.6(6.9)	17.9	7.7(3.7)	47.5	50.1(7.4)	14.7	3.6(2.6)	71.3
농림어업	1	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	86	30.6(4.9)	16.0	27.9(5.8)	20.9	34.1(4.6)	13.6	7.4(2.8)	38.7
기타 ⁴⁾	56	40.0(6.2)	15.6	19.2(4.5)	23.5	29.1(5.6)	19.2	11.8(5.6)	47.5
월 가구소득									
100만원 미만	14	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
100-200만원 미만	11	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
200-300만원 미만	51	36.2(6.5)	17.9	18.8(5.9)	31.3	40.0(6.5)	16.2	5.0(3.1)	61.2
300-400만원 미만	59	30.3(5.2)	17.2	11.8(4.5)	38.2	42.8(6.7)	15.7	15.2(5.3)	35.1
400만원 이상	179	37.2(3.9)	10.6	13.0(2.5)	19.1	44.7(3.9)	8.7	5.1(1.7)	33.1

주 : 1) 효과적인 금연 프로그램 : (응답보기별 응답자 수 / 평생 5갑(100개비) 이상 피운 흡연자의 수) × 100

2) 평생 5갑(100개비) 이상 피운 흡연자의 수

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 33> 금연정책 강화 필요 영역¹⁾

(단위: %)

구분	금연구역 확대			금연구역 내 흡연 단속(과태료 인상)		금연클리닉 확대 운영		금연 교육 및 홍보 강화		더 강화할 정책이 없다	
	N	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수
전체	902	24.9(1.6)	6.5	37.0(1.8)	4.9	11.7(1.1)	9.2	19.1(1.3)	6.7	7.4(0.9)	12.9
성											
남자	396	23.5(2.3)	9.7	34.0(2.6)	7.7	14.4(1.6)	10.9	18.2(1.9)	10.6	10.0(1.4)	14.0
여자	506	26.3(2.0)	7.7	39.9(2.1)	5.3	9.0(1.4)	15.5	20.0(1.8)	8.8	4.8(1.1)	24.1
연령											
19-29	135	24.6(3.4)	13.7	52.8(4.2)	7.9	8.7(2.5)	28.2	8.2(2.5)	30.1	5.6(2.0)	35.9
30-39	188	25.4(3.6)	14.0	41.6(3.8)	9.2	15.9(2.7)	16.9	9.6(2.1)	22.2	7.4(2.1)	28.7
40-49	211	25.1(3.2)	12.7	33.6(3.6)	10.7	16.8(2.5)	14.6	20.3(2.6)	12.6	4.2(1.3)	31.7
50-59	182	21.7(3.7)	16.9	28.6(3.4)	11.8	10.1(2.3)	22.9	26.4(3.4)	13.0	13.2(2.7)	20.6
60-69	112	25.5(3.9)	15.5	29.9(4.0)	13.5	8.5(2.4)	28.6	32.2(4.5)	14.0	3.9(1.7)	43.0
70 이상	74	32.1(6.0)	18.6	28.7(6.0)	21.0	2.0(1.4)	71.4	27.4(6.4)	23.2	9.7(3.4)	35.2
19-64	780	23.8(1.7)	7.1	38.4(1.9)	5.0	12.7(1.2)	9.6	17.8(1.2)	6.8	7.3(1.0)	14.0
65 이상	122	33.6(5.2)	15.6	26.3(4.4)	16.9	3.6(1.9)	52.2	28.9(4.8)	16.7	7.7(2.4)	30.6
교육수준 ²⁾											
무학	25	29.8(9.4)	31.4	41.5(9.0)	21.7	3.6(3.6)	99.4	18.2(7.2)	39.5	6.9(6.2)	89.9
초등학교	50	31.6(6.8)	21.6	16.4(3.7)	22.4	3.4(2.3)	68.4	37.8(7.7)	20.5	10.9(4.7)	43.0
중학교	62	32.2(6.5)	20.0	26.7(5.8)	21.8	5.3(2.3)	44.6	26.2(6.1)	23.3	9.6(4.5)	47.2
고등학교	332	23.6(2.2)	9.3	37.4(2.9)	7.7	12.5(2.2)	17.4	21.5(1.9)	8.7	5.1(1.1)	22.0
대학교 이상	433	24.0(2.0)	8.3	40.1(2.4)	5.9	13.1(1.7)	13.1	14.2(1.6)	11.1	8.6(1.5)	17.1
직업											
전문행정관리	162	19.9(3.1)	15.8	38.2(3.8)	9.9	20.8(3.5)	16.8	18.5(3.2)	17.3	2.7(1.3)	49.8
사무직	160	20.9(3.0)	14.5	46.4(3.9)	8.4	13.0(2.5)	19.5	11.9(2.8)	23.7	7.9(2.2)	28.2
판매·서비스직	110	19.3(3.8)	20.0	37.0(5.4)	14.7	11.4(2.8)	24.8	18.9(4.0)	21.1	13.4(3.4)	25.0
농림어업	2	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	158	26.6(3.8)	14.3	33.2(3.9)	11.7	11.7(2.6)	22.1	21.9(3.7)	16.8	6.5(1.6)	25.4
기타 ³⁾	310	31.1(2.8)	9.1	33.5(3.3)	9.7	6.3(1.4)	21.8	21.3(2.3)	10.8	7.8(1.8)	22.8
월 가구소득											
100만원 미만	54	28.4(7.2)	25.3	21.5(6.6)	30.7	8.2(4.3)	52.8	33.3(5.1)	15.2	8.7(4.7)	54.1
100~200만원 미만	44	25.6(7.8)	30.3	30.4(6.6)	21.7	6.3(3.4)	53.5	30.2(6.2)	20.6	7.6(4.3)	57.5
200~300만원 미만	121	25.2(4.0)	15.9	35.4(4.3)	12.2	11.5(2.6)	22.6	20.7(3.9)	18.8	7.2(2.6)	36.5
300~400만원 미만	157	25.2(4.8)	19.0	42.5(5.0)	11.8	9.8(2.5)	25.4	15.5(2.8)	17.8	7.0(2.9)	41.9
400만원 이상	521	24.1(1.9)	7.9	38.0(2.5)	6.6	12.7(1.5)	11.8	17.6(1.6)	8.9	7.5(1.0)	14.0

주 : 1) 금연정책 강화 필요 영역 : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 제학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 34> 평생음주율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	93.4(0.8)	0.9	396	95.8(1.1)	1.2	506	91.1(1.2)	1.4
연령									
19-29	135	96.0(1.6)	1.7	56	97.9(2.1)	2.1	79	94.0(2.9)	3.1
30-39	188	98.9(0.8)	0.8	85	97.8(1.6)	1.6	103	100.0(0.0)	0.0
40-49	211	98.6(0.8)	0.8	96	99.1(0.9)	0.9	115	98.2(1.3)	1.3
50-59	182	93.3(1.9)	2.0	78	95.3(2.8)	2.9	104	91.2(2.8)	3.1
60-69	112	86.1(3.6)	4.2	48	93.8(3.6)	3.8	64	79.7(5.4)	6.7
70 이상	74	67.3(5.2)	7.8	33	77.6(7.3)	9.3	41	57.9(8.1)	14.1
19-64	780	96.3(0.8)	0.8	341	97.7(1.1)	1.1	439	94.9(1.2)	1.2
65 이상	122	71.3(3.4)	4.8	55	80.4(4.8)	5.9	67	63.1(5.5)	8.8
교육수준 ²⁾									
무학	25	69.3(9.4)	13.5	5	-(-)	-	20	66.2(11.1)	16.8
초등학교	50	79.1(4.4)	5.5	17	-(-)	-	33	70.5(6.3)	8.9
중학교	62	79.3(5.6)	7.1	22	81.2(8.9)	11.0	40	78.2(7.5)	9.6
고등학교	332	94.9(1.4)	1.5	146	96.1(2.1)	2.2	186	93.7(2.0)	2.1
대학교 이상	433	96.8(0.9)	0.9	206	97.4(1.1)	1.1	227	96.1(1.5)	1.6
직업									
전문·행정관리	162	94.7(1.9)	2.0	87	94.9(2.6)	2.7	75	94.4(3.1)	3.2
사무직	160	97.6(1.2)	1.3	84	98.8(1.2)	1.2	76	95.9(2.4)	2.5
판매·서비스직	110	95.5(1.8)	1.8	44	98.6(1.4)	1.4	66	93.0(3.0)	3.3
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	158	92.3(2.3)	2.5	109	94.1(2.4)	2.6	49	87.7(5.1)	5.8
기타 ³⁾	310	90.3(1.4)	1.6	70	93.8(2.5)	2.7	240	88.9(1.7)	1.9
월 가구소득									
100만원 미만	54	73.6(6.3)	8.5	19	-(-)	-	35	66.0(8.2)	12.4
100-200만원 미만	44	85.8(4.9)	5.7	15	-(-)	-	29	79.4(7.8)	9.8
200-300만원 미만	121	94.5(1.8)	1.9	60	98.2(1.8)	1.8	61	90.0(3.4)	3.8
300-400만원 미만	157	95.9(1.5)	1.6	72	96.2(2.2)	2.3	85	95.7(1.9)	2.0
400만원 이상	521	95.0(1.0)	1.0	228	96.3(1.4)	1.4	293	93.7(1.4)	1.5

주 : 1) 평생음주율 : (지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 35> 연간음주율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	82.3(1.4)	1.7	396	88.9(1.7)	2.0	506	75.9(2.2)	2.9
연령									
19-29	135	89.3(2.6)	2.9	56	93.8(3.6)	3.8	79	84.4(3.7)	4.4
30-39	188	90.0(2.4)	2.7	85	95.4(2.3)	2.4	103	84.9(4.5)	5.3
40-49	211	88.1(2.4)	2.7	96	90.7(2.9)	3.2	115	85.7(3.5)	4.1
50-59	182	80.5(3.1)	3.8	78	88.8(4.1)	4.6	104	72.0(4.9)	6.8
60-69	112	73.7(5.0)	6.8	48	88.5(4.6)	5.2	64	61.6(7.3)	11.8
70 이상	74	43.8(6.6)	15.1	33	52.5(9.5)	18.1	41	35.9(8.0)	22.3
19-64	780	86.4(1.4)	1.6	341	92.3(1.7)	1.8	439	80.6(2.3)	2.9
65 이상	122	50.9(4.9)	9.6	55	61.5(6.5)	10.5	67	41.4(6.3)	15.2
교육수준 ²⁾									
무학	25	46.9(12.0)	25.6	5	-(-)	-	20	43.5(12.8)	29.5
초등학교	50	59.3(5.6)	9.5	17	-(-)	-	33	47.4(8.9)	18.7
중학교	62	66.5(6.3)	9.4	22	74.5(10.7)	14.4	40	62.0(9.4)	15.1
고등학교	332	84.5(2.4)	2.8	146	89.6(3.1)	3.4	186	79.5(3.4)	4.3
대학교 이상	433	86.8(1.6)	1.8	206	91.0(2.0)	2.2	227	81.8(2.8)	3.4
직업									
전문·행정관리	162	87.9(2.5)	2.9	87	89.4(3.2)	3.6	75	85.7(4.4)	5.1
사무직	160	92.9(2.0)	2.1	84	96.6(2.0)	2.0	76	87.4(3.7)	4.2
판매·서비스직	110	85.0(3.8)	4.4	44	90.9(4.7)	5.2	66	80.0(5.6)	6.9
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	158	84.0(2.9)	3.5	109	87.6(3.2)	3.6	49	74.6(6.5)	8.8
기타 ³⁾	310	71.9(3.4)	4.8	70	80.2(4.6)	5.8	240	68.7(4.0)	5.8
월 가구소득									
100만원 미만	54	60.2(7.2)	12.0	19	-(-)	-	35	50.5(8.8)	17.5
100-200만원 미만	44	77.6(6.0)	7.7	15	-(-)	-	29	65.6(8.9)	13.5
200-300만원 미만	121	77.3(4.0)	5.2	60	84.6(5.0)	6.0	61	68.6(6.3)	9.2
300-400만원 미만	157	77.8(3.7)	4.8	72	85.4(4.2)	4.9	85	69.8(5.9)	8.5
400만원 이상	521	87.4(1.6)	1.8	228	92.0(1.8)	2.0	293	82.8(2.4)	3.0

주 : 1) 연간음주율 : (최근 1년 동안 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 36> 월간음주율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	65.9(1.6)	2.4	396	78.4(2.1)	2.7	506	53.8(2.3)	4.3
연령									
19-29	135	72.7(3.7)	5.1	56	84.2(5.0)	6.0	79	60.2(5.3)	8.8
30-39	188	79.0(3.4)	4.3	85	88.1(3.4)	3.9	103	70.2(5.3)	7.6
40-49	211	71.3(2.9)	4.0	96	80.9(3.9)	4.8	115	62.3(4.9)	7.8
50-59	182	64.0(3.8)	6.0	78	75.5(5.5)	7.3	104	52.3(5.6)	10.7
60-69	112	51.0(4.7)	9.3	48	79.6(5.8)	7.3	64	27.4(6.3)	22.8
70 이상	74	25.4(6.0)	23.8	33	35.8(9.0)	25.2	41	16.1(7.1)	44.2
19-64	780	70.4(1.5)	2.2	341	82.0(2.1)	2.5	439	58.9(2.4)	4.0
65 이상	122	32.1(4.2)	13.1	55	49.5(5.9)	11.9	67	16.4(5.3)	32.1
교육수준 ²⁾									
무학	25	23.2(9.1)	39.1	5	-(-)	-	20	13.6(7.4)	54.3
초등학교	50	33.9(7.0)	20.7	17	-(-)	-	33	15.8(6.8)	42.7
중학교	62	46.6(5.8)	12.4	22	51.6(11.0)	21.3	40	43.8(9.6)	21.8
고등학교	332	66.1(2.7)	4.1	146	78.3(3.3)	4.2	186	54.2(3.7)	6.8
대학교 이상	433	73.8(1.8)	2.4	206	82.6(2.9)	3.5	227	63.7(3.1)	4.8
직업									
전문행정관리	162	71.9(3.7)	5.1	87	80.8(4.5)	5.6	75	58.7(5.6)	9.6
사무직	160	80.1(3.1)	3.9	84	89.9(3.5)	3.9	76	66.1(5.6)	8.5
판매·서비스직	110	71.1(4.5)	6.3	44	83.7(5.6)	6.7	66	60.5(6.2)	10.2
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	158	64.1(3.8)	5.9	109	73.4(4.0)	5.5	49	39.9(7.4)	18.5
기타 ³⁾	310	54.3(3.3)	6.1	70	66.2(5.3)	7.9	240	49.6(4.1)	8.2
월 가구소득									
100만원 미만	54	40.1(7.6)	19.0	19	-(-)	-	35	31.3(9.5)	30.4
100-200만원 미만	44	66.2(8.1)	12.3	15	-(-)	-	29	56.2(8.9)	15.7
200-300만원 미만	121	53.0(4.4)	8.4	60	70.8(5.3)	7.5	61	31.6(6.8)	21.6
300-400만원 미만	157	65.7(4.5)	6.8	72	76.4(5.3)	7.0	85	54.4(6.1)	11.2
400만원 이상	521	71.4(1.8)	2.5	228	82.9(2.5)	3.0	293	60.2(2.8)	4.7

주 : 1) 월간음주율 : (최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 37> 연간음주자의 고위험음주율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	733	19.8(1.5)	7.6	350	30.4(2.4)	8.0	383	7.7(1.4)	18.4
연령									
19-29	122	22.5(3.9)	17.2	53	34.3(7.0)	20.4	69	8.3(3.2)	38.6
30-39	171	17.3(3.2)	18.6	81	26.6(5.0)	18.7	90	7.1(2.3)	32.9
40-49	184	21.4(2.9)	13.5	87	33.6(5.2)	15.5	97	9.2(3.7)	39.9
50-59	144	19.6(3.4)	17.6	69	28.7(5.7)	19.7	75	8.1(4.2)	52.3
60-69	80	20.7(4.6)	22.2	42	33.8(7.5)	22.1	38	5.2(3.7)	71.1
70 이상	32	5.9(4.0)	68.2	18	-(-)	-	14	-(-)	-
19-64	672	20.5(1.6)	7.7	315	31.4(2.5)	8.0	357	8.2(1.5)	18.4
65 이상	61	10.6(3.6)	33.7	35	18.4(6.4)	34.6	26	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	11	-(-)	-	3	-(-)	-	8	-(-)	-
초등학교	27	6.6(4.1)	62.1	13	-(-)	-	14	-(-)	-
중학교	40	11.2(4.3)	37.9	16	-(-)	-	24	3.0(2.9)	93.9
고등학교	279	22.3(2.4)	10.7	131	33.3(3.7)	11.0	148	10.2(2.8)	27.0
대학교 이상	376	19.9(2.3)	11.5	187	29.9(3.6)	11.9	189	7.1(1.7)	23.5
직업									
전문·행정관리	143	17.5(3.1)	17.7	78	26.1(5.0)	19.0	65	4.4(2.4)	54.0
사무직	147	21.2(3.3)	15.7	81	30.5(5.2)	17.2	66	6.4(2.6)	40.1
판매·서비스직	94	27.7(5.0)	18.0	40	43.9(7.8)	17.8	54	12.0(4.9)	40.7
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능·단순노무직	133	26.3(3.4)	13.1	95	34.4(4.4)	12.7	38	2.1(2.1)	100.0
기타 ³⁾	214	13.0(2.8)	21.3	54	21.4(6.7)	31.3	160	9.1(2.6)	29.0
월 가구소득									
100만원 미만	32	14.2(6.2)	43.8	14	-(-)	-	18	-(-)	-
100-200만원 미만	32	6.7(4.4)	65.0	14	-(-)	-	18	-(-)	-
200-300만원 미만	92	17.8(3.7)	20.7	51	22.7(5.6)	24.5	41	10.4(4.4)	41.7
300-400만원 미만	120	21.3(4.7)	21.9	61	28.8(6.7)	23.2	59	11.6(4.1)	35.5
400만원 이상	454	20.8(1.8)	8.7	209	34.0(3.1)	9.1	245	6.4(1.4)	22.4

주 : 1) 고위험음주율 : (최근 1년 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔) 이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 수 / 최근 1년 동안 음주한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 38> 전체 고위험음주율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	16.3(1.3)	7.8	396	27.0(2.2)	8.1	506	5.8(1.1)	18.6
연령									
19-29	135	20.1(3.5)	17.6	56	32.2(6.7)	20.8	79	7.0(2.8)	39.5
30-39	188	15.5(2.9)	18.7	85	25.3(4.9)	19.2	103	6.1(2.0)	32.9
40-49	211	18.9(2.5)	13.5	96	30.4(4.8)	15.8	115	7.9(3.2)	40.3
50-59	182	15.7(3.0)	18.8	78	25.5(5.1)	20.1	104	5.8(3.1)	53.4
60-69	112	15.3(3.5)	22.9	48	29.9(6.9)	23.2	64	3.2(2.3)	71.6
70 이상	74	2.6(1.8)	69.7	33	5.4(3.8)	70.3	41	0.0(0.0)	.
19-64	780	17.7(1.4)	7.7	341	28.9(2.3)	8.0	439	6.6(1.2)	18.6
65 이상	122	5.4(1.9)	34.5	55	11.3(4.1)	35.8	67	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	25	4.0(3.9)	96.8	5	-(-)	-	20	0.0(0.0)	.
초등학교	50	3.9(2.4)	62.3	17	-(-)	-	33	0.0(0.0)	.
중학교	62	7.5(2.8)	37.2	22	17.2(6.9)	40.4	40	1.9(1.8)	96.2
고등학교	332	18.8(2.1)	11.3	146	29.8(3.3)	11.2	186	8.1(2.2)	27.7
대학교 이상	433	17.3(2.0)	11.4	206	27.2(3.3)	12.0	227	5.8(1.3)	23.2
직업									
전문·행정관리	162	15.4(2.8)	18.0	87	23.3(4.5)	19.5	75	3.8(2.0)	53.6
사무직	160	19.7(3.1)	15.8	84	29.5(5.1)	17.2	76	5.6(2.3)	40.3
판매·서비스직	110	23.5(4.1)	17.5	44	39.9(7.0)	17.4	66	9.6(3.9)	40.7
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	158	22.1(3.0)	13.6	109	30.1(3.9)	12.9	49	1.5(1.5)	100.0
기타 ³⁾	310	9.3(2.1)	22.0	70	17.2(5.7)	33.2	240	6.2(1.8)	29.1
월 가구소득									
100만원 미만	54	8.5(3.8)	45.1	19	-(-)	-	35	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	44	5.2(3.5)	67.8	15	-(-)	-	29	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	121	13.7(2.7)	20.0	60	19.2(4.5)	23.5	61	7.2(3.0)	41.4
300-400만원 미만	157	16.5(4.0)	24.1	72	24.6(6.0)	24.5	85	8.1(3.1)	37.9
400만원 이상	521	18.1(1.6)	8.6	228	31.3(2.8)	8.8	293	5.3(1.2)	22.7

주 : 1) 전체 고위험음주율 : (최근 1년 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔) 이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 39> 연간 절주 또는 금주시도율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	733	13.9(1.5)	11.0	350	18.4(2.3)	12.7	383	8.9(1.6)	18.1
연령									
19-29	122	14.5(4.2)	29.2	53	16.6(6.0)	36.0	69	12.0(4.1)	34.5
30-39	171	17.6(2.9)	16.5	81	21.3(4.3)	20.1	90	13.6(3.4)	24.9
40-49	184	15.0(2.7)	18.2	87	23.0(4.6)	20.1	97	6.9(2.9)	41.6
50-59	144	10.7(2.8)	25.8	69	15.0(4.1)	27.6	75	5.3(2.2)	42.1
60-69	80	9.5(2.8)	29.5	42	10.6(3.8)	36.0	38	8.1(4.3)	52.9
70 이상	32	13.8(5.9)	42.7	18	-(-)	-	14	-(-)	-
19-64	672	14.3(1.7)	11.7	315	18.6(2.5)	13.7	357	9.5(1.7)	18.1
65 이상	61	9.0(3.6)	39.6	35	15.6(6.4)	40.9	26	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	11	-(-)	-	3	-(-)	-	8	-(-)	-
초등학교	27	0.0(0.0)	.	13	-(-)	-	14	-(-)	-
중학교	40	10.4(4.0)	38.1	16	-(-)	-	24	3.0(2.9)	93.9
고등학교	279	12.1(2.2)	18.0	131	16.0(3.5)	22.2	148	7.9(2.1)	27.1
대학교 이상	376	16.7(2.3)	14.0	187	20.6(3.3)	16.1	189	11.6(2.7)	23.5
직업									
전문·행정관리	143	17.1(3.9)	23.1	78	20.6(5.1)	24.8	65	11.7(4.3)	37.0
사무직	147	11.1(2.8)	24.8	81	12.3(3.7)	29.8	66	9.3(3.4)	36.2
판매·서비스직	94	16.1(3.6)	22.1	40	22.8(6.5)	28.3	54	9.6(3.2)	33.8
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	133	16.1(3.5)	21.8	95	21.4(4.6)	21.3	38	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	214	11.6(2.3)	19.5	54	16.5(5.1)	31.1	160	9.3(2.2)	23.9
월 가구소득									
100만원 미만	32	17.7(6.0)	33.9	14	-(-)	-	18	-(-)	-
100-200만원 미만	32	10.7(5.6)	52.4	14	-(-)	-	18	-(-)	-
200-300만원 미만	92	18.5(4.1)	22.0	51	25.6(5.8)	22.6	41	7.9(2.9)	36.7
300-400만원 미만	120	14.3(3.9)	27.0	61	15.5(5.8)	37.7	59	12.8(4.4)	34.6
400만원 이상	454	13.1(1.8)	13.4	209	17.5(2.9)	16.4	245	8.2(1.9)	22.8

주 : 1) 연간 절주 또는 금주시도율 : (최근 1년 동안 절주나 금주를 시도한 적이 있는 사람의 수 / 최근 1년 동안 음주한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 40> 연간 음주폐해 경험률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	2.2(0.6)	25.6	396	2.6(0.9)	33.8	506	1.8(0.6)	32.1
연령									
19-29	135	3.9(1.6)	41.7	56	5.5(3.1)	57.3	79	2.2(0.9)	43.7
30-39	188	4.1(1.5)	36.5	85	4.7(2.2)	46.2	103	3.6(2.1)	59.6
40-49	211	1.2(0.7)	56.2	96	1.1(1.0)	98.0	115	1.4(1.0)	71.8
50-59	182	1.4(0.8)	55.9	78	1.0(1.0)	97.8	104	1.8(1.3)	68.6
60-69	112	0.9(0.9)	99.3	48	2.0(1.9)	96.8	64	0.0(0.0)	.
70 이상	74	0.0(0.0)	.	33	0.0(0.0)	.	41	0.0(0.0)	.
19-64	780	2.5(0.6)	25.6	341	3.0(1.0)	33.8	439	2.0(0.6)	31.9
65 이상	122	0.0(0.0)	.	55	0.0(0.0)	.	67	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	25	0.0(0.0)	.	5	-(-)	-	20	0.0(0.0)	.
초등학교	50	2.0(2.0)	99.4	17	-(-)	-	33	0.0(0.0)	.
중학교	62	0.0(0.0)	.	22	0.0(0.0)	.	40	0.0(0.0)	.
고등학교	332	2.1(0.9)	42.7	146	3.8(1.8)	46.6	186	0.4(0.4)	99.3
대학교 이상	433	2.7(0.8)	30.7	206	1.9(1.0)	50.5	227	3.7(1.2)	31.8
직업									
전문·행정관리	162	3.7(1.6)	44.0	87	3.8(2.2)	57.9	75	3.6(2.5)	70.7
사무직	160	2.6(1.3)	49.9	84	3.3(1.9)	58.1	76	1.6(1.6)	99.7
판매·서비스직	110	5.0(2.1)	41.7	44	7.8(4.3)	54.8	66	2.7(1.1)	41.0
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	158	0.0(0.0)	.	109	0.0(0.0)	.	49	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	310	1.3(0.5)	41.5	70	1.0(1.0)	101.7	240	1.4(0.6)	44.8
월 가구소득									
100만원 미만	54	4.4(2.9)	64.4	19	-(-)	-	35	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	44	3.3(3.4)	101.0	15	-(-)	-	29	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	121	1.9(1.8)	96.2	60	3.5(3.3)	93.9	61	0.0(0.0)	.
300-400만원 미만	157	2.4(1.2)	51.6	72	4.7(2.4)	51.5	85	0.0(0.0)	.
400만원 이상	521	1.9(0.7)	35.4	228	0.8(0.5)	71.1	293	3.0(1.0)	31.9

주 : 1) 연간 음주폐해 경험률 : (최근 1년 동안 타인의 음주로 인하여 소란, 폭행, 성추행, 작업 또는 일상생활 중 사고(몸을 다침), 음주운전 사고 등을 경험한 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 41> 운전자식 안전벨트 착용률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	583	93.6(1.0)	1.0	336	91.3(1.5)	1.6	247	97.4(1.0)	1.0
연령									
19-29	47	93.2(3.9)	4.2	29	90.4(5.4)	6.0	18	-(-)	-
30-39	150	92.7(2.2)	2.3	83	89.4(3.6)	4.0	67	97.4(1.8)	1.9
40-49	177	93.0(2.0)	2.2	94	91.3(3.0)	3.2	83	95.3(2.3)	2.4
50-59	135	93.6(2.0)	2.1	74	90.5(2.9)	3.3	61	98.9(1.1)	1.1
60-69	56	96.4(2.4)	2.5	40	95.1(3.1)	3.3	16	-(-)	-
70 이상	18	-(-)	-	16	-(-)	-	2	-(-)	-
19-64	545	93.2(1.0)	1.1	301	90.5(1.6)	1.7	244	97.4(1.0)	1.0
65 이상	38	100.0(0.0)	0.0	35	100.0(0.0)	0.0	3	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	3	-(-)	-	2	-(-)	-	1	-(-)	-
초등학교	12	-(-)	-	9	-(-)	-	3	-(-)	-
중학교	23	90.8(6.5)	7.1	15	-(-)	-	8	-(-)	-
고등학교	203	92.7(2.0)	2.1	123	89.1(3.0)	3.4	80	99.1(0.9)	0.9
대학교 이상	342	94.4(1.2)	1.3	187	93.3(1.8)	2.0	155	96.2(1.6)	1.7
직업									
전문·행정관리	140	94.8(1.7)	1.8	83	95.8(1.9)	2.0	57	92.8(3.7)	4.0
사무직	133	92.3(2.7)	2.9	82	88.7(3.9)	4.4	51	100.0(0.0)	0.0
판매·서비스직	62	92.0(3.6)	3.9	35	88.6(5.6)	6.4	27	97.4(2.7)	2.8
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	111	89.2(2.7)	3.0	97	87.9(3.0)	3.4	14	-(-)	-
기타 ³⁾	135	97.9(1.3)	1.3	37	96.7(3.2)	3.3	98	98.5(1.1)	1.1
월 가구소득									
100만원 미만	17	-(-)	-	12	-(-)	-	5	-(-)	-
100-200만원 미만	11	-(-)	-	6	-(-)	-	5	-(-)	-
200-300만원 미만	71	96.1(1.8)	1.9	50	96.1(2.0)	2.1	21	96.0(3.8)	4.0
300-400만원 미만	104	96.0(2.0)	2.1	62	94.6(2.5)	2.7	42	98.3(1.7)	1.8
400만원 이상	377	92.8(1.4)	1.5	205	89.8(2.2)	2.5	172	97.2(1.3)	1.3

주 : 1) 운전자식 안전벨트 착용률 : (자동차 운전 시 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수 / 자동차 운전자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 42> 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	852	89.6(1.2)	1.3	382	88.3(1.6)	1.8	470	90.8(1.4)	1.5
연령									
19-29	131	81.4(3.6)	4.4	56	83.6(5.0)	5.9	75	78.8(5.0)	6.4
30-39	179	87.3(3.0)	3.5	84	84.8(4.6)	5.5	95	89.9(2.9)	3.2
40-49	204	89.3(2.2)	2.5	94	85.7(3.3)	3.9	110	92.8(2.2)	2.3
50-59	171	95.9(1.6)	1.6	71	94.6(2.8)	3.0	100	97.1(1.5)	1.6
60-69	105	92.7(2.7)	2.9	45	91.9(3.8)	4.2	60	93.4(3.7)	4.0
70 이상	62	96.2(2.8)	2.9	32	97.5(2.5)	2.5	30	94.6(3.8)	4.0
19-64	743	88.8(1.4)	1.5	328	87.2(1.9)	2.1	415	90.4(1.5)	1.6
65 이상	109	95.6(2.3)	2.4	54	96.9(2.2)	2.3	55	94.2(3.3)	3.6
교육수준 ²⁾									
무학	19	-(-)	-	5	-(-)	-	14	-(-)	-
초등학교	45	97.9(2.1)	2.2	17	-(-)	-	28	100.0(0.0)	0.0
중학교	57	93.2(3.4)	3.6	18	-(-)	-	39	94.8(3.7)	3.9
고등학교	317	89.2(1.7)	1.9	140	84.5(2.8)	3.3	177	93.9(1.8)	1.9
대학교 이상	414	88.3(1.7)	2.0	202	90.7(2.2)	2.4	212	85.4(2.3)	2.7
직업									
전문·행정관리	157	90.1(2.3)	2.6	86	89.9(3.5)	3.9	71	90.4(2.8)	3.1
사무직	156	85.8(3.5)	4.0	83	85.2(4.7)	5.5	73	86.5(4.7)	5.4
판매·서비스직	102	85.2(3.3)	3.8	39	79.9(6.1)	7.7	63	89.4(3.4)	3.8
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능·단순노무직	150	90.9(2.2)	2.4	103	90.0(2.8)	3.1	47	93.1(3.5)	3.8
기타 ³⁾	285	92.1(1.9)	2.0	69	92.1(3.8)	4.2	216	92.1(2.0)	2.1
월 가구소득									
100만원 미만	49	84.0(6.2)	7.4	18	-(-)	-	31	78.2(9.8)	12.5
100-200만원 미만	42	90.0(5.3)	5.9	15	-(-)	-	27	91.8(5.8)	6.3
200-300만원 미만	111	90.5(3.0)	3.3	56	89.2(4.7)	5.2	55	92.2(3.1)	3.4
300-400만원 미만	147	93.0(2.3)	2.4	69	94.2(2.2)	2.4	78	91.6(3.7)	4.0
400만원 이상	498	88.7(1.5)	1.7	222	86.0(2.3)	2.7	276	91.3(1.6)	1.8

주 : 1) 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률 : (다른 사람이 운전하는 자동차나 택시 앞좌석에 탈 때 안전벨트를 "항상 맨다"에 응답한 사람의 수 / 동승차량 앞좌석 탑승자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 43> 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	809	15.9(1.3)	7.9	339	14.6(1.9)	12.7	470	17.0(1.8)	10.8
연령									
19-29	129	11.9(2.8)	23.2	52	9.2(4.4)	47.6	77	14.8(4.4)	29.6
30-39	172	12.2(3.0)	24.9	76	7.2(3.3)	45.2	96	17.0(4.4)	25.6
40-49	186	16.3(2.9)	17.5	82	19.3(4.2)	21.8	104	13.7(3.6)	26.0
50-59	157	11.4(2.5)	21.6	63	13.1(4.9)	37.2	94	9.8(2.5)	25.5
60-69	100	26.2(5.2)	19.9	40	20.0(5.8)	29.2	60	30.9(7.1)	23.1
70 이상	65	32.1(6.2)	19.2	26	34.6(10.1)	29.2	39	30.1(7.5)	25.0
19-64	703	14.2(1.3)	9.1	297	12.7(1.9)	15.0	406	15.6(2.0)	12.6
65 이상	106	29.0(4.5)	15.7	42	31.8(7.3)	23.0	64	26.8(5.4)	20.3
교육수준 ²⁾									
무학	24	33.6(8.8)	26.3	4	-(-)	-	20	35.1(9.2)	26.3
초등학교	44	28.4(6.2)	21.8	14	-(-)	-	30	21.7(6.7)	30.9
중학교	54	19.5(5.3)	27.2	18	-(-)	-	36	20.9(5.9)	28.2
고등학교	299	13.1(2.0)	15.0	125	11.0(3.0)	27.1	174	15.0(3.0)	19.7
대학교 이상	388	15.5(2.1)	13.4	178	15.2(2.7)	17.9	210	15.9(2.7)	16.8
직업									
전문·행정관리	143	18.6(3.5)	18.7	74	20.2(4.4)	21.9	69	16.4(4.4)	27.0
사무직	141	14.1(2.9)	20.8	74	13.3(3.9)	29.2	67	15.4(3.8)	24.9
판매·서비스직	98	12.7(3.4)	26.5	38	9.8(4.1)	42.0	60	15.0(4.7)	31.5
농림어업	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	139	12.3(2.7)	22.1	92	12.4(3.5)	28.5	47	11.9(4.3)	36.4
기타 ³⁾	287	18.4(2.4)	12.9	60	16.3(4.9)	30.3	227	19.2(2.9)	15.3
월 가구소득									
100만원 미만	52	19.3(5.4)	28.3	18	-(-)	-	34	14.9(5.3)	35.6
100-200만원 미만	42	36.7(9.0)	24.6	13	-(-)	-	29	34.9(10.6)	30.3
200-300만원 미만	109	15.3(3.5)	23.0	50	13.9(5.4)	38.9	59	16.9(5.2)	31.0
300-400만원 미만	133	13.4(3.5)	26.2	59	10.0(4.1)	40.9	74	16.8(4.6)	27.5
400만원 이상	468	14.5(1.5)	10.4	197	13.7(2.4)	17.7	271	15.3(2.1)	13.9

주 : 1) 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률 : (다른 사람이 운전하는 자동차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 "항상 맨다"에 응답한 사람의 수 / 동승차량 뒷좌석 탑승자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 제학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 44> 버스 안전벨트 착용률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	680	58.0(1.8)	3.1	267	57.2(3.1)	5.4	413	58.7(2.6)	4.5
연령									
19-29	121	48.5(4.7)	9.7	47	46.6(7.6)	16.4	74	50.4(5.9)	11.8
30-39	135	55.2(3.9)	7.2	57	59.7(6.0)	10.1	78	51.2(5.2)	10.1
40-49	139	65.8(4.1)	6.2	56	61.6(6.6)	10.7	83	69.0(5.8)	8.4
50-59	136	59.8(5.2)	8.6	46	66.3(7.1)	10.6	90	55.6(5.2)	9.3
60-69	89	63.8(4.3)	6.7	35	57.7(8.0)	13.8	54	68.2(5.9)	8.6
70 이상	60	58.9(6.4)	10.9	26	53.9(12.1)	22.5	34	63.1(7.3)	11.5
19-64	584	57.1(2.0)	3.6	227	56.3(3.4)	6.0	357	57.7(2.9)	5.0
65 이상	96	64.6(5.1)	8.0	40	63.9(9.6)	15.0	56	65.1(5.9)	9.0
교육수준 ²⁾									
무학	21	45.2(9.7)	21.4	4	-(-)	-	17	-(-)	-
초등학교	40	59.0(8.1)	13.8	12	-(-)	-	28	72.5(7.8)	10.8
중학교	51	48.1(6.9)	14.4	16	-(-)	-	35	49.4(8.6)	17.4
고등학교	237	57.9(3.1)	5.4	88	57.1(5.9)	10.4	149	58.5(3.7)	6.3
대학교 이상	331	60.2(2.7)	4.4	147	60.9(4.1)	6.7	184	59.5(4.3)	7.3
직업									
전문·행정관리	124	63.9(4.6)	7.1	59	64.8(7.2)	11.2	65	62.8(5.7)	9.1
사무직	115	64.1(3.7)	5.8	57	71.3(5.2)	7.2	58	55.5(7.1)	12.8
판매·서비스직	80	53.4(5.1)	9.6	25	48.4(9.1)	18.9	55	56.5(7.0)	12.5
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능·단순노무직	103	55.5(4.6)	8.2	67	49.0(6.1)	12.4	36	69.2(6.8)	9.9
기타 ³⁾	256	55.3(3.3)	6.0	57	51.2(8.1)	15.8	199	56.9(3.6)	6.4
월 가구소득									
100만원 미만	48	50.9(6.1)	12.0	16	-(-)	-	32	59.4(8.0)	13.5
100-200만원 미만	35	63.8(8.4)	13.2	11	-(-)	-	24	79.9(7.8)	9.8
200-300만원 미만	80	63.4(6.1)	9.6	35	64.9(8.8)	13.5	45	62.0(7.5)	12.1
300-400만원 미만	104	53.1(5.5)	10.4	37	62.5(8.0)	12.7	67	46.9(6.0)	12.9
400만원 이상	408	58.3(2.7)	4.7	166	57.7(4.0)	6.9	242	58.8(3.7)	6.2

주 : 1) 버스 안전벨트 착용률 : (버스(광역 시내버스, 시외버스, 전세버스)를 탈 때 안전벨트를 "항상 맨다"에 응답한 사람의 수 / 버스(광역 시내버스, 시외버스, 전세버스) 탑승자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 45> 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	583	5.4(0.9)	17.4	336	6.8(1.3)	19.7	247	2.9(0.9)	32.4
연령									
19-29	47	2.4(2.4)	100.2	29	3.4(3.4)	99.8	18	-(-)	-
30-39	150	6.3(2.0)	31.9	83	5.9(2.6)	43.7	67	6.7(2.8)	42.5
40-49	177	7.2(2.0)	28.4	94	10.9(3.5)	31.7	83	2.3(1.6)	71.0
50-59	135	3.9(1.7)	44.6	74	6.1(2.8)	45.2	61	0.0(0.0)	.
60-69	56	6.9(2.8)	40.4	40	6.7(3.1)	45.9	16	-(-)	-
70 이상	18	-(-)	-	16	-(-)	-	2	-(-)	-
19-64	545	5.5(1.0)	17.7	301	7.2(1.5)	20.2	244	2.9(0.9)	32.4
65 이상	38	2.3(2.3)	100.1	35	2.5(2.5)	100.1	3	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	3	-(-)	-	2	-(-)	-	1	-(-)	-
초등학교	12	-(-)	-	9	-(-)	-	3	-(-)	-
중학교	23	4.1(4.1)	97.8	15	-(-)	-	8	-(-)	-
고등학교	203	5.9(1.6)	28.0	123	7.8(2.4)	31.0	80	2.5(1.7)	68.0
대학교 이상	342	5.1(1.2)	22.5	187	6.2(1.7)	27.9	155	3.4(1.3)	39.4
직업									
전문·행정관리	140	3.6(1.5)	43.0	83	5.5(2.4)	43.2	57	0.0(0.0)	.
사무직	133	9.6(2.7)	28.7	82	11.6(3.7)	31.5	51	5.2(3.1)	58.8
판매·서비스직	62	4.3(2.6)	60.2	35	2.4(2.5)	103.0	27	7.4(5.4)	72.4
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	111	6.6(2.4)	35.9	97	7.4(2.6)	35.5	14	-(-)	-
기타 ³⁾	135	1.6(0.9)	53.7	37	0.0(0.0)	.	98	2.5(1.3)	53.7
월 가구소득									
100만원 미만	17	-(-)	-	12	-(-)	-	5	-(-)	-
100-200만원 미만	11	-(-)	-	6	-(-)	-	5	-(-)	-
200-300만원 미만	71	3.7(1.8)	48.4	50	3.6(2.0)	54.3	21	4.0(4.0)	100.7
300-400만원 미만	104	2.9(1.8)	60.4	62	3.3(2.5)	75.5	42	2.3(2.3)	100.3
400만원 이상	377	6.4(1.2)	18.6	205	8.6(1.9)	21.4	172	3.1(1.1)	36.1

주 : 1) 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이) : (최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 적이 있는 사람의 수 / 자동차 또는 오토바이 운전자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 46> 연간 음주운전차량 동승경험률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	6.3(0.8)	11.9	396	8.6(1.3)	15.1	506	4.1(1.0)	23.5
연령									
19-29	135	6.5(2.3)	34.7	56	8.7(3.8)	43.8	79	4.1(2.8)	68.0
30-39	188	10.7(2.3)	21.7	85	15.4(3.6)	23.1	103	6.2(2.5)	40.7
40-49	211	8.2(2.1)	26.0	96	10.4(3.2)	30.7	115	6.1(2.1)	35.2
50-59	182	3.7(1.2)	33.2	78	4.4(2.2)	49.9	104	3.0(1.3)	43.2
60-69	112	3.2(1.5)	47.1	48	5.3(2.9)	54.6	64	1.4(1.4)	98.1
70 이상	74	1.6(1.5)	99.2	33	3.3(3.2)	98.5	41	0.0(0.0)	.
19-64	780	6.8(0.8)	12.0	341	9.1(1.4)	15.7	439	4.7(1.1)	23.5
65 이상	122	2.5(1.3)	54.4	55	5.2(2.8)	53.2	67	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	25	4.0(3.9)	96.8	5	-(-)	-	20	0.0(0.0)	.
초등학교	50	1.8(1.8)	100.9	17	-(-)	-	33	0.0(0.0)	.
중학교	62	0.0(0.0)	.	22	0.0(0.0)	.	40	0.0(0.0)	.
고등학교	332	6.8(1.4)	20.2	146	8.6(2.4)	28.5	186	5.1(1.8)	35.3
대학교 이상	433	7.5(1.2)	16.1	206	9.7(2.0)	20.5	227	4.9(1.4)	29.1
직업									
전문·행정관리	162	6.2(2.0)	32.4	87	7.4(3.1)	42.0	75	4.4(2.2)	49.6
사무직	160	7.7(2.0)	25.7	84	8.9(3.0)	33.7	76	5.9(2.0)	32.9
판매·서비스직	110	4.8(2.4)	49.3	44	10.5(5.1)	48.8	66	0.0(0.0)	.
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	158	9.2(2.5)	27.6	109	12.8(3.4)	26.3	49	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	310	4.9(1.4)	27.5	70	3.4(2.0)	59.2	240	5.5(1.7)	30.5
월 가구소득									
100만원 미만	54	3.1(2.0)	64.8	19	-(-)	-	35	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	44	5.1(3.8)	74.2	15	-(-)	-	29	2.9(2.9)	99.4
200-300만원 미만	121	6.8(3.0)	43.5	60	12.6(5.3)	42.1	61	0.0(0.0)	.
300-400만원 미만	157	4.4(1.4)	33.2	72	6.5(2.8)	42.3	85	2.1(0.8)	41.1
400만원 이상	521	7.3(1.1)	14.8	228	8.5(1.8)	21.2	293	6.1(1.5)	24.8

주 : 1) 연간 음주운전차량 동승경험률 : (최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 사람이 운전하는 자동차를 탄 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 47> 자전거 헬멧 착용률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	244	14.0(2.6)	18.8	146	16.8(3.6)	21.3	98	8.7(2.7)	31.0
연령									
19-29	37	7.5(4.3)	57.8	16	-(-)	-	21	9.4(6.5)	69.9
30-39	64	10.1(3.9)	38.6	34	15.0(5.9)	39.1	30	3.3(3.2)	98.3
40-49	64	13.1(5.3)	40.1	38	15.0(6.5)	43.3	26	9.8(5.5)	56.5
50-59	37	21.3(7.5)	35.2	21	25.4(10.3)	40.7	16	-(-)	-
60-69	28	24.0(8.7)	36.2	25	23.3(9.5)	40.9	3	-(-)	-
70 이상	14	-(-)	-	12	-(-)	-	2	-(-)	-
19-64	215	12.6(2.7)	21.7	121	15.3(3.9)	25.2	94	8.2(2.8)	33.9
65 이상	29	25.2(8.3)	32.9	25	25.4(9.2)	36.3	4	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	2	-(-)	-	1	-(-)	-	1	-(-)	-
초등학교	6	-(-)	-	6	-(-)	-	0	-(-)	-
중학교	12	-(-)	-	9	-(-)	-	3	-(-)	-
고등학교	71	12.6(3.5)	27.6	48	10.6(3.7)	34.6	23	18.3(7.1)	39.0
대학교 이상	153	13.3(3.2)	23.7	82	18.5(4.9)	26.6	71	6.1(2.7)	45.1
직업									
전문·행정관리	48	7.5(5.3)	70.4	31	10.9(7.5)	69.0	17	-(-)	-
사무직	58	18.9(6.2)	32.9	31	19.1(8.8)	45.8	27	18.5(8.1)	43.7
판매·서비스직	28	9.2(5.4)	59.0	15	-(-)	-	13	-(-)	-
농림어업	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	51	24.8(6.1)	24.7	42	27.2(6.8)	25.1	9	-(-)	-
기타 ³⁾	59	8.1(3.8)	46.3	27	10.3(6.3)	61.5	32	5.3(3.8)	71.4
월 가구소득									
100만원 미만	9	-(-)	-	7	-(-)	-	2	-(-)	-
100-200만원 미만	10	-(-)	-	6	-(-)	-	4	-(-)	-
200-300만원 미만	30	22.3(8.1)	36.2	26	22.2(8.8)	39.8	4	-(-)	-
300-400만원 미만	33	17.0(7.8)	45.7	16	-(-)	-	17	-(-)	-
400만원 이상	160	9.7(2.9)	29.9	89	11.8(4.4)	37.0	71	6.4(2.9)	45.9

주 : 1) 자전거 헬멧 착용률 : (자전거 탈 때 헬멧을 "항상 착용한다"에 응답한 사람의 수 / 자전거 운전자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 48> 연간 자전거 음주운전 경험률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	244	7.3(1.6)	22.2	146	11.1(2.5)	22.7	98	0.0(0.0)	.
연령									
19-29	37	6.0(4.0)	68.0	16	-(-)	-	21	0.0(0.0)	.
30-39	64	6.9(2.5)	35.8	34	11.9(4.5)	37.6	30	0.0(0.0)	.
40-49	64	8.7(3.5)	40.9	38	13.4(5.6)	41.4	26	0.0(0.0)	.
50-59	37	6.2(4.0)	64.7	21	9.4(6.0)	64.3	16	-(-)	-
60-69	28	9.8(5.6)	57.2	25	10.8(6.1)	56.4	3	-(-)	-
70 이상	14	-(-)	-	12	-(-)	-	2	-(-)	-
19-64	215	7.1(1.8)	24.9	121	11.3(2.9)	25.5	94	0.0(0.0)	.
65 이상	29	8.8(4.7)	53.0	25	9.9(5.2)	53.0	4	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	2	-(-)	-	1	-(-)	-	1	-(-)	-
초등학교	6	-(-)	-	6	-(-)	-	0	-(-)	-
중학교	12	-(-)	-	9	-(-)	-	3	-(-)	-
고등학교	71	5.7(2.9)	50.5	48	7.7(3.8)	49.5	23	0.0(0.0)	.
대학교 이상	153	7.8(2.1)	26.9	82	13.3(3.6)	27.2	71	0.0(0.0)	.
직업									
전문·행정관리	48	7.5(4.2)	55.3	31	11.0(6.2)	56.3	17	-(-)	-
사무직	58	8.1(3.8)	46.3	31	13.8(6.5)	47.3	27	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	28	3.9(3.9)	98.9	15	-(-)	-	13	-(-)	-
농림어업	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	51	9.7(4.0)	41.2	42	11.5(4.6)	40.4	9	-(-)	-
기타 ³⁾	59	5.8(2.3)	40.3	27	10.3(4.2)	40.8	32	0.0(0.0)	.
월 가구소득									
100만원 미만	9	-(-)	-	7	-(-)	-	2	-(-)	-
100-200만원 미만	10	-(-)	-	6	-(-)	-	4	-(-)	-
200-300만원 미만	30	6.5(2.8)	42.7	26	7.2(3.1)	43.3	4	-(-)	-
300-400만원 미만	33	3.1(2.9)	93.9	16	-(-)	-	17	-(-)	-
400만원 이상	160	7.9(2.2)	27.5	89	12.7(3.5)	27.7	71	0.0(0.0)	.

주 : 1) 연간 자전거 음주운전 경험률 : (최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자전거를 운전한 적이 있는 사람의 수 / 자전거 운전자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 49> 걷기 실천율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	52.1(1.9)	3.6	396	53.9(2.4)	4.5	506	50.3(2.6)	5.1
연령									
19-29	135	60.8(4.2)	7.0	56	63.9(6.1)	9.5	79	57.4(5.6)	9.8
30-39	188	46.0(4.3)	9.3	85	50.7(5.4)	10.6	103	41.4(5.2)	12.7
40-49	211	46.6(3.3)	7.1	96	45.2(4.5)	9.9	115	47.9(3.8)	7.9
50-59	182	51.9(4.2)	8.1	78	49.8(6.0)	12.1	104	53.9(4.9)	9.1
60-69	112	58.9(5.0)	8.4	48	60.8(7.7)	12.6	64	57.4(6.3)	11.0
70 이상	74	52.7(5.8)	10.9	33	64.9(7.8)	12.0	41	41.6(7.9)	19.1
19-64	780	51.4(2.2)	4.2	341	52.5(2.6)	5.0	439	50.3(2.7)	5.4
65 이상	122	57.7(3.9)	6.7	55	65.6(6.1)	9.3	67	50.5(5.9)	11.7
교육수준 ²⁾									
무학	25	41.9(9.9)	23.5	5	-(-)	-	20	36.7(10.8)	29.5
초등학교	50	51.1(7.3)	14.2	17	-(-)	-	33	47.1(9.4)	20.0
중학교	62	53.5(6.3)	11.9	22	48.4(12.5)	25.9	40	56.3(7.6)	13.6
고등학교	332	57.8(2.8)	4.9	146	57.4(4.1)	7.1	186	58.1(3.7)	6.3
대학교 이상	433	47.8(2.8)	5.8	206	51.5(3.3)	6.5	227	43.6(3.7)	8.6
직업									
전문·행정관리	162	46.8(3.9)	8.4	87	47.3(5.2)	10.9	75	46.0(6.2)	13.4
사무직	160	49.9(4.1)	8.2	84	54.8(5.6)	10.2	76	43.0(6.0)	13.9
판매·서비스직	110	60.6(4.8)	7.9	44	59.7(6.7)	11.2	66	61.4(6.1)	10.0
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	158	62.0(3.0)	4.8	109	59.1(3.8)	6.5	49	69.3(6.6)	9.5
기타 ³⁾	310	48.1(3.3)	6.8	70	51.9(7.0)	13.5	240	46.6(3.8)	8.1
월 가구소득									
100만원 미만	54	36.4(6.3)	17.4	19	-(-)	-	35	34.4(5.7)	16.6
100-200만원 미만	44	53.1(7.8)	14.7	15	-(-)	-	29	45.0(10.1)	22.4
200-300만원 미만	121	57.1(4.9)	8.6	60	54.5(6.8)	12.5	61	60.1(6.6)	11.0
300-400만원 미만	157	50.8(4.5)	8.9	72	55.2(6.2)	11.3	85	46.1(4.8)	10.4
400만원 이상	521	52.6(2.6)	5.0	228	53.4(3.5)	6.6	293	51.7(3.5)	6.7

주 : 1) 걷기 실천율 : (최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 50> 지역사회 내 운동시설 접근율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	89.3(1.0)	1.2	396	88.8(1.6)	1.8	506	89.7(1.3)	1.4
연령									
19-29	135	86.3(2.7)	3.2	56	93.1(3.3)	3.6	79	78.9(4.8)	6.1
30-39	188	87.7(2.1)	2.4	85	82.0(3.4)	4.1	103	93.1(2.3)	2.5
40-49	211	88.6(2.0)	2.2	96	87.8(3.4)	3.9	115	89.3(2.1)	2.4
50-59	182	90.6(2.3)	2.6	78	89.2(3.9)	4.3	104	92.0(2.6)	2.8
60-69	112	90.4(2.5)	2.8	48	86.1(4.2)	4.8	64	94.0(2.5)	2.7
70 이상	74	98.1(1.1)	1.2	33	100.0(0.0)	0.0	41	96.4(2.1)	2.2
19-64	780	88.6(1.2)	1.3	341	87.9(1.8)	2.1	439	89.2(1.4)	1.6
65 이상	122	94.7(1.8)	1.9	55	96.3(2.6)	2.7	67	93.2(2.5)	2.7
교육수준 ²⁾									
무학	25	93.4(4.0)	4.3	5	-(-)	-	20	91.7(5.0)	5.4
초등학교	50	95.1(3.4)	3.5	17	-(-)	-	33	95.0(3.1)	3.3
중학교	62	92.3(3.2)	3.5	22	94.0(5.9)	6.2	40	91.3(3.6)	4.0
고등학교	332	88.4(1.7)	1.9	146	85.6(3.2)	3.7	186	91.1(1.7)	1.9
대학교 이상	433	88.8(1.6)	1.8	206	90.1(2.1)	2.3	227	87.2(2.2)	2.5
직업									
전문·행정관리	162	87.9(2.3)	2.7	87	86.9(3.3)	3.7	75	89.4(3.2)	3.5
사무직	160	91.6(2.4)	2.6	84	94.9(2.6)	2.7	76	87.0(3.4)	3.9
판매·서비스직	110	90.2(2.6)	2.8	44	96.5(2.4)	2.5	66	84.9(4.4)	5.2
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	158	85.6(3.3)	3.9	109	84.7(3.9)	4.5	49	88.0(5.1)	5.8
기타 ³⁾	310	90.8(1.5)	1.7	70	86.9(3.8)	4.3	240	92.3(1.6)	1.8
월 가구소득									
100만원 미만	54	84.9(7.6)	8.9	19	-(-)	-	35	87.0(6.9)	8.0
100-200만원 미만	44	87.2(6.6)	7.6	15	-(-)	-	29	84.8(9.1)	10.7
200-300만원 미만	121	89.8(2.4)	2.7	60	86.1(3.9)	4.5	61	94.3(2.8)	3.0
300-400만원 미만	157	85.7(3.1)	3.6	72	80.2(4.6)	5.8	85	91.5(2.9)	3.1
400만원 이상	521	90.7(1.4)	1.5	228	92.6(1.6)	1.8	293	88.9(2.0)	2.2

주 : 1) 지역사회 내 운동시설 접근율 : (최근 1년 동안 본인이 거주하고 있는 지역에서 운동을 할 수 있는 장소를 찾기 "매우 쉬웠다" 또는 "쉬운 편이었다"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 51> 월간 규칙적 운동실천율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	47.3(1.8)	3.9	396	52.4(3.0)	5.7	506	42.4(2.1)	4.9
연령									
19-29	135	39.0(4.6)	11.7	56	50.9(7.1)	13.8	79	26.0(6.2)	23.9
30-39	188	44.2(4.2)	9.5	85	45.3(5.3)	11.7	103	43.0(5.3)	12.4
40-49	211	46.6(3.6)	7.8	96	50.6(5.8)	11.5	115	42.6(4.9)	11.6
50-59	182	51.7(4.4)	8.6	78	55.8(5.4)	9.7	104	47.5(6.1)	12.8
60-69	112	60.7(5.0)	8.2	48	62.5(7.4)	11.8	64	59.3(5.7)	9.6
70 이상	74	48.1(5.3)	11.1	33	56.1(8.7)	15.5	41	40.9(7.2)	17.6
19-64	780	46.6(2.0)	4.2	341	51.8(3.1)	6.0	439	41.6(2.4)	5.7
65 이상	122	52.8(4.5)	8.6	55	57.5(7.2)	12.5	67	48.6(5.4)	11.0
교육수준 ²⁾									
무학	25	42.4(8.0)	18.8	5	-(-)	-	20	43.0(9.5)	22.2
초등학교	50	35.2(6.6)	18.8	17	-(-)	-	33	38.3(9.1)	23.7
중학교	62	48.7(6.8)	13.9	22	59.6(11.8)	19.7	40	42.5(8.1)	19.1
고등학교	332	46.2(3.1)	6.8	146	49.4(4.7)	9.5	186	43.0(3.4)	8.0
대학교 이상	433	49.6(2.5)	5.0	206	55.8(3.7)	6.6	227	42.4(3.5)	8.3
직업									
전문행정관리	162	51.2(4.0)	7.9	87	57.1(5.0)	8.8	75	42.4(5.4)	12.8
사무직	160	48.4(3.6)	7.5	84	49.4(5.1)	10.3	76	47.0(6.1)	12.9
판매·서비스직	110	39.7(4.8)	12.1	44	47.6(8.1)	17.0	66	32.9(5.5)	16.8
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	158	45.1(4.0)	8.9	109	49.8(4.8)	9.5	49	33.1(6.1)	18.4
기타 ³⁾	310	49.4(3.4)	7.0	70	58.4(7.1)	12.1	240	45.8(3.5)	7.6
월 가구소득									
100만원 미만	54	34.4(5.8)	16.9	19	-(-)	-	35	33.6(5.6)	16.7
100-200만원 미만	44	32.4(6.6)	20.2	15	-(-)	-	29	30.0(9.5)	31.7
200-300만원 미만	121	52.7(5.4)	10.2	60	54.4(8.0)	14.7	61	50.7(6.4)	12.6
300-400만원 미만	157	41.7(4.8)	11.4	72	49.8(6.5)	13.2	85	33.2(5.2)	15.6
400만원 이상	521	50.0(2.1)	4.2	228	55.1(3.3)	5.9	293	45.1(2.9)	6.4

주 : 1) 월간 규칙적 운동 실천율 : 최근 1달 동안 규칙적으로 운동을 하고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 52> 아침식사빈도 및 아침결식예방 인구비율¹⁾

(단위: %)

구분	N	0일		1-2일		3-4일		5-7일	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	902	12.1(1.3)	10.7	9.5(1.0)	10.9	11.1(1.1)	9.6	67.2(1.8)	2.7
성									
남자	396	12.6(1.8)	14.4	10.7(1.5)	14.2	12.3(1.6)	13.0	64.4(2.5)	3.9
여자	506	11.7(1.4)	12.3	8.4(1.4)	16.6	10.0(1.2)	12.0	70.0(2.0)	2.9
연령									
19-29	135	21.3(3.8)	17.8	16.6(3.4)	20.4	8.6(2.3)	27.3	53.5(4.1)	7.7
30-39	188	19.5(3.5)	17.7	11.1(2.6)	23.4	20.0(3.0)	15.2	49.4(3.9)	7.9
40-49	211	11.3(2.4)	21.0	9.8(1.8)	18.2	14.8(2.6)	17.5	64.0(3.8)	6.0
50-59	182	4.7(1.9)	39.7	8.0(2.1)	25.8	9.3(2.0)	21.6	78.1(3.0)	3.8
60-69	112	6.9(2.8)	41.2	2.5(1.4)	54.7	3.3(2.3)	69.5	87.4(4.0)	4.5
70 이상	74	1.1(1.1)	97.9	0.0(0.0)	.	1.1(1.1)	99.1	97.7(1.5)	1.5
19-64	780	13.2(1.4)	10.9	10.7(1.1)	10.5	12.5(1.2)	9.6	63.7(1.9)	2.9
65 이상	122	4.0(1.7)	42.8	0.6(0.6)	100.6	0.7(0.7)	99.1	94.7(1.9)	2.0
교육수준 ²⁾									
무학	25	4.0(3.9)	96.8	3.3(3.2)	96.3	3.9(3.7)	94.9	88.8(5.7)	6.4
초등학교	50	0.0(0.0)	.	2.0(2.0)	99.4	0.0(0.0)	.	98.0(2.0)	2.0
중학교	62	1.2(1.2)	97.9	2.6(1.9)	73.0	11.2(4.7)	41.9	85.0(4.9)	5.8
고등학교	332	12.8(2.3)	18.2	10.7(1.9)	17.3	10.1(1.7)	17.0	66.4(2.6)	3.9
대학교 이상	433	14.8(1.7)	11.3	10.6(1.5)	14.3	13.4(1.7)	12.5	61.2(2.4)	3.9
직업									
전문행정관리	162	15.0(3.5)	23.1	9.2(2.1)	22.5	12.8(2.8)	21.9	63.0(4.0)	6.3
사무직	160	11.6(2.6)	22.2	11.1(2.7)	24.0	14.6(3.1)	21.3	62.7(4.1)	6.5
판매·서비스직	110	18.8(4.5)	23.8	11.3(3.1)	27.3	10.2(3.1)	30.3	59.6(4.6)	7.7
농림어업	2	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	158	9.2(2.2)	23.8	9.0(2.6)	28.6	7.4(2.1)	28.2	74.4(3.3)	4.5
기타 ³⁾	310	9.9(1.8)	18.5	8.5(1.6)	19.1	10.5(1.7)	16.6	71.1(2.3)	3.3
월 가구소득									
100만원 미만	54	7.7(4.5)	57.8	7.6(3.5)	45.6	4.7(3.0)	64.3	80.0(5.0)	6.3
100-200만원 미만	44	7.9(3.4)	42.4	10.8(4.8)	44.1	6.5(4.4)	68.4	74.8(7.2)	9.6
200-300만원 미만	121	13.3(3.8)	28.5	7.4(3.5)	47.0	10.7(2.8)	25.7	68.6(5.4)	7.8
300-400만원 미만	157	12.4(3.1)	24.9	10.2(2.9)	28.5	9.8(2.3)	23.7	67.7(4.7)	7.0
400만원 이상	521	12.7(1.8)	14.5	10.0(1.5)	14.6	12.7(1.4)	11.3	64.7(2.4)	3.7

주 : 1) 아침결식예방 인구비율 : (최근 1주일 동안 5일 이상 아침식사를 한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 53> 영양표시 인지율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	65.2(1.6)	2.5	396	60.7(2.4)	3.9	506	69.5(2.0)	2.9
연령									
19-29	135	69.2(3.8)	5.4	56	66.5(5.8)	8.8	79	72.1(4.6)	6.4
30-39	188	72.8(3.8)	5.2	85	71.2(5.3)	7.4	103	74.3(4.3)	5.8
40-49	211	71.2(4.2)	5.8	96	66.3(5.2)	7.9	115	75.9(4.3)	5.7
50-59	182	61.7(3.8)	6.2	78	57.2(5.6)	9.7	104	66.2(5.0)	7.5
60-69	112	58.8(3.3)	5.6	48	45.9(7.0)	15.3	64	69.4(5.9)	8.5
70 이상	74	35.8(6.5)	18.0	33	30.4(7.6)	25.0	41	40.7(8.2)	20.1
19-64	780	68.1(1.7)	2.5	341	63.5(2.6)	4.0	439	72.7(2.1)	2.9
65 이상	122	42.3(4.5)	10.7	55	38.9(6.0)	15.3	67	45.4(6.0)	13.2
교육수준 ²⁾									
무학	25	33.1(8.7)	26.2	5	-(-)	-	20	36.8(8.9)	24.3
초등학교	50	51.5(6.2)	11.9	17	-(-)	-	33	50.8(7.9)	15.5
중학교	62	57.1(6.5)	11.3	22	45.7(12.3)	26.8	40	63.7(7.8)	12.3
고등학교	332	67.5(2.5)	3.7	146	59.9(4.3)	7.2	186	74.8(3.0)	4.0
대학교 이상	433	67.3(2.3)	3.4	206	64.2(3.2)	5.1	227	70.9(3.0)	4.2
직업									
전문·행정관리	162	71.6(3.6)	5.0	87	69.4(5.3)	7.6	75	74.9(5.0)	6.6
사무직	160	68.8(3.8)	5.5	84	62.1(5.6)	9.0	76	78.4(4.8)	6.2
판매·서비스직	110	65.7(3.9)	6.0	44	60.0(6.9)	11.6	66	70.6(5.4)	7.7
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	158	58.6(4.3)	7.3	109	55.9(5.0)	8.9	49	65.7(7.1)	10.8
기타 ³⁾	310	62.7(2.9)	4.6	70	55.2(5.5)	9.9	240	65.7(3.0)	4.6
월 가구소득									
100만원 미만	54	52.5(7.2)	13.8	19	-(-)	-	35	60.0(8.1)	13.5
100-200만원 미만	44	69.6(6.7)	9.6	15	-(-)	-	29	74.3(8.8)	11.9
200-300만원 미만	121	66.1(5.3)	8.0	60	60.3(5.4)	9.0	61	73.1(7.2)	9.8
300-400만원 미만	157	64.2(3.6)	5.7	72	63.9(5.6)	8.8	85	64.4(4.9)	7.5
400만원 이상	521	66.6(2.4)	3.6	228	61.3(3.3)	5.4	293	71.7(2.7)	3.8

주 : 1) 영양표시 인지율 : (영양표시를 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 54> 영양표시 독해율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	25.3(1.3)	5.1	396	16.2(1.7)	10.4	506	34.2(2.3)	6.6
연령									
19-29	135	26.5(3.8)	14.3	56	24.5(5.6)	22.7	79	28.6(5.2)	18.2
30-39	188	34.0(3.8)	11.1	85	19.0(3.9)	20.3	103	48.5(5.2)	10.7
40-49	211	27.3(3.1)	11.3	96	14.9(3.4)	22.8	115	39.1(4.9)	12.5
50-59	182	20.2(3.0)	14.7	78	11.1(3.4)	30.6	104	29.3(4.9)	16.6
60-69	112	25.0(4.0)	15.8	48	17.8(6.4)	36.2	64	31.0(5.9)	19.0
70 이상	74	9.8(4.1)	41.9	33	2.7(2.7)	99.7	41	16.1(7.0)	43.2

주 : 1) 영양표시 독해율 : (가공식품을 사거나 고를 때 영양표시를 읽는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

<표 55> 영양표시 활용률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	241	78.3(2.8)	3.6	61	78.4(4.8)	6.1	180	78.3(3.4)	4.3
연령									
19-29	37	69.3(8.0)	11.6	14	-(-)	-	23	65.3(8.7)	13.4
30-39	65	78.3(5.0)	6.4	15	-(-)	-	50	80.0(6.5)	8.1
40-49	63	88.3(5.0)	5.6	15	-(-)	-	48	88.6(4.9)	5.6
50-59	42	74.7(7.8)	10.5	9	-(-)	-	33	69.0(9.4)	13.6
60-69	28	77.5(8.2)	10.6	7	-(-)	-	21	83.1(8.3)	10.0
70 이상	6	-(-)	-	1	-(-)	-	5	-(-)	-

주 : 1) 영양표시 활용률 : (영양표시 내용이 가공식품을 고를 때 영향을 미친다고 응답한 사람의 수 / 가공식품을 사거나 고를 때 영양표시를 읽는 사람의 수) × 100

<표 56> 저염식 실천 노력 경험률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	60.3(1.8)	2.9	396	52.0(2.6)	5.0	506	68.4(2.1)	3.1
연령									
19-29	135	40.3(4.6)	11.5	56	34.3(7.2)	21.0	79	46.8(6.1)	13.0
30-39	188	53.2(3.8)	7.1	85	40.9(5.4)	13.3	103	65.0(4.6)	7.0
40-49	211	65.4(3.7)	5.6	96	58.4(5.2)	8.9	115	72.1(4.1)	5.7
50-59	182	71.1(3.6)	5.0	78	63.5(5.4)	8.5	104	78.8(4.3)	5.4
60-69	112	69.7(4.5)	6.5	48	53.6(7.7)	14.4	64	83.0(4.9)	5.9
70 이상	74	70.4(6.1)	8.7	33	73.9(7.7)	10.5	41	67.2(8.1)	12.1
19-64	780	59.1(1.8)	3.1	341	50.3(2.6)	5.2	439	67.7(2.4)	3.5
65 이상	122	69.7(4.8)	6.9	55	65.5(7.3)	11.1	67	73.5(5.4)	7.4
교육수준 ²⁾									
무학	25	77.4(7.7)	9.9	5	-(-)	-	20	76.5(9.6)	12.5
초등학교	50	65.7(7.7)	11.8	17	-(-)	-	33	66.1(7.9)	12.0
중학교	62	69.9(6.2)	8.9	22	71.9(9.6)	13.4	40	68.7(8.5)	12.4
고등학교	332	63.0(2.8)	4.5	146	50.3(4.1)	8.1	186	75.4(3.4)	4.5
대학교 이상	433	55.4(2.4)	4.2	206	49.9(3.3)	6.6	227	61.8(3.3)	5.3
직업									
전문·행정관리	162	54.9(4.1)	7.5	87	47.4(5.8)	12.2	75	65.9(5.3)	8.1
사무직	160	58.0(4.0)	6.9	84	53.5(5.0)	9.4	76	64.5(6.4)	9.9
판매·서비스직	110	52.6(4.9)	9.3	44	37.9(7.4)	19.5	66	65.1(6.5)	10.0
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	158	63.0(4.1)	6.5	109	58.3(4.7)	8.0	49	74.9(6.6)	8.8
기타 ³⁾	310	66.1(2.8)	4.2	70	56.4(5.9)	10.5	240	70.0(3.1)	4.4
월 가구소득									
100만원 미만	54	68.7(8.0)	11.6	19	-(-)	-	35	73.5(8.8)	12.0
100-200만원 미만	44	65.8(8.5)	12.9	15	-(-)	-	29	64.4(9.4)	14.6
200-300만원 미만	121	63.8(5.1)	8.0	60	57.0(6.2)	10.9	61	71.9(6.9)	9.6
300-400만원 미만	157	56.3(4.9)	8.6	72	51.4(6.6)	12.8	85	61.5(5.9)	9.6
400만원 이상	521	59.4(2.2)	3.6	228	49.2(3.1)	6.3	293	69.4(2.8)	4.0

주 : 1) 저염식 실천 노력 경험률 : (평균 덜 짜게 먹으려고 "항상 노력한다" 또는 "대체로 노력한다"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 57> 비만도 분포¹⁾ 및 비만율²⁾(자가보고)

(단위: %)

구분	N	비만도 분포 ¹⁾						체질량지수(BMI)	
		저체중		정상		비만(비만율) ²⁾		평균 (표준오차)	변동계수
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수		
전체	900	4.8(0.8)	16.6	65.0(1.6)	2.4	30.3(1.5)	5.1	23.8(0.1)	0.6
성									
남자	395	1.5(0.7)	44.3	61.8(2.5)	4.0	36.7(2.4)	6.4	24.7(0.2)	0.7
여자	505	7.9(1.4)	17.5	68.1(2.1)	3.1	24.0(1.9)	7.9	22.8(0.2)	0.7
연령									
19-29	135	8.6(2.2)	25.8	69.4(4.0)	5.8	22.0(3.9)	17.8	23.2(0.4)	1.9
30-39	186	8.0(2.3)	28.8	69.7(3.3)	4.7	22.4(2.9)	13.1	23.1(0.3)	1.2
40-49	211	4.9(1.4)	28.9	58.0(3.6)	6.2	37.2(3.5)	9.5	24.2(0.3)	1.2
50-59	182	1.0(0.7)	70.7	67.1(3.5)	5.2	32.0(3.5)	11.0	23.9(0.2)	0.9
60-69	112	2.3(1.2)	51.0	53.1(4.5)	8.4	44.6(4.5)	10.0	24.6(0.3)	1.1
70 이상	74	1.0(0.9)	97.8	74.8(5.0)	6.7	24.3(5.1)	21.0	23.7(0.4)	1.6
19-64	778	5.2(0.9)	17.0	64.0(1.7)	2.7	30.7(1.7)	5.5	23.7(0.1)	0.6
65 이상	122	1.3(0.9)	68.8	72.1(3.6)	5.0	26.6(3.6)	13.6	23.9(0.3)	1.1
교육수준 ³⁾									
무학	25	0.0(0.0)	.	50.7(10.1)	20.0	49.3(10.1)	20.5	24.7(0.5)	2.0
초등학교	50	2.9(1.7)	60.4	61.8(6.5)	10.5	35.3(6.6)	18.7	24.1(0.4)	1.6
중학교	62	0.0(0.0)	.	73.6(5.8)	7.9	26.4(5.8)	21.9	24.0(0.5)	2.0
고등학교	332	4.8(1.1)	23.3	62.9(2.6)	4.2	32.3(2.6)	8.1	24.0(0.2)	0.9
대학교 이상	431	5.9(1.3)	21.7	66.4(2.2)	3.3	27.8(2.0)	7.3	23.4(0.2)	0.7
직업									
전문행정관리	162	6.0(1.7)	28.5	61.6(4.0)	6.4	32.4(4.1)	12.6	24.0(0.3)	1.3
사무직	158	2.5(1.3)	51.8	68.7(4.0)	5.8	28.8(3.8)	13.0	23.6(0.3)	1.1
판매·서비스직	110	3.8(1.7)	43.1	62.6(4.2)	6.7	33.5(4.2)	12.5	24.0(0.4)	1.7
농림어업	2	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	158	2.4(1.5)	59.9	59.4(4.0)	6.7	38.2(3.9)	10.2	24.5(0.3)	1.1
기타 ⁴⁾	310	6.9(1.7)	24.3	68.4(2.9)	4.2	24.7(2.6)	10.7	23.3(0.2)	1.0
월 가구소득									
100만원 미만	54	3.2(2.1)	67.2	67.9(6.3)	9.3	29.0(6.1)	21.0	23.9(0.3)	1.4
100-200만원 미만	44	8.1(4.8)	60.0	59.2(7.7)	12.9	32.8(7.6)	23.2	23.4(0.5)	2.3
200-300만원 미만	121	2.4(1.3)	55.2	60.9(5.0)	8.2	36.7(5.0)	13.7	24.5(0.5)	1.9
300-400만원 미만	156	5.3(2.5)	46.4	66.6(4.0)	5.9	28.0(3.3)	11.6	23.7(0.3)	1.1
400만원 이상	520	4.9(0.9)	18.6	65.3(2.2)	3.4	29.7(2.3)	7.6	23.6(0.2)	0.8

주 : 1) 비만도 분포 : 저체중(BMI<18.5), 정상(18.5≤BMI<25), 비만(BMI≥25)

2) 비만율 : (체질량지수(kg/m²) 25 이상인 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 58> 남자 비만도 분포¹⁾ 및 비만율²⁾(자가보고)

(단위: %)

구분	N	비만도 분포 ¹⁾						체질량지수(BMI)	
		저체중		정상		비만(비만율) ²⁾		평균 (표준오차)	변동계수
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수		
남자	395	1.5(0.7)	44.3	61.8(2.5)	4.0	36.7(2.4)	6.4	24.7(0.2)	0.7
연령									
19-29	56	3.4(2.3)	67.5	65.0(5.7)	8.8	31.5(5.4)	17.0	24.9(0.6)	2.4
30-39	84	0.0(0.0)	.	68.6(4.7)	6.9	31.4(4.7)	15.1	24.8(0.4)	1.6
40-49	96	2.5(1.7)	68.8	49.5(5.0)	10.0	48.0(4.9)	10.1	25.3(0.4)	1.4
50-59	78	1.0(1.0)	99.8	64.6(6.3)	9.8	34.4(6.3)	18.3	24.2(0.3)	1.2
60-69	48	0.0(0.0)	.	54.7(8.0)	14.6	45.3(8.0)	17.7	24.9(0.4)	1.6
70 이상	33	0.0(0.0)	.	75.7(6.7)	8.8	24.3(6.7)	27.4	23.4(0.5)	2.2
19-64	340	1.7(0.7)	44.0	60.5(2.7)	4.4	37.8(2.5)	6.7	24.8(0.2)	0.7
65 이상	55	0.0(0.0)	.	72.1(5.9)	8.1	27.9(5.9)	21.0	23.8(0.4)	1.6
교육수준 ³⁾									
무학	5	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	17	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
중학교	22	0.0(0.0)	.	83.0(8.2)	9.9	17.0(8.2)	48.5	23.3(0.5)	2.2
고등학교	146	3.0(1.5)	49.7	60.4(3.6)	6.0	36.6(3.6)	9.8	24.8(0.3)	1.2
대학교 이상	205	0.6(0.6)	99.3	61.2(3.4)	5.5	38.2(3.2)	8.5	24.8(0.2)	0.8
직업									
전문행정관리	87	1.5(1.5)	99.3	56.1(5.4)	9.7	42.4(5.3)	12.6	25.2(0.3)	1.3
사무직	83	0.0(0.0)	.	61.0(5.4)	8.8	39.0(5.4)	13.8	24.8(0.4)	1.4
판매·서비스직	44	4.2(3.0)	69.8	62.4(6.8)	10.9	33.4(6.5)	19.6	24.4(0.5)	2.1
농림어업	2	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	109	2.6(1.9)	71.7	57.5(4.9)	8.5	40.0(5.1)	12.7	24.7(0.4)	1.5
기타 ⁴⁾	70	0.0(0.0)	.	73.0(6.1)	8.3	27.0(6.1)	22.5	24.4(0.5)	2.2
월 가구소득									
100만원 미만	19	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
100-200만원 미만	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
200-300만원 미만	60	1.6(1.5)	97.5	64.5(6.1)	9.4	33.9(6.0)	17.7	24.6(0.5)	2.2
300-400만원 미만	71	1.6(1.5)	97.9	67.1(4.6)	6.8	31.3(4.6)	14.8	24.3(0.3)	1.4
400만원 이상	228	0.7(0.7)	100.0	58.9(3.6)	6.2	40.5(3.6)	8.9	25.1(0.3)	1.0

주 : 1) 비만도 분포 : 저체중(BMI<18.5), 정상(18.5≤BMI<25), 비만(BMI≥25)

2) 비만율 : (체질량지수(kg/m²) 25 이상인 사람의 수 / 남자 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 59> 여자 비만도 분포¹⁾ 및 비만율²⁾(자가보고)

(단위: %)

구분	N	비만도 분포 ¹⁾						체질량지수(BMI)	
		저체중		정상		비만(비만율) ²⁾		평균 (표준오차)	변동계수
		%(표준오차) 변동계수	%(표준오차) 변동계수	%(표준오차) 변동계수	%(표준오차) 변동계수	%(표준오차) 변동계수	%(표준오차) 변동계수		
여자	505	7.9(1.4)	17.5	68.1(2.1)	3.1	24.0(1.9)	7.9	22.8(0.2)	0.7
연령									
19-29	79	14.2(4.0)	28.0	74.2(4.9)	6.5	11.6(3.1)	27.0	21.3(0.3)	1.6
30-39	102	15.7(4.3)	27.3	70.7(4.8)	6.7	13.6(3.3)	24.5	21.5(0.3)	1.5
40-49	115	7.1(2.4)	33.2	66.0(4.4)	6.7	26.8(4.5)	16.8	23.2(0.4)	1.7
50-59	104	0.9(0.9)	100.2	69.6(4.0)	5.7	29.5(4.0)	13.5	23.7(0.3)	1.3
60-69	64	4.2(2.2)	51.7	51.8(6.5)	12.6	44.0(6.6)	14.9	24.4(0.4)	1.6
70 이상	41	1.8(1.9)	102.1	74.0(7.2)	9.7	24.2(7.0)	28.8	23.9(0.4)	1.8
19-64	438	8.7(1.6)	17.9	67.5(2.2)	3.3	23.8(2.0)	8.5	22.7(0.2)	0.7
65 이상	67	2.4(1.7)	70.4	72.2(5.2)	7.1	25.4(5.3)	20.7	24.0(0.3)	1.4
교육수준 ³⁾									
무학	20	0.0(0.0)	.	59.1(10.8)	18.3	40.9(10.8)	26.4	24.1(0.6)	2.5
초등학교	33	4.7(2.8)	59.5	59.5(7.7)	12.9	35.8(8.1)	22.7	24.5(0.6)	2.4
중학교	40	0.0(0.0)	.	68.2(7.9)	11.5	31.8(7.9)	24.8	24.4(0.7)	2.7
고등학교	186	6.5(1.8)	27.8	65.4(3.4)	5.3	28.1(3.4)	12.3	23.2(0.3)	1.2
대학교 이상	226	11.9(2.6)	21.9	72.4(2.7)	3.7	15.7(2.1)	13.1	21.9(0.2)	0.9
직업									
전문행정관리	75	12.6(3.8)	29.8	69.6(5.3)	7.6	17.8(4.2)	23.5	22.2(0.4)	2.0
사무직	75	6.0(3.1)	51.5	79.8(5.1)	6.4	14.2(4.1)	28.5	21.8(0.3)	1.4
판매·서비스직	66	3.5(1.9)	54.4	62.9(6.1)	9.8	33.6(6.1)	18.2	23.7(0.6)	2.6
농림어업	0	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	49	2.1(2.1)	99.0	64.4(7.8)	12.1	33.5(7.6)	22.7	24.0(0.4)	1.8
기타 ⁴⁾	240	9.6(2.3)	23.8	66.6(3.1)	4.6	23.8(2.7)	11.4	22.8(0.2)	1.0
월 가구소득									
100만원 미만	35	5.4(3.6)	66.6	69.7(7.5)	10.8	24.9(6.3)	25.4	23.7(0.5)	2.1
100-200만원 미만	29	2.8(2.6)	92.9	57.3(9.4)	16.5	39.8(10.2)	25.7	24.0(0.6)	2.6
200-300만원 미만	61	3.4(2.3)	67.9	56.5(6.6)	11.7	40.0(5.9)	14.8	24.4(0.5)	2.1
300-400만원 미만	85	9.2(3.8)	41.4	66.2(6.0)	9.0	24.6(4.5)	18.2	23.0(0.3)	1.2
400만원 이상	292	9.1(1.7)	19.2	71.7(2.5)	3.5	19.2(2.3)	11.7	22.3(0.2)	1.0

주 : 1) 비만도 분포 : 저체중(BMI<18.5), 정상(18.5≤BMI<25), 비만(BMI≥25)

2) 비만율 : (체질량지수(kg/m²) 25 이상인 사람의 수 / 여자 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 60> 주관적 비만인지율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	45.2(1.9)	4.2	396	43.2(2.6)	6.0	506	47.2(2.4)	5.0
연령									
19-29	135	37.2(4.7)	12.6	56	37.0(5.8)	15.7	79	37.5(5.6)	14.9
30-39	188	44.4(3.7)	8.4	85	46.6(5.3)	11.4	103	42.4(4.7)	11.0
40-49	211	49.9(3.8)	7.6	96	50.4(5.3)	10.6	115	49.3(5.1)	10.3
50-59	182	46.7(3.8)	8.2	78	42.7(6.1)	14.3	104	50.7(4.7)	9.2
60-69	112	52.5(4.8)	9.2	48	42.8(7.8)	18.2	64	60.4(6.8)	11.3
70 이상									
19-64	780	45.8(2.0)	4.4	341	44.9(2.7)	6.0	439	46.8(2.5)	5.2
65 이상	122	40.5(5.1)	12.7	55	30.0(6.8)	22.8	67	49.9(6.9)	13.8
교육수준 ²⁾									
무학	25	58.7(9.5)	16.1	5	-(-)	-	20	52.8(11.9)	22.5
초등학교	50	41.3(7.0)	16.9	17	-(-)	-	33	52.3(8.9)	17.0
중학교	62	40.1(7.8)	19.4	22	27.4(10.4)	38.0	40	47.3(9.9)	21.0
고등학교	332	44.3(2.9)	6.4	146	39.1(3.6)	9.2	186	49.4(4.2)	8.5
대학교 이상	433	46.5(2.8)	6.0	206	48.6(3.8)	7.7	227	44.1(2.8)	6.4
직업									
전문·행정관리	162	51.5(4.1)	8.0	87	52.1(5.6)	10.7	75	50.8(6.0)	11.8
사무직	160	46.6(4.0)	8.5	84	48.1(5.8)	12.0	76	44.5(5.2)	11.6
판매·서비스직	110	45.0(5.1)	11.4	44	36.6(6.8)	18.6	66	52.1(7.2)	13.9
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	158	44.3(3.6)	8.1	109	42.3(4.6)	10.8	49	49.5(7.2)	14.5
기타 ³⁾	310	42.2(3.0)	7.2	70	35.1(7.1)	20.3	240	45.0(3.3)	7.4
월 가구소득									
100만원 미만	54	47.8(8.3)	17.3	19	-(-)	-	35	45.2(8.8)	19.5
100-200만원 미만	44	42.3(7.3)	17.2	15	-(-)	-	29	56.3(9.7)	17.2
200-300만원 미만	121	56.3(4.9)	8.8	60	47.5(7.1)	15.0	61	66.8(6.1)	9.1
300-400만원 미만	157	43.7(4.1)	9.3	72	42.0(6.1)	14.4	85	45.5(5.4)	11.9
400만원 이상	521	43.1(2.5)	5.9	228	43.7(3.4)	7.9	293	42.6(2.7)	6.4

주 : 1) 주관적 비만인지율 : (“약간 비만임” 또는 “매우 비만임”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 61> 연간 체중조절 시도율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	64.8(1.6)	2.4	396	57.6(2.6)	4.5	506	71.9(2.0)	2.7
연령									
19-29	135	65.3(4.0)	6.1	56	56.4(6.8)	12.1	79	75.0(5.0)	6.6
30-39	188	69.1(3.2)	4.7	85	57.1(5.6)	9.7	103	80.6(4.1)	5.1
40-49	211	71.6(3.0)	4.2	96	62.8(4.5)	7.2	115	80.0(3.4)	4.3
50-59	182	63.0(3.2)	5.2	78	58.3(5.0)	8.6	104	67.7(4.6)	6.8
60-69	112	63.5(4.7)	7.4	48	61.9(5.9)	9.5	64	64.7(6.6)	10.2
70 이상	74	38.7(5.9)	15.4	33	36.8(8.7)	23.7	41	40.4(8.0)	19.7
19-64	780	67.3(1.7)	2.5	341	59.4(2.7)	4.6	439	75.2(2.1)	2.8
65 이상	122	45.4(4.5)	9.8	55	43.0(7.7)	17.8	67	47.5(5.6)	11.8
교육수준 ²⁾									
무학	25	60.8(9.5)	15.7	5	-(-)	-	20	55.5(9.4)	16.9
초등학교	50	47.4(7.2)	15.1	17	-(-)	-	33	55.4(7.6)	13.7
중학교	62	59.2(6.2)	10.5	22	53.4(11.3)	21.2	40	62.6(8.0)	12.9
고등학교	332	63.4(2.5)	4.0	146	51.4(4.0)	7.8	186	75.1(2.9)	3.9
대학교 이상	433	68.7(2.2)	3.2	206	63.9(3.5)	5.5	227	74.3(3.2)	4.3
직업									
전문·행정관리	162	69.4(3.5)	5.0	87	66.3(4.6)	6.9	75	74.1(5.1)	6.9
사무직	160	66.6(3.4)	5.1	84	58.7(5.2)	8.9	76	77.9(4.6)	5.9
판매·서비스직	110	70.8(4.4)	6.3	44	56.4(7.8)	13.7	66	83.0(5.4)	6.5
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	158	56.5(3.8)	6.7	109	51.5(5.0)	9.7	49	69.3(7.9)	11.3
기타 ³⁾	310	64.0(2.6)	4.0	70	57.2(6.2)	10.9	240	66.7(3.0)	4.5
월 가구소득									
100만원 미만	54	54.0(7.1)	13.1	19	-(-)	-	35	44.6(7.5)	16.8
100-200만원 미만	44	47.6(8.8)	18.5	15	-(-)	-	29	64.7(10.8)	16.7
200-300만원 미만	121	63.7(4.6)	7.3	60	53.8(6.3)	11.6	61	75.5(5.3)	7.0
300-400만원 미만	157	61.7(4.1)	6.6	72	53.4(6.7)	12.6	85	70.4(4.6)	6.5
400만원 이상	521	68.6(1.9)	2.7	228	61.8(3.2)	5.2	293	75.1(2.7)	3.6

주 : 1) 연간 체중조절 시도율 : (최근 1년 동안 체중을 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 노력했던 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 62> 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	26.3(1.5)	5.8	396	27.4(2.4)	8.8	506	25.2(2.1)	8.5
연령									
19-29	135	15.7(2.8)	17.9	56	15.0(4.4)	29.2	79	16.6(4.3)	26.2
30-39	188	21.1(3.3)	15.7	85	20.1(4.2)	21.1	103	22.0(4.3)	19.7
40-49	211	22.6(2.6)	11.7	96	20.0(3.9)	19.5	115	25.0(3.7)	14.8
50-59	182	31.4(3.5)	11.1	78	35.6(6.2)	17.4	104	27.2(4.4)	16.2
60-69	112	41.8(5.6)	13.5	48	53.6(7.8)	14.5	64	32.0(7.2)	22.4
70 이상	74	41.7(7.0)	16.8	33	45.1(9.4)	20.9	41	38.6(8.7)	22.6
19-64	780	24.4(1.5)	6.3	341	25.1(2.6)	10.3	439	23.7(2.0)	8.6
65 이상	122	40.5(5.7)	13.9	55	45.5(7.8)	17.0	67	36.0(7.5)	20.7
교육수준 ²⁾									
무학	25	24.8(8.6)	34.7	5	-(-)	-	20	25.7(10.3)	40.1
초등학교	50	54.0(9.0)	16.7	17	-(-)	-	33	41.5(9.6)	23.0
중학교	62	35.8(6.1)	17.1	22	44.8(10.0)	22.4	40	30.7(6.9)	22.6
고등학교	332	24.4(2.4)	9.9	146	22.1(3.2)	14.5	186	26.7(3.3)	12.4
대학교 이상	433	23.6(2.4)	10.2	206	26.3(3.7)	13.9	227	20.5(2.7)	13.4
직업									
전문행정관리	162	22.7(3.1)	13.8	87	23.7(4.5)	19.1	75	21.3(4.3)	20.1
사무직	160	25.6(3.4)	13.4	84	26.4(4.6)	17.4	76	24.5(5.2)	21.2
판매·서비스직	110	24.0(4.1)	17.0	44	28.6(7.4)	26.0	66	20.1(4.4)	22.1
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	158	26.0(3.8)	14.5	109	27.1(5.2)	19.0	49	23.3(5.6)	24.0
기타 ³⁾	310	29.3(3.1)	10.6	70	31.6(5.5)	17.3	240	28.5(3.5)	12.3
월 가구소득									
100만원 미만	54	44.3(7.8)	17.7	19	-(-)	-	35	44.5(10.1)	22.7
100-200만원 미만	44	35.4(8.5)	23.9	15	-(-)	-	29	22.5(7.1)	31.7
200-300만원 미만	121	30.5(4.2)	13.9	60	32.7(6.0)	18.3	61	27.9(6.2)	22.3
300-400만원 미만	157	26.4(3.5)	13.3	72	32.2(5.6)	17.5	85	20.4(4.5)	22.0
400만원 이상	521	22.4(2.0)	8.9	228	21.3(3.2)	15.0	293	23.4(2.7)	11.6

주 : 1) 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율 : (“나쁨” 또는 “매우 나쁨”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 63> 저작불편호소율(65세 이상)¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	122	28.6(4.9)	17.1	55	26.5(6.8)	25.8	67	30.5(6.9)	22.6
교육수준 ²⁾									
무학	23	27.2(8.4)	30.9	5	-(-)	-	18	-(-)	-
초등학교	35	29.8(7.8)	26.2	12	-(-)	-	23	23.3(7.3)	31.2
중학교	25	34.9(11.5)	32.8	10	-(-)	-	15	-(-)	-
고등학교	25	16.9(7.0)	41.2	18	-(-)	-	7	-(-)	-
대학교 이상	14	-(-)	-	10	-(-)	-	4	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 미만	27	26.3(10.2)	38.6	9	-(-)	-	18	-(-)	-
100-200만원 미만	14	-(-)	-	7	-(-)	-	7	-(-)	-
200-300만원 미만	35	20.6(7.6)	36.7	21	23.5(8.8)	37.5	14	-(-)	-
300-400만원 미만	19	-(-)	-	10	-(-)	-	9	-(-)	-
400만원 이상	25	32.6(9.1)	27.8	7	-(-)	-	18	-(-)	-

주 : 1) 저작불편호소율(65세 이상) : (“매우 불편하다” 또는 “불편하다”에 응답한 사람의 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

<표 64> 어제 하루 칫솔질 실천율

(단위: %)

구분	어제 아침식사 후 칫솔질 실천율 ¹⁾			어제 점심식사 후 칫솔질 실천율 ²⁾			어제 저녁식사 후 칫솔질 실천율 ³⁾			어제 잠자기 전 칫솔질 실천율 ⁴⁾		
	N	% (표준 오차)	변동 계수	N	% (표준 오차)	변동 계수	N	% (표준 오차)	변동 계수	N	% (표준 오차)	변동 계수
전체	746	90.6(1.1)	1.2	881	58.4(2.0)	3.4	897	73.9(1.6)	2.2	902	82.1(1.4)	1.7
성												
남자	325	88.6(1.7)	1.9	387	52.3(2.8)	5.4	393	72.7(2.2)	3.1	396	78.6(1.9)	2.4
여자	421	92.5(1.4)	1.6	494	64.4(2.1)	3.3	504	75.0(1.9)	2.5	506	85.5(1.5)	1.7
연령												
19-29	89	88.6(3.8)	4.3	127	54.3(4.5)	8.4	134	74.9(3.8)	5.0	135	84.1(3.6)	4.2
30-39	134	87.5(2.7)	3.1	186	65.3(3.3)	5.1	186	70.8(3.5)	4.9	188	82.5(2.6)	3.2
40-49	178	89.8(2.2)	2.5	207	62.3(4.1)	6.5	210	71.0(3.9)	5.5	211	79.2(3.2)	4.1
50-59	167	91.4(2.6)	2.8	179	57.6(4.5)	7.9	181	74.1(3.8)	5.2	182	85.8(2.9)	3.4
60-69	105	97.8(1.6)	1.7	111	49.9(4.6)	9.2	112	82.5(3.7)	4.5	112	75.4(4.2)	5.5
70 이상	73	89.9(3.4)	3.8	71	54.3(6.5)	12.1	74	74.3(5.2)	7.0	74	83.8(5.4)	6.5
19-64	629	90.3(1.2)	1.4	763	59.5(2.2)	3.6	775	73.6(1.7)	2.3	780	82.7(1.4)	1.7
65 이상	117	92.2(2.5)	2.7	118	50.4(5.8)	11.5	122	75.9(4.2)	5.6	122	77.8(5.0)	6.5
교육수준 ⁵⁾												
무학	24	100.0(0.0)	0.0	25	29.1(9.6)	33.0	25	82.2(7.1)	8.7	25	80.7(9.2)	11.4
초등학교	50	91.4(4.3)	4.7	49	49.4(8.1)	16.4	50	88.6(4.0)	4.5	50	75.2(9.5)	12.7
중학교	60	94.5(3.2)	3.4	60	56.8(6.0)	10.5	62	71.3(6.0)	8.5	62	85.5(4.2)	5.0
고등학교	273	90.0(1.8)	2.0	325	56.8(2.8)	5.0	330	70.6(2.3)	3.3	332	80.8(2.5)	3.1
대학교 이상	339	89.7(1.7)	1.9	422	62.3(2.4)	3.9	430	75.0(2.5)	3.3	433	83.5(1.8)	2.2
직업												
전문행정관리	127	93.2(2.0)	2.2	155	60.8(4.0)	6.7	161	79.9(3.5)	4.4	162	87.4(2.7)	3.1
사무직	131	83.6(3.3)	4.0	159	65.3(3.6)	5.5	160	72.8(3.7)	5.1	160	82.0(3.2)	3.9
판매·서비스직	85	93.5(2.4)	2.6	107	68.7(4.9)	7.2	109	68.6(4.7)	6.8	110	82.6(3.8)	4.6
농림어업	1	-(-)	-	2	-(-)	-	2	-(-)	-	2	-(-)	-
기능단순노무직	135	89.0(2.5)	2.8	157	58.3(4.3)	7.3	156	72.1(4.0)	5.5	158	78.7(3.5)	4.5
기타 ⁶⁾	267	92.4(1.8)	1.9	301	50.3(3.0)	6.0	309	74.4(2.5)	3.4	310	80.7(2.4)	2.9
월 가구소득												
100만원 미만	49	84.9(4.1)	4.8	53	26.8(4.6)	17.1	54	69.6(7.9)	11.3	54	75.5(5.7)	7.6
100-200만원 미만	40	89.1(5.3)	5.9	44	60.6(8.4)	13.8	44	79.0(7.4)	9.4	44	81.7(8.3)	10.1
200-300만원 미만	102	89.0(3.2)	3.6	118	55.0(5.1)	9.2	120	68.7(4.3)	6.3	121	69.2(4.6)	6.6
300-400만원 미만	132	93.8(2.3)	2.5	155	56.8(3.9)	6.8	155	81.3(3.6)	4.4	157	88.6(3.1)	3.5
400만원 이상	419	90.8(1.5)	1.6	506	62.2(2.2)	3.5	519	72.4(2.3)	3.1	521	83.6(1.7)	2.1

주 : 1) 어제 아침식사 후 칫솔질 실천율 : (아침식사 후 칫솔질 한 사람의 수 / 어제 하루 동안 아침식사 한 사람의 수) × 100

2) 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율 : (점심식사 후 칫솔질 한 사람의 수 / 어제 하루 동안 점심식사 한 사람의 수) × 100

3) 어제 저녁식사 후 칫솔질 실천율 : (저녁식사 후 칫솔질 한 사람의 수 / 어제 하루 동안 저녁식사 한 사람의 수) × 100

4) 어제 잠자기 전 칫솔질 실천율 : (잠자기 전 칫솔질 한 사람의 수 / 어제 하루 동안 잠을 잔 사람의 수) × 100

5) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 제학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

6) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 65> 연간 미충족의료율(치과)¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	23.6(1.3)	5.7	396	21.7(2.1)	9.8	506	25.4(1.9)	7.5
연령									
19-29	135	26.0(3.7)	14.1	56	23.9(5.5)	23.0	79	28.4(5.8)	20.4
30-39	188	21.3(3.1)	14.7	85	16.4(4.1)	25.2	103	26.0(4.2)	16.2
40-49	211	23.6(3.2)	13.5	96	24.2(4.7)	19.6	115	23.0(4.2)	18.3
50-59	182	24.2(3.7)	15.1	78	22.1(5.5)	25.0	104	26.4(4.4)	16.5
60-69	112	26.2(4.2)	16.0	48	26.7(6.3)	23.6	64	25.8(5.6)	21.9
70 이상	74	16.8(4.6)	27.5	33	12.1(5.0)	41.7	41	21.0(7.1)	33.9
19-64	780	24.0(1.5)	6.2	341	22.3(2.3)	10.5	439	25.7(2.1)	8.2
65 이상	122	20.3(3.9)	19.2	55	16.6(4.7)	28.3	67	23.6(5.3)	22.4
교육수준 ²⁾									
무학	25	22.2(7.4)	33.4	5	-(-)	-	20	23.0(9.2)	40.3
초등학교	50	17.9(5.9)	32.7	17	-(-)	-	33	17.0(6.4)	37.5
중학교	62	25.8(5.8)	22.6	22	17.6(7.5)	42.6	40	30.5(7.6)	24.9
고등학교	332	23.6(2.3)	9.7	146	19.1(2.9)	15.0	186	28.0(3.3)	11.8
대학교 이상	433	23.8(2.1)	8.7	206	24.2(3.3)	13.5	227	23.4(3.1)	13.2
직업									
전문·행정관리	162	22.2(3.6)	16.0	87	21.3(5.4)	25.3	75	23.6(5.0)	21.1
사무직	160	22.2(3.0)	13.7	84	21.7(4.6)	21.2	76	23.0(4.7)	20.4
판매·서비스직	110	29.2(3.9)	13.3	44	27.1(5.9)	21.6	66	30.9(4.8)	15.6
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	158	19.6(3.7)	18.7	109	22.4(4.1)	18.5	49	12.4(5.6)	44.8
기타 ³⁾	310	25.1(2.6)	10.3	70	18.4(4.5)	24.2	240	27.7(3.0)	10.9
월 가구소득									
100만원 미만	54	31.3(7.3)	23.4	19	-(-)	-	35	36.9(8.9)	24.2
100-200만원 미만	44	20.9(6.5)	30.9	15	-(-)	-	29	18.5(7.3)	39.5
200-300만원 미만	121	25.8(3.7)	14.4	60	26.7(5.4)	20.2	61	24.8(5.3)	21.3
300-400만원 미만	157	28.5(4.0)	14.0	72	29.0(5.8)	20.0	85	27.9(5.6)	20.1
400만원 이상	521	21.3(1.8)	8.6	228	18.0(2.5)	13.8	293	24.6(2.8)	11.4

주 : 1) 연간 치과진료 미치료율 : (최근 1년 동안 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 66> 미충족의료 이유(치과)¹⁾

(단위: %)

구분	N ²⁾	경제적인 이유로		치과 병의원이 너무 멀어서		직장이나 학교를 비울 수 없어서		거동이 불편해서 혹은 건강 문제 때문에		아이를 봐줄 사람이 없어서		다른 문제들에 비해서 덜 중요하다고 느껴서		치과진료를 받기가 무서워서		기타	
		% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수
전체	213	17.9(3.1)	17.5	1.0(0.7)	74.6	34.7(3.0)	8.6	1.7(1.0)	62.1	3.0(1.0)	33.1	23.9(2.4)	10.3	10.5(2.1)	20.4	7.3(2.1)	29.1
성																	
남자	85	16.5(3.7)	22.4	0.8(0.8)	101.0	43.8(5.9)	13.5	1.9(1.9)	99.5	0.0(0.0)	.	22.4(4.4)	19.5	10.0(3.6)	35.9	4.6(2.8)	60.8
여자	128	19.0(3.8)	20.2	1.2(1.2)	99.4	27.1(3.5)	12.9	1.5(1.0)	69.5	5.6(1.8)	31.7	25.1(3.3)	13.3	11.0(2.5)	23.0	9.5(2.6)	27.5
연령																	
19-29	37	4.8(3.4)	70.0	0.0(0.0)	.	39.8(8.2)	20.6	0.0(0.0)	.	1.8(1.8)	97.3	39.6(7.7)	19.6	5.5(3.8)	68.8	8.5(3.9)	46.7
30-39	41	6.4(3.4)	53.3	0.0(0.0)	.	40.1(6.8)	17.0	0.0(0.0)	.	14.0(4.9)	35.4	26.3(6.7)	25.5	4.8(3.5)	72.0	8.4(5.7)	68.0
40-49	47	16.6(5.3)	32.0	2.8(2.7)	97.2	47.5(7.0)	14.8	1.8(1.9)	102.9	0.0(0.0)	.	18.2(6.3)	34.7	11.0(5.4)	48.9	2.2(2.2)	99.5
50-59	44	26.4(10.1)	38.3	0.0(0.0)	.	30.6(7.9)	25.9	4.0(3.9)	99.1	0.0(0.0)	.	19.0(5.7)	29.9	10.0(3.6)	36.0	10.0(4.9)	49.0
60-69	31	35.6(8.3)	23.3	3.1(3.1)	100.0	12.8(5.7)	44.7	0.0(0.0)	.	3.0(2.9)	96.7	19.5(7.2)	36.7	23.5(8.4)	35.5	2.5(2.4)	93.8
70 이상	13	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
19-64	187	15.7(3.3)	21.2	0.7(0.7)	100.4	37.7(3.3)	8.6	1.4(1.1)	74.5	3.0(1.0)	35.0	25.7(2.6)	10.1	9.2(2.2)	24.4	6.6(2.1)	32.3
65 이상	26	38.0(9.1)	24.0	3.6(3.7)	101.5	7.2(4.3)	60.1	3.8(3.9)	100.6	3.5(3.5)	100.1	7.2(5.0)	69.8	23.0(9.8)	42.5	13.6(6.6)	48.5
교육수준 ³⁾																	
무학	6	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	9	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
중학교	18	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
고등학교	79	14.1(4.2)	29.7	2.6(1.9)	73.9	27.9(4.2)	15.0	3.3(2.4)	71.6	0.0(0.0)	.	31.7(5.5)	17.3	12.7(4.1)	31.9	7.7(3.1)	41.1
대학교 이상	101	11.8(3.6)	30.6	0.0(0.0)	.	45.9(4.4)	9.6	0.0(0.0)	.	5.6(1.9)	34.6	21.7(3.4)	15.6	8.7(2.8)	32.3	6.2(2.6)	41.1
직업																	
전문행정관리	35	12.6(5.4)	43.1	0.0(0.0)	.	46.7(8.1)	17.4	0.0(0.0)	.	4.0(2.9)	72.4	23.6(7.5)	31.9	10.6(5.1)	48.0	2.5(2.5)	100.4
사무직	35	6.1(4.2)	69.7	0.0(0.0)	.	62.4(8.6)	13.8	0.0(0.0)	.	6.0(3.4)	55.9	19.0(6.2)	32.8	2.0(1.9)	97.3	4.5(4.4)	96.7
판매·서비스직	33	15.6(8.9)	57.0	0.0(0.0)	.	40.8(9.5)	23.2	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	33.4(10.1)	30.2	7.2(4.1)	57.5	3.1(3.1)	98.9
농림어업	0	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	30	13.6(6.2)	45.9	2.4(2.5)	100.5	52.1(9.0)	17.3	0.0(0.0)	.	2.4(2.4)	99.5	15.6(6.7)	43.0	10.6(5.7)	53.5	3.3(3.3)	99.6
기타 ⁴⁾	80	28.4(6.2)	22.0	1.8(1.8)	99.7	7.0(3.7)	52.6	4.7(2.8)	59.9	2.9(1.7)	58.0	25.2(4.9)	19.3	15.8(4.1)	25.8	14.3(3.8)	26.9
월 가구소득																	
100만원 미만	17	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
100-200만원 미만	10	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
200-300만원 미만	33	21.6(7.6)	35.4	2.5(2.5)	101.4	20.2(7.6)	37.4	6.1(5.9)	97.1	0.0(0.0)	.	16.6(5.4)	32.8	30.1(8.7)	29.0	2.9(2.9)	98.9
300-400만원 미만	42	14.1(5.3)	37.3	0.0(0.0)	.	47.4(6.9)	14.6	0.0(0.0)	.	3.5(2.4)	70.0	23.1(6.3)	27.3	5.5(3.1)	57.1	6.5(4.5)	69.4
400만원 이상	111	8.4(3.0)	35.4	1.2(1.2)	100.2	39.7(4.0)	10.2	0.7(0.7)	100.2	4.4(1.6)	37.0	28.6(4.4)	15.5	8.7(2.8)	32.5	8.5(2.7)	31.6

주 : 1) 치과진료 미치료 이유 : (응답보기별 응답자 수 / 최근 1년 동안 치과진료를 받지 못한 사람의 수) × 100

2) 최근 1년 동안 치과진료를 받지 못한 사람의 수

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 67> 틀니 이용 행태(50세 이상)¹⁾

(단위: %)

구분	N ²⁾	위아래 둘 다 있음		위쪽만 있음		아래쪽만 있음		아니오	
		%(표준 오차)	변동 계수	%(표준 오차)	변동 계수	%(표준 오차)	변동 계수	%(표준 오차)	변동 계수
전체	368	7.5(1.4)	18.9	5.4(1.1)	21.2	1.8(0.7)	39.6	85.3(2.0)	2.3
성									
남자	159	9.5(2.4)	25.6	3.8(1.4)	37.3	1.6(1.0)	59.0	85.1(2.7)	3.2
여자	209	5.6(1.5)	26.2	6.9(1.9)	27.0	1.9(1.0)	54.6	85.6(2.5)	2.9
교육수준 ³⁾									
무학	25	22.0(7.7)	34.7	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	78.0(7.7)	9.8
초등학교	50	22.6(5.9)	26.2	12.1(4.5)	37.2	2.8(2.0)	72.1	62.5(6.3)	10.0
중학교	57	11.0(4.0)	36.8	7.3(3.8)	52.2	5.2(3.1)	58.9	76.5(6.4)	8.4
고등학교	142	3.1(1.4)	45.1	4.8(1.4)	28.6	0.8(0.8)	98.8	91.4(2.1)	2.2
대학교 이상	94	1.9(1.4)	71.7	3.2(1.9)	58.8	1.0(1.0)	99.9	93.8(2.4)	2.6
월 가구소득									
100만원 미만	41	11.2(3.3)	30.0	11.4(3.8)	33.3	1.7(1.7)	100.9	75.7(4.9)	6.5
100-200만원 미만	30	19.8(9.7)	48.8	5.5(2.7)	49.0	2.3(2.4)	102.2	72.4(9.2)	12.8
200-300만원 미만	73	10.2(3.7)	36.5	5.3(2.2)	41.2	1.2(1.2)	100.4	83.3(5.0)	6.0
300-400만원 미만	56	8.2(3.4)	41.6	6.3(3.2)	50.3	1.8(1.8)	101.7	83.7(4.5)	5.4
400만원 이상	165	2.3(0.9)	40.7	3.9(1.8)	46.6	2.0(1.2)	59.3	91.8(2.4)	2.6

주 : 1) 틀니 이용 행태(50세 이상) : (응답보기별 응답자 수 / 50세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

2) 50세 이상 조사대상 응답자 수

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

<표 68> 주관적 틀니 필요 인지율(50세 이상)¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준 오차)	변동 계수	N	%(표준 오차)	변동 계수	N	%(표준 오차)	변동 계수
전체	309	3.4(1.1)	32.2	132	4.2(1.9)	45.0	177	2.6(1.0)	39.2
교육수준 ²⁾									
무학	19	-(-)	-	4	-(-)	-	15	-(-)	-
초등학교	31	7.8(5.5)	70.5	10	-(-)	-	21	7.7(5.4)	69.7
중학교	43	1.7(1.7)	99.8	14	-(-)	-	29	0.0(0.0)	.
고등학교	128	1.2(0.9)	72.3	50	1.6(1.7)	103.1	78	1.0(1.0)	100.4
대학교 이상	88	3.9(2.4)	62.1	54	4.4(3.3)	74.0	34	2.8(2.7)	97.5
월 가구소득									
100만원 미만	30	10.9(6.5)	59.7	11	-(-)	-	19	-(-)	-
100-200만원 미만	22	7.9(5.4)	68.5	7	-(-)	-	15	-(-)	-
200-300만원 미만	60	5.2(2.9)	55.6	25	6.1(3.7)	60.7	35	4.5(3.2)	71.4
300-400만원 미만	45	4.5(4.3)	95.8	20	8.9(8.3)	93.6	25	0.0(0.0)	.
400만원 이상	151	0.5(0.5)	98.3	69	0.0(0.0)	.	82	1.0(1.0)	97.6

주 : 1) 주관적 틀니 필요 인지율(50세 이상) : (현재 틀니가 필요하다고 생각하는 사람의 수 / 50세 이상 조사대상 응답자 중 틀니 미착용자의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

<표 69> 하루 평균 수면시간¹⁾

(단위: %, 시간)

구분	N	6시간 이하		7~8시간		9시간 이상		평균 수면	
		시간 (표준오차)	변동 계수	시간 (표준오차)	변동 계수	시간 (표준오차)	변동 계수	시간 (표준오차)	변동 계수
전체	902	46.4(1.7)	3.8	51.3(1.7)	3.3	2.2(0.5)	21.4	6.6(0.0)	0.6
성									
남자	396	47.5(2.2)	4.6	50.9(2.3)	4.4	1.6(0.7)	40.9	6.5(0.1)	0.8
여자	506	45.5(2.1)	4.5	51.7(2.0)	3.9	2.8(0.7)	26.5	6.6(0.1)	0.8
연령									
19-29	135	38.1(4.4)	11.5	59.2(4.3)	7.2	2.7(1.4)	50.9	6.8(0.1)	1.7
30-39	188	45.1(3.7)	8.3	53.2(3.8)	7.1	1.7(0.8)	49.6	6.7(0.1)	1.0
40-49	211	41.2(3.8)	9.3	56.6(3.6)	6.3	2.2(1.2)	52.2	6.6(0.1)	1.1
50-59	182	57.0(4.0)	7.0	42.1(3.9)	9.3	0.9(0.6)	64.6	6.3(0.1)	1.5
60-69	112	51.6(4.8)	9.3	47.7(4.9)	10.3	0.7(0.6)	97.9	6.3(0.1)	1.5
70 이상	74	50.2(6.0)	11.9	41.1(5.9)	14.4	8.7(2.9)	33.3	6.5(0.2)	2.6
19-64	780							6.6(0.0)	0.7
65 이상	122	51.2(4.8)	9.4	43.3(4.8)	11.0	5.5(1.9)	34.5	6.5(0.1)	2.0
교육수준 ²⁾									
무학	25	75.6(9.3)	12.2	14.9(8.5)	57.2	9.5(6.1)	63.7	5.8(0.3)	5.0
초등학교	50	34.6(6.1)	17.8	58.5(6.2)	10.6	6.9(2.4)	34.9	6.8(0.2)	2.5
중학교	62	57.1(6.9)	12.1	38.8(6.7)	17.2	4.1(2.4)	58.1	6.4(0.2)	2.6
고등학교	332	46.4(3.2)	6.8	50.9(3.1)	6.1	2.7(1.0)	36.0	6.6(0.1)	1.1
대학교 이상	433	44.8(2.7)	6.1	54.4(2.7)	5.0	0.8(0.4)	50.9	6.6(0.1)	0.8
직업									
전문행정관리	162	48.4(3.7)	7.7	51.2(3.7)	7.3	0.4(0.4)	99.8	6.5(0.1)	1.2
사무직	160	47.9(4.7)	9.8	50.5(4.6)	9.0	1.6(0.9)	53.6	6.5(0.1)	1.4
판매·서비스직	110	45.1(5.8)	12.8	52.5(5.5)	10.4	2.4(1.7)	71.2	6.6(0.1)	2.2
농림어업	2	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	158	53.1(4.6)	8.7	44.7(4.5)	10.0	2.2(1.3)	58.3	6.4(0.1)	1.7
기타 ³⁾	310	41.7(2.8)	6.8	54.7(2.7)	5.0	3.5(1.0)	26.9	6.7(0.1)	1.0
월 가구소득									
100만원 미만	54	60.7(8.5)	14.0	36.2(8.3)	23.0	3.1(2.0)	65.2	6.1(0.2)	3.4
100-200만원 미만	44	46.8(9.1)	19.4	45.9(8.8)	19.1	7.3(3.2)	44.4	6.7(0.3)	3.8
200-300만원 미만	121	52.4(5.0)	9.6	47.0(5.1)	10.8	0.6(0.6)	99.9	6.4(0.1)	1.8
300-400만원 미만	157	44.6(4.8)	10.8	51.7(5.0)	9.6	3.8(1.6)	41.5	6.6(0.1)	1.4
400만원 이상	521	44.3(2.2)	4.9	54.0(2.2)	4.0	1.7(0.6)	33.3	6.6(0.0)	0.7

주 : 1) 하루 평균 수면시간 : 수면시간의 총 합 / 조사대상 응답자 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 70> 스트레스 인지율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	29.3(1.6)	5.6	396	29.2(2.5)	8.5	506	29.3(2.1)	7.3
연령									
19-29	135	29.7(3.9)	13.0	56	23.2(5.6)	23.9	79	36.6(5.3)	14.4
30-39	188	37.1(3.2)	8.7	85	35.1(4.6)	13.1	103	39.0(5.3)	13.7
40-49	211	32.1(3.3)	10.3	96	38.7(4.7)	12.2	115	25.9(4.0)	15.6
50-59	182	27.7(3.9)	14.0	78	28.6(5.5)	19.3	104	26.8(4.8)	18.1
60-69	112	21.5(3.9)	18.2	48	21.6(5.7)	26.5	64	21.4(5.1)	24.0
70 이상	74	15.2(5.1)	33.5	33	12.6(5.8)	46.3	41	17.5(6.1)	34.6
19-64	780	31.0(1.7)	5.5	341	31.1(2.6)	8.5	439	31.0(2.3)	7.3
65 이상	122	15.7(4.4)	28.0	55	14.2(5.2)	36.8	67	17.0(4.9)	29.2
교육수준 ²⁾									
무학	25	27.9(8.4)	30.2	5	-(-)	-	20	30.2(8.9)	29.3
초등학교	50	17.0(5.4)	31.9	17	-(-)	-	33	15.4(6.5)	42.1
중학교	62	19.9(5.3)	26.5	22	28.7(10.1)	35.2	40	14.9(5.3)	35.6
고등학교	332	25.1(2.6)	10.5	146	22.3(3.4)	15.2	186	27.8(3.8)	13.7
대학교 이상	433	35.4(2.2)	6.1	206	35.3(3.5)	10.0	227	35.4(3.3)	9.3
직업									
전문·행정관리	162	37.3(3.9)	10.6	87	35.0(4.6)	13.2	75	40.8(6.2)	15.3
사무직	160	36.4(4.0)	11.0	84	36.6(5.1)	14.0	76	36.3(6.3)	17.4
판매·서비스직	110	32.0(4.2)	13.2	44	36.9(7.3)	19.6	66	27.8(4.7)	17.0
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	158	21.5(3.4)	15.9	109	21.5(3.6)	16.8	49	21.3(5.9)	27.7
기타 ³⁾	310	24.2(2.9)	12.2	70	19.7(6.3)	31.8	240	26.0(3.1)	12.1
월 가구소득									
100만원 미만	54	29.4(4.6)	15.8	19	-(-)	-	35	22.1(6.6)	29.8
100-200만원 미만	44	16.4(5.2)	31.6	15	-(-)	-	29	21.2(8.0)	37.8
200-300만원 미만	121	37.0(5.7)	15.5	60	39.3(8.1)	20.5	61	34.4(6.4)	18.6
300-400만원 미만	157	29.3(3.6)	12.3	72	24.6(4.6)	18.7	85	34.3(5.3)	15.5
400만원 이상	521	28.3(1.8)	6.5	228	28.5(3.2)	11.4	293	28.0(2.7)	9.8

주 : 1) 스트레스 인지율 : (평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이 느낀다” 또는 “많이 느끼는 편이다”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 71> 우울감 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	7.3(1.0)	14.0	396	5.5(1.4)	25.4	506	9.1(1.2)	13.4
연령									
19-29	135	7.1(2.2)	30.5	56	6.1(3.5)	58.1	79	8.2(2.6)	31.6
30-39	188	7.8(1.8)	23.5	85	4.6(2.2)	48.9	103	10.9(3.1)	28.7
40-49	211	7.5(1.7)	22.3	96	6.9(2.6)	37.9	115	8.0(2.7)	34.3
50-59	182	6.1(1.9)	30.5	78	4.9(2.8)	56.7	104	7.3(2.6)	35.3
60-69	112	9.2(2.6)	28.6	48	5.1(2.6)	51.2	64	12.7(4.3)	33.6
70 이상	74	7.6(3.2)	42.5	33	4.7(3.4)	72.1	41	10.2(4.3)	41.9
19-64	780	7.1(1.0)	13.9	341	5.3(1.4)	27.0	439	8.8(1.3)	14.9
65 이상	122	9.5(3.7)	38.6	55	7.4(3.6)	48.6	67	11.3(4.5)	39.5
교육수준 ²⁾									
무학	25	21.7(8.2)	37.7	5	-(-)	-	20	27.5(10.1)	36.6
초등학교	50	3.1(2.2)	71.6	17	-(-)	-	33	5.1(3.7)	72.0
중학교	62	9.6(3.8)	39.2	22	9.4(5.7)	60.9	40	9.8(4.9)	50.5
고등학교	332	8.7(2.1)	24.1	146	9.1(2.9)	31.4	186	8.2(2.0)	24.7
대학교 이상	433	5.7(0.9)	15.5	206	2.9(1.1)	36.2	227	8.9(1.7)	18.6
직업									
전문·행정관리	162	5.1(1.7)	33.5	87	5.9(2.7)	45.5	75	3.9(2.2)	55.3
사무직	160	4.6(1.5)	32.9	84	2.4(1.7)	69.8	76	7.7(3.0)	39.5
판매·서비스직	110	7.4(2.3)	31.3	44	5.9(4.1)	68.8	66	8.6(2.9)	33.3
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	158	5.8(2.1)	36.4	109	6.5(2.5)	39.1	49	4.2(2.8)	67.4
기타 ³⁾	310	10.8(1.8)	16.8	70	7.1(3.1)	43.5	240	12.3(2.2)	18.1
월 가구소득									
100만원 미만	54	21.5(5.2)	24.3	19	-(-)	-	35	24.6(6.1)	24.7
100-200만원 미만	44	12.2(5.9)	47.9	15	-(-)	-	29	17.6(9.3)	52.7
200-300만원 미만	121	14.0(4.6)	32.6	60	12.7(5.5)	43.3	61	15.5(5.2)	33.6
300-400만원 미만	157	7.4(2.0)	26.9	72	5.0(2.9)	58.3	85	9.9(3.2)	32.4
400만원 이상	521	4.2(0.7)	15.7	228	3.2(1.0)	32.7	293	5.3(1.1)	20.5

주 : 1) 우울감 경험률 : (최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 슬픔이나 절망감을 경험한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 72> 스트레스 및 우울증상으로 인한 정신상담률

(단위: %)

구분	스트레스로 인한 정신상담률 ¹⁾			우울증상으로 인한 정신상담률 ²⁾		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	274	12.5(2.5)	20.1	71	17.7(4.1)	23.2
성						
남자	119	10.2(4.3)	42.5	21	21.3(8.2)	38.3
여자	155	14.7(3.1)	20.9	50	15.5(4.5)	28.9
연령						
19-29	44	11.8(5.8)	49.3	10	-(-)	-
30-39	71	21.2(4.8)	22.7	15	-(-)	-
40-49	70	10.5(3.5)	33.1	16	-(-)	-
50-59	50	7.6(4.1)	53.1	11	-(-)	-
60-69	26	6.8(4.7)	68.7	12	-(-)	-
70 이상	13	-(-)	-	7	-(-)	-
19-64	253	12.5(2.7)	21.6	57	19.7(4.6)	23.4
65 이상	21	12.6(5.0)	39.7	14	-(-)	-
교육수준 ³⁾						
무학	7	-(-)	-	6	-(-)	-
초등학교	9	-(-)	-	2	-(-)	-
중학교	14	-(-)	-	7	-(-)	-
고등학교	85	14.1(4.1)	28.9	27	18.8(6.6)	35.3
대학교 이상	159	12.8(3.0)	23.8	29	16.1(5.7)	35.4
직업						
전문·행정관리	64	9.3(3.9)	42.3	8	-(-)	-
사무직	61	6.3(3.2)	50.6	8	-(-)	-
판매·서비스직	37	7.6(3.4)	45.1	9	-(-)	-
농림어업	1	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	36	13.1(5.1)	38.7	8	-(-)	-
기타 ⁴⁾	75	22.3(5.5)	24.8	38	20.7(6.6)	31.8
월 가구소득						
100만원 미만	17	-(-)	-	13	-(-)	-
100-200만원 미만	9	-(-)	-	7	-(-)	-
200-300만원 미만	42	18.4(8.8)	47.9	13	-(-)	-
300-400만원 미만	46	15.1(5.3)	35.3	12	-(-)	-
400만원 이상	158	9.6(2.4)	24.8	26	18.7(8.2)	43.9

주 : 1) 스트레스로 인한 정신상담률 : (스트레스로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있는 사람의 수 / 평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이 느낀다” 또는 “많이 느끼는 편이다”에 응답한 사람의 수) × 100

2) 우울증상으로 인한 정신상담률 : (우울증상으로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있는 사람의 수 / 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감을 느낀 적이 있는 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 73> 우울증상유병률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	3.3(0.7)	21.3	396	2.7(1.2)	42.5	506	3.9(0.8)	19.9
연령									
19-29	135	6.4(2.2)	34.3	56	6.6(3.8)	57.7	79	6.1(2.2)	36.4
30-39	188	2.3(1.0)	42.1	85	1.2(1.2)	100.5	103	3.4(1.6)	48.5
40-49	211	1.5(0.7)	47.5	96	1.0(1.0)	99.8	115	1.9(1.1)	57.0
50-59	182	2.8(1.3)	47.5	78	3.5(2.5)	70.9	104	2.2(1.3)	57.4
60-69	112	4.4(1.8)	39.8	48	1.8(1.8)	100.5	64	6.6(2.9)	43.2
70 이상	74	3.2(1.8)	56.4	33	0.0(0.0)	.	41	6.1(3.4)	55.8
19-64	780	3.1(0.7)	21.4	341	2.9(1.3)	44.8	439	3.4(0.7)	20.6
65 이상	122	4.7(2.0)	41.6	55	1.5(1.6)	100.2	67	7.6(3.4)	44.3
교육수준 ²⁾									
무학	25	6.9(4.7)	67.9	5	-(-)	-	20	8.7(5.8)	66.0
초등학교	50	4.8(2.8)	57.7	17	-(-)	-	33	7.8(4.4)	56.4
중학교	62	2.3(1.6)	71.0	22	0.0(0.0)	.	40	3.6(2.5)	70.9
고등학교	332	4.0(1.3)	31.4	146	5.2(2.2)	41.8	186	2.9(1.2)	40.6
대학교 이상	433	2.6(0.7)	26.2	206	1.4(1.1)	75.1	227	3.9(1.1)	27.4
직업									
전문행정관리	162	3.3(1.5)	45.4	87	2.5(1.9)	73.3	75	4.3(2.4)	56.3
사무직	160	0.5(0.5)	100.1	84	0.0(0.0)	.	76	1.2(1.2)	100.3
판매·서비스직	110	5.3(2.2)	40.4	44	4.1(4.0)	97.3	66	6.4(2.4)	37.5
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	158	1.1(0.8)	72.4	109	0.9(0.9)	99.8	49	1.6(1.6)	99.9
기타 ³⁾	310	5.2(1.6)	31.6	70	7.5(4.9)	65.7	240	4.2(1.2)	29.3
월 가구소득									
100만원 미만	54	10.7(3.6)	33.3	19	-(-)	-	35	15.4(6.1)	39.6
100-200만원 미만	44	0.0(0.0)	.	15	-(-)	-	29	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	121	8.0(3.9)	49.0	60	12.4(6.6)	53.8	61	2.8(2.0)	71.3
300-400만원 미만	157	4.1(1.5)	37.1	72	1.9(1.9)	100.7	85	6.4(2.5)	39.3
400만원 이상	521	1.7(0.4)	25.6	228	0.8(0.5)	65.6	293	2.5(0.6)	25.8

주 : 1) 우울증상유병률 : (우울증선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 74> 우울증상 경험자의 정신문제 상담경험률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	3.8(0.8)	19.7	396	3.6(1.2)	32.4	506	4.0(1.0)	23.8
연령									
19-29	135	4.1(1.9)	45.4	56	5.7(3.3)	58.2	79	2.4(1.6)	66.5
30-39	188	6.2(1.7)	28.3	85	5.0(2.4)	46.8	103	7.2(2.7)	37.6
40-49	211	4.8(1.5)	31.4	96	4.1(1.9)	46.3	115	5.5(2.1)	37.0
50-59	182	2.1(1.2)	55.7	78	1.9(1.9)	99.7	104	2.3(1.3)	56.4
60-69	112	2.2(1.3)	56.7	48	0.0(0.0)	.	64	4.1(2.3)	56.7
70 이상	74	1.2(1.2)	100.0	33	2.4(2.5)	101.3	41	0.0(0.0)	.
19-64	780	4.1(0.8)	20.2	341	3.9(1.3)	33.6	439	4.4(1.1)	24.5
65 이상	122	1.3(0.9)	70.6	55	1.5(1.5)	99.3	67	1.2(1.2)	100.5
교육수준 ²⁾									
무학	25	7.1(4.9)	68.6	5	-(-)	-	20	9.0(6.0)	66.9
초등학교	50	0.0(0.0)	.	17	-(-)	-	33	0.0(0.0)	.
중학교	62	1.2(1.1)	97.7	22	0.0(0.0)	.	40	1.8(1.8)	98.6
고등학교	332	3.8(1.2)	30.5	146	4.5(1.9)	41.6	186	3.1(1.4)	44.6
대학교 이상	433	4.4(1.1)	25.0	206	3.6(1.3)	37.1	227	5.4(1.7)	31.6
직업									
전문행정관리	162	3.9(1.8)	45.2	87	3.4(2.0)	58.9	75	4.7(3.6)	75.0
사무직	160	3.4(1.3)	39.6	84	3.4(1.9)	55.3	76	3.4(2.0)	57.7
판매·서비스직	110	2.9(1.5)	50.7	44	0.0(0.0)	.	66	5.4(2.7)	50.2
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능·단순노무직	158	1.3(0.9)	70.3	109	1.8(1.3)	69.9	49	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	310	5.7(1.7)	30.2	70	9.0(5.1)	56.8	240	4.4(1.3)	29.6
월 가구소득									
100만원 미만	54	5.1(2.6)	50.7	19	-(-)	-	35	8.6(4.3)	49.8
100-200만원 미만	44	5.2(2.8)	53.7	15	-(-)	-	29	8.6(4.6)	53.4
200-300만원 미만	121	6.5(3.7)	56.8	60	10.9(6.4)	59.1	61	1.2(1.2)	96.3
300-400만원 미만	157	3.9(1.7)	42.3	72	2.7(2.0)	75.8	85	5.3(2.1)	39.0
400만원 이상	521	3.0(0.8)	25.8	228	2.7(0.9)	32.0	293	3.3(1.2)	35.7

주 : 1) 우울증상 경험자의 정신문제 상담경험률 : (최근 1년 동안 정신적인 문제 때문에 방문, 전화, 인터넷을 통해 상담 또는 치료와 같은 도움을 청한 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 75> 치매 상담콜센터 인지율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	33.6(1.6)	4.9	396	28.5(2.0)	7.1	506	38.7(2.2)	5.7
연령									
19-29	135	22.9(3.4)	15.0	56	20.4(5.1)	25.2	79	25.6(5.3)	20.8
30-39	188	26.0(3.2)	12.3	85	27.3(4.4)	16.2	103	24.7(4.6)	18.7
40-49	211	28.7(3.0)	10.6	96	22.9(4.6)	20.2	115	34.3(3.9)	11.4
50-59	182	42.9(4.5)	10.5	78	37.7(5.7)	15.1	104	48.1(5.3)	11.1
60-69	112	52.0(4.7)	9.0	48	40.7(7.1)	17.4	64	61.3(6.0)	9.8
70 이상	74	43.4(6.6)	15.2	33	27.4(9.1)	33.1	41	57.9(7.8)	13.4
19-64	780	31.8(1.7)	5.5	341	27.5(2.2)	8.2	439	36.2(2.5)	6.8
65 이상	122	47.4(4.8)	10.2	55	36.4(5.9)	16.2	67	57.3(6.3)	11.1
교육수준 ²⁾									
무학	25	53.5(11.7)	21.9	5	-(-)	-	20	57.5(11.7)	20.3
초등학교	50	43.9(7.7)	17.5	17	-(-)	-	33	51.4(10.5)	20.5
중학교	62	55.0(7.2)	13.0	22	39.0(11.4)	29.3	40	64.1(8.7)	13.6
고등학교	332	34.7(2.4)	7.0	146	30.3(3.6)	11.9	186	38.9(3.5)	9.1
대학교 이상	433	27.7(2.2)	7.8	206	25.6(2.8)	11.0	227	30.2(3.2)	10.6
직업									
전문행정관리	162	32.8(3.8)	11.7	87	30.5(4.9)	16.0	75	36.2(5.9)	16.3
사무직	160	31.3(3.6)	11.5	84	28.4(5.2)	18.5	76	35.4(6.1)	17.2
판매·서비스직	110	36.7(4.7)	12.8	44	28.0(5.8)	20.6	66	44.1(6.6)	15.0
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	158	38.6(4.4)	11.5	109	32.5(4.4)	13.7	49	54.4(7.5)	13.9
기타 ³⁾	310	30.8(2.6)	8.5	70	18.7(5.0)	26.5	240	35.6(3.3)	9.1
월 가구소득									
100만원 미만	54	38.4(8.3)	21.7	19	-(-)	-	35	38.1(10.1)	26.4
100-200만원 미만	44	44.1(8.1)	18.4	15	-(-)	-	29	55.4(9.0)	16.3
200-300만원 미만	121	53.1(4.8)	9.0	60	46.8(7.2)	15.3	61	60.6(5.7)	9.3
300-400만원 미만	157	30.0(4.4)	14.7	72	23.1(5.2)	22.5	85	37.3(5.6)	15.0
400만원 이상	521	29.5(2.0)	6.7	228	25.1(2.7)	10.8	293	33.7(2.8)	8.4

주 : 1) 치매 상담콜센터 인지율 : (치매 상담 콜센터가 있다는 걸 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 76> 치매 상담콜센터 이용률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	309	5.4(1.5)	27.9	116	2.3(1.3)	56.2	193	7.6(2.3)	30.7
연령									
19-29	32	1.8(1.8)	99.6	12	-(-)	-	20	3.4(3.4)	99.5
30-39	48	2.3(2.3)	100.3	23	4.4(4.3)	98.8	25	0.0(0.0)	.
40-49	61	3.3(2.2)	66.1	23	8.4(5.6)	66.4	38	0.0(0.0)	.
50-59	80	5.1(2.6)	51.4	30	0.0(0.0)	.	50	9.2(4.6)	50.4
60-69	57	8.0(4.5)	56.5	19	-(-)	-	38	12.4(6.9)	55.2
70 이상	31	15.9(7.8)	48.8	9	-(-)	-	22	22.7(10.8)	47.6
19-64	252	4.0(1.3)	33.3	96	2.7(1.5)	56.1	156	4.9(1.9)	38.2
65 이상	57	12.8(5.7)	44.3	20	0.0(0.0)	.	37	20.2(8.3)	41.4
교육수준 ²⁾									
무학	13	-(-)	-	2	-(-)	-	11	-(-)	-
초등학교	21	13.1(9.2)	70.4	5	-(-)	-	16	-(-)	-
중학교	33	8.1(4.9)	60.2	8	-(-)	-	25	10.9(6.5)	59.3
고등학교	121	4.0(2.3)	58.6	48	0.0(0.0)	.	73	7.0(4.1)	57.9
대학교 이상	121	4.2(1.5)	35.6	53	5.0(2.7)	55.0	68	3.5(1.8)	49.6
직업									
전문행정관리	52	2.6(1.8)	68.7	26	0.0(0.0)	.	26	5.7(4.0)	70.2
사무직	52	7.8(3.5)	45.3	24	7.7(5.3)	69.5	28	8.0(4.9)	61.5
판매·서비스직	41	6.4(4.6)	71.9	15	-(-)	-	26	6.5(6.3)	96.5
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	60	3.9(2.9)	76.1	35	0.0(0.0)	.	25	9.8(7.3)	74.6
기타 ³⁾	102	6.5(3.2)	48.7	14	-(-)	-	88	7.9(3.8)	48.7
월 가구소득									
100만원 미만	21	0.0(0.0)	.	6	-(-)	-	15	-(-)	-
100-200만원 미만	19	-(-)	-	4	-(-)	-	15	-(-)	-
200-300만원 미만	62	5.3(3.3)	62.4	27	0.0(0.0)	.	35	10.2(6.3)	61.4
300-400만원 미만	47	6.0(4.2)	70.7	18	-(-)	-	29	9.9(6.9)	69.8
400만원 이상	160	5.7(2.1)	36.6	61	4.4(2.6)	57.5	99	6.6(3.2)	47.7

주 : 1) 치매 상담콜센터 이용률 : (치매 상담 콜센터를 이용한 적이 있는 사람의 수 / 치매 상담 콜센터를 알고 있는 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 77> 치매 상담콜센터 미이용 이유¹⁾

(단위: %)

구분	N ²⁾	나에게 필요 가 없어서		별로 도움이 되지 않을 것 같아서		비용이 발생 할 것 같아서		개인정보가 노출될 것 같아서		개인과 가족의 사 생활을 외부에 알 리고 싶지 않아서		기타	
		% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수
전체	293	95.6(1.3)	1.4	1.3(0.8)	62.7	0.0(0.0)	.	0.6(0.6)	101.0	0.3(0.3)	100.1	2.2(0.9)	42.7
성													
남자	113	95.5(2.4)	2.6	2.5(1.9)	74.2	0.0(0.0)	.	1.4(1.4)	101.1	0.0(0.0)	.	0.6(0.6)	100.1
여자	180	95.8(1.7)	1.8	0.4(0.4)	100.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.4(0.4)	100.5	3.4(1.6)	46.8
연령													
19-29	31	95.7(4.3)	4.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	4.3(4.3)	99.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
30-39	47	100.0(0.0)	0.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
40-49	59	98.1(1.9)	1.9	1.9(1.9)	100.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
50-59	76	96.6(2.8)	2.9	2.6(2.6)	100.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.8(0.9)	101.0
60-69	54	95.6(3.2)	3.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.6(1.6)	99.9	2.8(2.8)	99.9
70 이상	26	79.0(8.9)	11.2	3.0(2.9)	96.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	17.9(8.7)	48.3
19-64	242	97.2(1.3)	1.4	1.3(0.9)	73.9	0.0(0.0)	.	0.7(0.7)	101.1	0.0(0.0)	.	0.8(0.6)	74.5
65 이상	51	86.6(5.2)	6.1	1.7(1.6)	96.6	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.7(1.7)	101.0	10.0(4.9)	49.2
교육수준 ³⁾													
무학	11	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	19	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
중학교	30	88.5(6.8)	7.7	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	11.5(6.8)	59.2
고등학교	118	98.5(1.5)	1.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.5(1.5)	99.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
대학교 이상	115	97.2(2.0)	2.1	2.8(2.0)	73.7	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
직업													
전문행정관리	50	97.9(2.1)	2.1	2.1(2.1)	101.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
사무직	48	100.0(0.0)	0.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	39	100.0(0.0)	0.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
농림어업	2	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	58	94.5(3.9)	4.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.9(2.9)	99.6	0.0(0.0)	.	2.6(2.6)	100.5
기타 ⁴⁾	96	90.7(3.0)	3.3	3.1(2.4)	76.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.8(0.8)	100.5	5.4(2.4)	44.9
월 가구소득													
100만원 미만	21	85.5(9.2)	10.8	10.9(10.0)	91.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	3.6(3.6)	98.9
100-200만원 미만	17	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
200-300만원 미만	59	95.3(2.7)	2.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	4.7(2.7)	58.2
300-400만원 미만	45	95.6(3.3)	3.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.6(1.6)	100.1	2.8(2.8)	101.0
400만원 이상	151	96.6(1.8)	1.9	1.2(0.9)	71.9	0.0(0.0)	.	1.2(1.2)	100.9	0.0(0.0)	.	1.0(1.0)	99.3

주 : 1) 치매 상담콜센터 미이용 이유 : (응답보기별 응답자 수 / 치매 상담 콜센터를 알고 있으나 치매 상담 콜센터를 이용하지 않은 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 제학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 78> 인지장애 경험률(≥50)¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	368	29.0(2.5)	8.5	159	27.5(3.3)	12.2	209	30.3(3.4)	11.4
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
40-49	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
50-59	182	23.5(3.4)	14.3	78	20.5(4.8)	23.4	104	26.5(4.7)	17.6
60-69	112	38.2(4.3)	11.3	48	38.5(6.3)	16.4	64	37.9(5.4)	14.2
70 이상	74	31.7(5.8)	18.2	33	34.3(8.2)	23.8	41	29.4(7.2)	24.4
19-64	246	27.5(3.0)	10.8	104	24.7(4.2)	17.0	142	30.2(4.0)	13.2
65 이상	122	32.5(4.3)	13.3	55	34.4(6.2)	18.1	67	30.7(5.8)	19.0
교육수준 ²⁾									
무학	25	32.4(9.2)	28.4	5	-(-)	-	20	41.0(11.0)	26.8
초등학교	50	28.4(6.8)	23.9	17	-(-)	-	33	25.9(7.6)	29.5
중학교	57	32.5(6.1)	18.9	20	43.8(12.2)	27.8	37	26.2(7.4)	28.4
고등학교	142	33.8(4.6)	13.5	58	35.6(6.6)	18.6	84	32.5(5.3)	16.4
대학교 이상	94	19.9(3.9)	19.9	59	16.4(4.5)	27.3	35	28.6(8.0)	28.1
직업									
전문행정관리	46	28.6(7.6)	26.5	27	30.0(9.3)	31.0	19	-(-)	-
사무직	37	17.7(6.2)	35.1	26	13.9(6.7)	47.9	11	-(-)	-
판매·서비스직	38	21.1(6.1)	28.8	8	-(-)	-	30	24.5(7.5)	30.7
농림어업	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
기능·단순노무직	86	29.8(4.8)	16.2	55	29.3(5.1)	17.3	31	30.9(8.2)	26.6
기타 ³⁾	160	33.9(4.1)	12.1	42	37.4(8.0)	21.3	118	32.5(4.4)	13.5
월 가구소득									
100만원 미만	41	34.3(9.0)	26.4	15	-(-)	-	26	41.5(12.3)	29.7
100-200만원 미만	30	36.4(8.5)	23.3	10	-(-)	-	20	31.7(10.2)	32.3
200-300만원 미만	73	30.0(5.0)	16.7	35	28.4(6.2)	21.8	38	31.6(6.6)	20.7
300-400만원 미만	56	29.1(7.2)	24.6	26	32.4(10.5)	32.5	30	25.4(8.3)	32.7
400만원 이상	165	24.9(3.6)	14.4	72	22.9(4.9)	21.6	93	26.9(4.6)	17.1

주 : 1) 인지장애 경험률 : (최근 1년 동안 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어져서 평소 잘 하던 집안일이나 일상 생활에서의 일을 못한 적이 “항상” 또는 “자주”에 응답한 사람의 수 / 50세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 79> 인지장애로 인한 지장 및 도움(≥50)

(단위: %)

구분	인지장애로 인한 일상 생활 지장률 ¹⁾			인지장애로 인한 도움 필요율 ²⁾			일상생활 도움 수혜율 ³⁾			인지장애로 인한 사회 활동 지장률 ⁴⁾		
	N	%(표준 오차)	변동계수	N	%(표준 오차)	변동계수	N	%(표준 오차)	변동계수	N	%(표준 오차)	변동계수
전체	114	6.8(2.0)	29.8	114	2.1(1.2)	57.0	26	51.4(10.4)	20.3	114	1.3(1.3)	99.6
연령												
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
40-49	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
50-59	45	2.9(2.9)	99.6	45	0.0(0.0)	.	6	-(-)	-	45	2.9(2.9)	99.6
60-69	45	5.7(2.9)	51.2	45	2.0(2.0)	100.6	11	-(-)	-	45	0.0(0.0)	.
70 이상	24	17.2(6.0)	35.1	24	6.6(4.1)	61.6	9	-(-)	-	24	0.0(0.0)	.
19-64	73	3.9(2.4)	61.1	73	0.0(0.0)	.	13	-(-)	-	73	1.9(1.9)	99.5
65 이상	41	12.8(3.6)	28.0	41	6.2(3.2)	51.7	13	-(-)	-	41	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾												
무학	9	-(-)	-	9	-(-)	-	3	-(-)	-	9	-(-)	-
초등학교	15	-(-)	-	15	-(-)	-	7	-(-)	-	15	-(-)	-
중학교	21	4.0(3.7)	93.6	21	4.0(3.7)	93.6	4	-(-)	-	21	0.0(0.0)	.
고등학교	48	6.1(3.5)	56.9	48	0.0(0.0)	.	10	-(-)	-	48	2.9(2.9)	97.8
대학교 이상	21	0.0(0.0)	.	21	0.0(0.0)	.	2	-(-)	-	21	0.0(0.0)	.
직업												
전문행정관리	13	-(-)	-	13	-(-)	-	3	-(-)	-	13	-(-)	-
사무직	7	-(-)	-	7	-(-)	-	1	-(-)	-	7	-(-)	-
판매·서비스직	10	-(-)	-	10	-(-)	-	1	-(-)	-	10	-(-)	-
농림어업	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	27	0.0(0.0)	.	27	0.0(0.0)	.	5	-(-)	-	27	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	57	14.3(4.1)	28.6	57	4.3(2.4)	55.7	16	-(-)	-	57	2.7(2.7)	99.4
월 가구소득												
100만원 미만	15	-(-)	-	15	-(-)	-	4	-(-)	-	15	-(-)	-
100-200만원 미만	11	-(-)	-	11	-(-)	-	4	-(-)	-	11	-(-)	-
200-300만원 미만	24	3.4(3.4)	99.0	24	0.0(0.0)	.	6	-(-)	-	24	0.0(0.0)	.
300-400만원 미만	16	-(-)	-	16	-(-)	-	6	-(-)	-	16	-(-)	-
400만원 이상	46	3.3(3.2)	98.1	46	1.5(1.5)	99.6	6	-(-)	-	46	3.3(3.2)	98.1

주 : 1) 인지장애로 인한 일상생활 지장률 : (최근 1년 동안 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어져서 평소 잘 하던 집안일이나 일상 생활에서의 일을 못한 적이 “항상” 또는 “자주”에 응답한 사람의 수 / 인지장애 경험에 있다고 응답한 50세 이상 사람의 수) × 100

2) 인지장애로 인한 도움 필요율 : (정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어진 것 때문에, 일상생활에서 “항상” 또는 “자주”에 응답한 사람의 수 / 인지장애 경험에 있다고 응답한 50세 이상 사람의 수) × 100

3) 일상생활 도움 수혜율 : (일상생활에서 도움이 필요할 때, “항상” 또는 “자주”에 응답한 사람의 수 / 인지장애로 인한 도움이 필요하다고 응답한 50세 이상 사람의 수) × 100

4) 인지장애로 인한 사회활동 지장률 : (최근 1년 동안 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어져서 직장생활이나 자원봉사, 사회활동을 하는데 “항상” 또는 “자주”에 응답한 사람의 수 / 인지장애 경험에 있다고 응답한 50세 이상 사람의 수) × 100

5) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 제학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

6) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 80> 인지장애 상담률(≥50)¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	114	5.2(2.2)	43.4	45	5.5(4.2)	76.0	69	4.9(2.1)	43.8
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
40-49	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
50-59	45	4.1(4.0)	98.5	16	-(-)	-	29	0.0(0.0)	.
60-69	45	1.7(1.6)	94.6	19	-(-)	-	26	3.2(3.0)	94.7
70 이상	24	13.5(5.8)	42.5	10	-(-)	-	14	-(-)	-
19-64	73	2.7(2.7)	98.3	27	6.2(5.9)	95.2	46	0.0(0.0)	.
65 이상	41	10.2(3.6)	35.1	18	-(-)	-	23	16.1(7.0)	43.7
교육수준 ²⁾									
무학	9	-(-)	-	0	-(-)	-	9	-(-)	-
초등학교	15	-(-)	-	5	-(-)	-	10	-(-)	-
중학교	21	4.0(3.7)	93.6	9	-(-)	-	12	-(-)	-
고등학교	48	5.7(4.3)	74.4	20	12.4(8.9)	71.7	28	0.0(0.0)	.
대학교 이상	21	0.0(0.0)	.	11	-(-)	-	10	-(-)	-
직업									
전문행정관리	13	-(-)	-	8	-(-)	-	5	-(-)	-
사무직	7	-(-)	-	4	-(-)	-	3	-(-)	-
판매·서비스직	10	-(-)	-	1	-(-)	-	9	-(-)	-
농림어업	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
기능·단순노무직	27	0.0(0.0)	.	17	-(-)	-	10	-(-)	-
기타 ³⁾	57	10.8(4.2)	39.1	15	-(-)	-	42	8.1(3.5)	42.7
월 가구소득									
100만원 미만	15	-(-)	-	5	-(-)	-	10	-(-)	-
100-200만원 미만	11	-(-)	-	4	-(-)	-	7	-(-)	-
200-300만원 미만	24	9.4(9.1)	97.0	10	-(-)	-	14	-(-)	-
300-400만원 미만	16	-(-)	-	7	-(-)	-	9	-(-)	-
400만원 이상	46	1.5(1.5)	99.6	18	-(-)	-	28	2.8(2.8)	100.3

주 : 1) 인지장애 상담률 : (정신 혼란이나 기억력 감소 때문에 본인이나 다른 사람이 전문가의 상담을 받은 적이 있는 사람의 수 / 인지장애 경험이 있다고 응답한 50세 이상 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 81> 연간 치매선별검사 수진율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	368	11.3(1.7)	15.0	159	8.1(2.1)	25.5	209	14.2(2.5)	17.5
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
40-49	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
50-59	182	1.5(1.2)	81.4	78	2.3(2.3)	100.0	104	0.7(0.7)	99.6
60-69	112	8.6(2.8)	32.4	48	2.0(1.9)	96.8	64	14.0(4.8)	33.9
70 이상	74	44.0(6.2)	14.0	33	34.8(8.6)	24.8	41	52.2(8.8)	16.9
19-64	246	2.4(1.1)	47.0	104	2.5(1.9)	76.7	142	2.4(1.2)	49.7
65 이상	122	32.5(4.6)	14.2	55	22.0(5.7)	26.0	67	42.0(6.7)	15.9
교육수준									
무학	25	34.1(11.1)	32.6	5	-(-)	-	20	32.4(11.1)	34.2
초등학교	50	25.0(6.3)	25.3	17	-(-)	-	33	31.2(7.8)	24.9
중학교	57	23.3(5.3)	22.6	20	27.6(10.7)	38.8	37	20.9(6.2)	29.8
고등학교	142	5.5(2.2)	40.2	58	4.2(2.4)	58.0	84	6.6(2.9)	44.7
대학교 이상	94	1.6(1.1)	65.5	59	2.3(1.5)	66.0	35	0.0(0.0)	.
직업									
전문행정관리	46	4.5(4.5)	99.4	27	6.8(6.7)	98.1	19	-(-)	-
사무직	37	0.0(0.0)	.	26	0.0(0.0)	.	11	-(-)	-
판매·서비스직	38	4.3(3.0)	70.4	8	-(-)	-	30	5.7(3.9)	69.3
농림어업	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	86	7.8(3.1)	39.4	55	4.7(3.4)	71.2	31	14.0(8.0)	57.2
기타	160	20.5(3.1)	15.2	42	21.4(5.6)	26.5	118	20.1(3.6)	17.8
월 가구소득									
100만원 미만	41	35.3(7.5)	21.2	15	-(-)	-	26	36.2(9.7)	26.9
100-200만원 미만	30	7.7(4.5)	58.4	10	-(-)	-	20	12.3(7.0)	56.8
200-300만원 미만	73	13.5(4.8)	35.6	35	12.4(5.6)	45.6	38	14.5(7.0)	47.8
300-400만원 미만	56	10.7(5.2)	48.2	26	12.7(7.8)	61.3	30	8.6(5.1)	59.3
400만원 이상	165	6.3(1.9)	29.6	72	1.0(1.0)	99.6	93	11.6(3.4)	29.8

주 : 1) 연간 치매선별검사 수진율 : (최근 1년 동안 치매선별검사를 받은 적이 있는 사람의 수 / 50세 이상 조사대상 응답자의 수) × 100

<표 82> 연간 치매선별검사 장소¹⁾

(단위: %)

구분	N ²⁾	치매안심센터 (보건소)		보건지소, 보건진 료소		병의원		기타	
		%(표준 오차)	변동 계수	%(표준 오차)	변동 계수	%(표준 오차)	변동 계수	%(표준 오차)	변동 계수
전체	45	36.6(8.1)	22.0	27.1(8.5)	31.4	25.6(7.8)	30.6	10.7(3.5)	32.8
성									
남자	14	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
여자	31	40.0(9.6)	24.0	24.6(9.7)	39.3	18.9(7.8)	41.0	16.4(5.4)	32.9
연령									
19-29	0	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	0	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
40-49	0	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
50-59	2	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
60-69	9	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
70 이상	34	36.9(9.8)	26.6	34.0(9.6)	28.3	17.5(5.8)	33.1	11.7(4.8)	41.0
19-64	6	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
65 이상	39	41.1(8.9)	21.6	32.0(9.4)	29.4	16.9(5.2)	30.9	10.0(4.1)	41.1
교육수준 ³⁾									
무학	9	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	13	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
중학교	13	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
고등학교	8	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
대학교 이상	2	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
직업									
전문행정관리	1	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
사무직	0	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
판매·서비스직	2	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
농림어업	0	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	5	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기타 ⁴⁾	37	29.4(7.9)	26.9	36.5(9.9)	27.0	24.8(7.8)	31.3	9.4(4.7)	50.6
월 가구소득									
100만원 미만	14	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
100-200만원 미만	3	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
200-300만원 미만	10	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
300-400만원 미만	6	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
400만원 이상	12	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-

주 : 1) 연간 치매선별검사 장소 : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

<표 83> 스트레스 원인¹⁾

(단위: %)

구분	N ²⁾	경제적인 문제		질병문제		가족문제		진로문제		대인관계		기타	
		%(표준 오차)	변동 계수	%(표준 오차)	변동 계수	%(표준 오차)	변동 계수	%(표준 오차)	변동 계수	%(표준 오차)	변동 계수	%(표준 오차)	변동 계수
전체	274	29.6(3.2)	10.7	4.1(1.2)	28.3	16.6(2.1)	12.9	9.0(1.8)	19.8	18.1(2.5)	13.8	22.6(2.4)	10.8
성													
남자	119	40.9(4.6)	11.3	1.5(1.1)	70.7	7.7(2.1)	27.0	8.3(2.7)	32.7	20.8(3.5)	16.7	20.9(3.5)	16.7
여자	155	18.6(3.2)	17.4	6.5(2.0)	30.8	25.3(3.8)	15.1	9.7(2.5)	25.6	15.5(3.0)	19.6	24.4(3.3)	13.5
연령													
19-29	44	22.8(6.4)	27.9	0.0(0.0)	3.5(2.3)	66.0	36.2(6.8)	18.7	19.4(6.0)	31.1	18.0(6.5)	35.9	
30-39	71	25.1(5.3)	21.0	2.2(1.5)	69.6	16.1(4.5)	27.7	4.4(1.9)	44.0	16.5(4.2)	25.7	35.7(4.9)	13.9
40-49	70	36.1(5.9)	16.2	3.0(2.1)	70.4	22.8(4.6)	20.3	1.6(1.5)	95.4	18.5(3.5)	18.9	18.0(4.9)	27.3
50-59	50	30.2(7.9)	26.3	7.2(3.6)	50.1	16.5(5.5)	33.1	2.0(2.0)	97.8	22.5(5.9)	26.2	21.4(6.1)	28.6
60-69	26	37.1(10.4)	28.1	10.2(5.8)	56.7	28.7(8.2)	28.5	0.0(0.0)	7.1(5.0)	70.0	16.9(8.1)	47.8	
70 이상	13	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
19-64	253	29.1(3.3)	11.3	3.5(1.1)	31.7	16.6(2.2)	13.6	9.6(1.9)	19.4	18.3(2.6)	14.2	22.9(2.4)	10.5
65 이상	21	36.5(11.1)	30.5	12.9(5.9)	46.0	17.1(8.8)	51.5	0.0(0.0)	15.6(8.9)	57.1	17.9(9.5)	53.0	
교육수준 ³⁾													
무학	7	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	9	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
중학교	14	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
고등학교	85	34.5(5.4)	15.7	9.0(2.8)	31.7	16.6(4.3)	25.7	6.3(2.7)	42.4	12.6(3.8)	30.1	21.0(4.0)	19.1
대학교 이상	159	27.0(3.9)	14.5	0.0(0.0)	14.5(2.9)	19.9	12.1(2.7)	22.2	21.3(3.0)	14.1	25.0(3.2)	12.8	
직업													
전문행정관리	64	26.0(6.2)	23.6	3.8(2.3)	60.3	13.6(4.7)	34.9	5.8(3.1)	54.1	26.6(5.5)	20.7	24.2(6.0)	24.6
사무직	61	31.1(5.2)	16.8	0.0(0.0)	9.7(4.1)	42.0	3.4(2.4)	71.1	28.8(5.5)	19.1	27.0(4.6)	16.9	
판매·서비스직	37	47.2(8.8)	18.7	8.4(5.2)	61.8	3.2(2.3)	71.3	8.4(4.9)	58.9	16.8(7.7)	45.7	16.0(6.3)	39.3
농림어업	1	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	36	35.6(7.9)	22.1	5.0(3.3)	66.0	9.1(5.1)	56.3	3.0(0.5)	16.4	25.0(6.1)	24.4	22.2(6.6)	29.5
기타 ⁴⁾	75	19.9(4.9)	24.4	4.8(2.2)	45.4	34.9(6.3)	18.0	19.2(5.0)	25.8	0.9(0.9)	99.4	20.2(5.0)	24.6
월 가구소득													
100만원 미만	17	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
100-200만원 미만	9	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
200-300만원 미만	42	35.2(4.4)	12.4	3.3(2.3)	71.2	16.0(4.9)	30.8	5.2(4.8)	92.7	17.0(5.6)	33.2	23.4(5.8)	24.8
300-400만원 미만	46	36.0(8.6)	24.0	7.5(4.3)	57.8	19.5(6.8)	35.1	4.5(3.2)	70.1	16.5(5.8)	35.2	16.0(5.7)	35.5
400만원 이상	158	24.7(4.2)	17.0	2.5(1.1)	45.1	15.3(2.8)	18.0	11.8(2.6)	21.9	21.0(2.9)	13.8	24.6(3.0)	12.1

주 : 1) 스트레스 원인 : (응답보기별 응답자 수 / 평소 일상생활 중 스트레스를 "대단히 많이 느낀다" 또는 "많이 느끼는 편이다"에 응답한 사람의 수) × 100

2) 최근 1년(365일) 동안 죽고 싶다는 생각을 한 적이 있는 사람의 수

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 제학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 84> 우울감 원인¹⁾

(단위: %)

구분	N ²⁾	경제적인 문제		질병문제		가족문제		진로문제		대인관계		기타	
		%(표준 오차)	변동 계수	%(표준 오차)	변동 계수	%(표준 오차)	변동 계수	%(표준 오차)	변동 계수	%(표준 오차)	변동 계수	%(표준 오차)	변동 계수
전체	71	33.9(4.9)	14.5	4.8(3.0)	61.4	36.7(4.8)	13.0	1.0(0.1)	9.8	19.8(4.6)	23.3	3.8(2.2)	57.9
성													
남자	21	49.6(12.3)	24.9	7.5(6.9)	91.5	19.6(8.8)	44.7	0.0(0.0)	.	23.3(11.0)	47.4	0.0(0.0)	.
여자	50	24.6(4.8)	19.6	3.2(2.2)	69.2	46.7(6.0)	12.9	1.6(0.1)	8.9	17.7(6.0)	33.5	6.0(3.4)	56.9
연령													
19-29	10	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
40-49	16	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
50-59	11	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
60-69	12	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
70 이상	7	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
19-64	57	32.4(5.6)	17.4	3.3(3.2)	96.9	38.0(4.8)	12.7	1.2(0.1)	10.1	22.1(5.8)	26.2	3.1(2.2)	69.9
65 이상	14	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
교육수준 ³⁾													
무학	6	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	2	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
중학교	7	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
고등학교	27	36.1(8.8)	24.4	8.3(6.2)	74.7	29.4(5.3)	18.0	0.0(0.0)	.	20.3(8.0)	39.5	5.8(4.2)	71.2
대학교 이상	29	25.6(7.8)	30.3	0.0(0.0)	.	45.8(8.9)	19.6	2.7(0.3)	10.9	25.8(9.4)	36.2	0.0(0.0)	.
직업													
전문행정관리	8	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
사무직	8	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
판매·서비스직	9	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
농림어업	0	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	8	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기타 ⁴⁾	38	28.4(6.0)	21.0	9.7(5.8)	59.9	45.6(6.2)	13.7	2.0(0.3)	15.0	6.6(3.4)	50.7	7.6(4.3)	56.1
월 가구소득													
100만원 미만	13	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
100-200만원 미만	7	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
200-300만원 미만	13	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
300-400만원 미만	12	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
400만원 이상	26	29.7(7.5)	25.2	0.0(0.0)	.	28.3(6.5)	23.1	0.0(0.0)	.	38.6(10.0)	25.9	3.4(3.4)	101.6

주: 1) 우울감 원인: (응답보기별 응답자 수 / 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 슬픔이나 절망감을 느낀 적이 있는 사람의 수) × 100

2) 최근 1년(365일) 동안 죽고 싶다는 생각을 한 적이 있는 사람의 수

3) 교육수준: 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타: 군인, 학생, 주부, 무직

<표 85> 평생 치매 선별검사 수진율(≥60)¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	186	28.3(3.2)	11.1	81	16.6(4.0)	24.3	105	38.3(4.5)	11.7
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
40-49	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
50-59	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
60-69	112	15.0(3.3)	22.1	48	3.5(2.4)	67.8	64	24.5(5.4)	21.9
70 이상	74	47.5(6.1)	12.8	33	34.7(8.3)	24.0	41	59.2(8.0)	13.5
19-64	64	6.7(2.6)	38.1	26	0.0(0.0)	.	38	11.9(4.6)	38.4
65 이상	122	40.1(4.5)	11.2	55	25.0(5.8)	23.1	67	53.8(6.2)	11.6
교육수준 ²⁾									
무학	25	45.8(11.8)	25.9	5	-(-)	-	20	47.1(12.5)	26.6
초등학교	45	30.1(7.4)	24.6	16	-(-)	-	29	39.3(8.5)	21.5
중학교	37	37.9(8.9)	23.5	14	-(-)	-	23	43.7(11.3)	25.9
고등학교	54	20.8(5.8)	27.7	28	13.4(4.8)	35.9	26	29.0(8.9)	30.7
대학교 이상	25	12.6(5.9)	47.1	18	-(-)	-	7	-(-)	-
직업									
전문행정관리	9	-(-)	-	8	-(-)	-	1	-(-)	-
사무직	5	-(-)	-	3	-(-)	-	2	-(-)	-
판매·서비스직	11	-(-)	-	2	-(-)	-	9	-(-)	-
농림어업	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	44	21.0(4.6)	21.7	31	12.2(5.8)	47.7	13	-(-)	-
기타 ³⁾	117	36.6(4.7)	12.8	37	26.1(7.2)	27.5	80	42.3(5.0)	11.9
월 가구소득									
100만원 미만	35	44.1(10.5)	23.7	12	-(-)	-	23	45.9(11.6)	25.2
100-200만원 미만	22	17.2(8.4)	49.1	9	-(-)	-	13	-(-)	-
200-300만원 미만	54	28.8(6.8)	23.7	27	20.8(7.1)	33.9	27	36.9(11.0)	29.7
300-400만원 미만	27	16.1(7.1)	44.4	13	-(-)	-	14	-(-)	-
400만원 이상	46	30.9(6.2)	20.2	19	-(-)	-	27	52.1(8.9)	17.0

주 : 1) 평생 치매 선별검사 수진율(≥60) : (평생동안 치매 선별검사를 받은 적이 있는 사람의 수 / 60세 이상 조사대상 응답자의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 86> 연간 인플루엔자 예방접종률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	40.1(1.8)	4.6	396	36.9(2.6)	7.2	506	43.2(2.2)	5.2
연령									
19-29	135	21.8(4.1)	18.9	56	22.6(6.1)	27.1	79	21.0(4.6)	21.8
30-39	188	42.0(3.4)	8.2	85	26.5(4.6)	17.4	103	57.1(4.2)	7.4
40-49	211	34.4(3.4)	10.0	96	37.3(4.3)	11.4	115	31.7(5.1)	16.1
50-59	182	29.1(3.9)	13.5	78	30.6(5.5)	18.0	104	27.5(4.3)	15.8
60-69	112	65.9(4.7)	7.1	48	55.6(6.8)	12.2	64	74.4(6.9)	9.2
70 이상	74	96.9(1.8)	1.8	33	97.7(2.2)	2.2	41	96.1(2.7)	2.8
19-64	780	33.4(1.8)	5.3	341	30.2(2.5)	8.1	439	36.5(2.5)	6.8
65 이상	122	91.3(2.5)	2.7	55	90.0(4.1)	4.6	67	92.5(3.4)	3.6
교육수준 ²⁾									
무학	25	96.0(3.9)	4.0	5	-(-)	-	20	100.0(0.0)	0.0
초등학교	50	72.2(7.3)	10.1	17	-(-)	-	33	70.7(8.5)	12.1
중학교	62	53.6(7.0)	13.0	22	52.8(11.7)	22.1	40	54.0(9.1)	16.9
고등학교	332	37.3(3.1)	8.3	146	37.9(4.3)	11.4	186	36.8(3.6)	9.7
대학교 이상	433	34.5(2.4)	6.9	206	30.9(3.3)	10.7	227	38.8(3.4)	8.8
직업									
전문행정관리	162	32.5(3.8)	11.7	87	26.2(4.9)	18.7	75	41.8(6.3)	15.1
사무직	160	34.2(4.1)	12.0	84	35.5(5.4)	15.1	76	32.2(5.5)	17.1
판매·서비스직	110	35.8(4.7)	13.2	44	36.1(7.1)	19.8	66	35.5(6.7)	18.8
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	158	44.8(3.9)	8.7	109	43.6(5.1)	11.7	49	47.8(6.9)	14.3
기타 ³⁾	310	46.7(2.9)	6.3	70	42.9(5.1)	11.9	240	48.1(3.1)	6.5
월 가구소득									
100만원 미만	54	64.4(9.4)	14.5	19	-(-)	-	35	66.9(11.0)	16.4
100-200만원 미만	44	56.0(9.0)	16.1	15	-(-)	-	29	51.9(10.9)	21.0
200-300만원 미만	121	40.8(4.2)	10.2	60	40.7(5.7)	13.9	61	41.0(6.0)	14.7
300-400만원 미만	157	37.9(4.3)	11.2	72	35.8(4.8)	13.3	85	40.1(5.7)	14.2
400만원 이상	521	36.7(2.3)	6.2	228	32.2(3.0)	9.5	293	41.2(3.2)	7.7

주 : 1) 연간 인플루엔자 예방접종률 : (최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 87> 혈압 및 혈당수치 인지율

(단위: %)

구분	혈압수치 인지율 ¹⁾			혈당수치 인지율 ²⁾		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	41.0(1.6)	3.9	902	14.8(1.2)	8.4
성						
남자	396	44.6(2.6)	5.8	396	16.2(1.8)	11.2
여자	506	37.5(1.9)	5.1	506	13.5(1.5)	11.0
연령						
19-29	135	15.3(3.3)	21.4	135	2.7(1.6)	59.3
30-39	188	27.3(3.3)	12.1	188	4.4(1.6)	35.3
40-49	211	45.6(3.5)	7.7	211	11.4(2.2)	19.6
50-59	182	53.5(3.7)	7.0	182	20.6(3.5)	16.9
60-69	112	65.2(4.7)	7.2	112	38.6(4.5)	11.5
70 이상	74	57.6(5.8)	10.0	74	32.8(6.1)	18.7
19-64	780	38.6(1.7)	4.5	780	12.1(1.2)	10.0
65 이상	122	59.0(4.1)	7.0	122	35.8(4.6)	12.7
교육수준 ³⁾						
무학	25	60.4(7.8)	12.9	25	43.3(10.8)	25.0
초등학교	50	51.8(5.5)	10.6	50	27.4(6.3)	23.1
중학교	62	54.2(7.6)	14.0	62	12.9(4.2)	32.7
고등학교	332	35.9(2.5)	7.1	332	16.7(2.3)	13.7
대학교 이상	433	41.2(2.6)	6.3	433	11.0(1.7)	15.2
직업						
전문행정관리	162	49.7(4.0)	8.1	162	14.9(2.9)	19.4
사무직	160	42.0(4.2)	10.1	160	11.3(2.6)	22.6
판매·서비스직	110	30.6(5.0)	16.5	110	15.1(4.1)	27.5
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-
기능단순노무직	158	47.7(4.3)	9.0	158	14.9(2.7)	17.9
기타 ⁴⁾	310	36.8(2.5)	6.8	310	16.6(2.3)	13.9
월 가구소득						
100만원 미만	54	49.3(7.2)	14.6	54	35.3(7.3)	20.8
100-200만원 미만	44	38.0(6.5)	17.1	44	10.3(4.7)	45.6
200-300만원 미만	121	43.7(3.8)	8.7	121	24.9(4.4)	17.5
300-400만원 미만	157	37.2(4.8)	12.8	157	14.0(3.2)	23.0
400만원 이상	521	41.3(2.4)	5.8	521	11.5(1.4)	12.2

주 : 1) 혈압수치 인지율 : (본인의 혈압 수치를 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 혈당수치 인지율 : (본인의 혈당 수치를 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 88> 본인 인지 혈압 및 혈당조절률

(단위: %)

구분	본인 인지 혈압조절률 ¹⁾			본인 인지 혈당조절률 ²⁾		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	174	94.2(2.0)	2.1	70	81.8(5.5)	6.8
성						
남자	95	93.0(2.9)	3.1	34	80.8(8.8)	10.9
여자	79	96.1(2.2)	2.3	36	83.0(4.5)	5.5
연령						
19-29	1	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	5	-(-)	-	2	-(-)	-
40-49	26	92.7(5.2)	5.6	9	-(-)	-
50-59	46	95.1(3.5)	3.7	14	-(-)	-
60-69	52	95.9(2.9)	3.0	21	77.8(9.1)	11.7
70 이상	44	100.0(0.0)	0.0	24	88.9(5.7)	6.4
19-64	101	92.6(2.9)	3.1	36	77.4(8.0)	10.4
65 이상	73	97.1(2.1)	2.1	34	87.1(5.6)	6.4
교육수준 ³⁾						
무학	17	-(-)	-	11	-(-)	-
초등학교	28	95.7(4.4)	4.6	10	-(-)	-
중학교	23	93.6(4.6)	4.9	9	-(-)	-
고등학교	60	94.5(3.3)	3.5	24	73.6(11.3)	15.3
대학교 이상	46	92.1(4.6)	5.0	16	-(-)	-
직업						
전문행정관리	19	-(-)	-	8	-(-)	-
사무직	19	-(-)	-	5	-(-)	-
판매·서비스직	20	87.2(8.0)	9.1	6	-(-)	-
농림어업	0	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	39	100.0(0.0)	0.0	9	-(-)	-
기타 ⁴⁾	77	95.3(2.8)	2.9	42	79.8(6.8)	8.6
월 가구소득						
100만원 미만	27	87.1(7.3)	8.4	14	-(-)	-
100-200만원 미만	14	-(-)	-	6	-(-)	-
200-300만원 미만	28	96.3(3.6)	3.8	21	78.8(9.7)	12.2
300-400만원 미만	30	84.3(7.5)	8.9	6	-(-)	-
400만원 이상	73	98.7(1.3)	1.3	22	85.4(10.5)	12.3

주 : 1) 본인 인지 혈압조절률 : (혈압이 잘 조절되고 있다고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 본인 인지 혈당조절률 : (혈당이 잘 조절되고 있다고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 89> 고혈압 최초 진단 시기¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	174	51.7(1.1)	2.1	95	50.3(1.5)	2.9	79	53.9(1.3)	2.3
연령									
19-29	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	5	-(-)	-	4	-(-)	-	1	-(-)	-
40-49	26	40.3(0.9)	2.2	22	40.4(1.0)	2.4	4	-(-)	-
50-59	46	47.7(0.9)	2.0	27	48.4(1.1)	2.2	19	-(-)	-
60-69	52	54.7(1.3)	2.3	22	54.3(2.3)	4.2	30	55.0(1.3)	2.3
70 이상	44	64.7(2.0)	3.1	19	-(-)	-	25	62.2(1.7)	2.7
19-64	101	46.0(0.8)	1.7	63	45.3(1.0)	2.1	38	47.8(1.4)	2.9
65 이상	73	61.5(1.7)	2.7	32	62.9(2.8)	4.4	41	60.2(1.2)	2.0
교육수준 ²⁾									
무학	17	-(-)	-	3	-(-)	-	14	-(-)	-
초등학교	28	60.6(2.2)	3.6	8	-(-)	-	20	58.7(2.1)	3.6
중학교	23	57.0(2.9)	5.1	9	-(-)	-	14	-(-)	-
고등학교	60	49.0(1.9)	3.8	37	49.1(2.3)	4.7	23	48.7(1.9)	3.9
대학교 이상	46	45.9(1.3)	2.9	38	46.0(1.3)	2.8	8	-(-)	-
직업									
전문행정관리	19	-(-)	-	16	-(-)	-	3	-(-)	-
사무직	19	-(-)	-	17	-(-)	-	2	-(-)	-
판매·서비스직	20	43.7(2.2)	5.0	10	-(-)	-	10	-(-)	-
농림어업	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	39	55.6(2.1)	3.7	29	55.3(2.6)	4.6	10	-(-)	-
기타 ³⁾	77	56.0(1.5)	2.8	23	56.1(2.9)	5.2	54	55.9(1.4)	2.5
월 가구소득									
100만원 미만	27	58.1(2.9)	4.9	11	-(-)	-	16	-(-)	-
100-200만원 미만	14	-(-)	-	6	-(-)	-	8	-(-)	-
200-300만원 미만	28	54.9(2.0)	3.6	15	-(-)	-	13	-(-)	-
300-400만원 미만	30	50.4(2.1)	4.1	16	-(-)	-	14	-(-)	-
400만원 이상	73	47.2(1.3)	2.7	46	45.4(1.3)	2.9	27	51.4(2.1)	4.1

주 : 1) 고혈압 최초 진단 시기 : 고혈압을 최초 진단받은 만 나이의 총합 / 의사진단을 받은 사람의 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 90> 고혈압 진단 경험률 및 현재치료율, 진단 경험자의 치료율

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
고혈압 진단 경험률									
전체 ¹⁾	902	18.3(1.1)	6.3	396	22.8(1.9)	8.5	506	13.9(1.4)	10.1
30세 이상 ²⁾	767	22.6(1.5)	6.6	340	28.3(2.4)	8.7	427	17.1(1.7)	10.0
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	188	2.6(1.1)	41.2	85	4.5(2.2)	48.7	103	0.9(0.9)	99.1
40-49	211	12.8(2.5)	19.2	96	23.4(4.3)	18.1	115	2.7(1.3)	49.5
50-59	182	27.3(3.4)	12.6	78	36.2(5.8)	16.1	104	18.3(4.2)	22.9
60-69	112	44.4(4.2)	9.5	48	44.3(7.2)	16.3	64	44.4(5.9)	13.4
70 이상	74	57.6(5.7)	9.9	33	59.0(8.2)	13.9	41	56.2(7.9)	14.1
고혈압 현재치료율									
전체 ³⁾	174	93.9(1.8)	1.9	95	90.7(3.1)	3.4	79	98.9(1.1)	1.1
30세 이상 ⁴⁾	173	94.7(1.8)	1.9	94	92.0(3.2)	3.4	79	98.9(1.1)	1.1
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	5	-(-)	-	4	-(-)	-	1	-(-)	-
40-49	26	96.1(3.9)	4.0	22	95.6(4.3)	4.5	4	-(-)	-
50-59	46	97.8(2.1)	2.1	27	96.8(3.1)	3.2	19	-(-)	-
60-69	52	96.4(2.6)	2.7	22	95.6(4.3)	4.5	30	97.0(3.0)	3.0
70 이상	44	89.4(6.1)	6.8	19	-(-)	-	25	100.0(0.0)	0.0
고혈압 진단 경험자의 치료율									
전체 ⁵⁾	174	89.1(2.4)	2.7	95	83.8(3.9)	4.7	79	97.5(1.8)	1.8
30세 이상 ⁶⁾	173	89.8(2.4)	2.7	94	85.0(4.0)	4.7	79	97.5(1.8)	1.8
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	5	-(-)	-	4	-(-)	-	1	-(-)	-
40-49	26	92.5(5.3)	5.7	22	91.6(5.8)	6.4	4	-(-)	-
50-59	46	92.3(4.1)	4.4	27	88.5(5.9)	6.7	19	-(-)	-
60-69	52	92.6(3.5)	3.8	22	91.9(5.7)	6.2	30	93.1(4.7)	5.1
70 이상	44	87.4(6.3)	7.2	19	-(-)	-	25	100.0(0.0)	0.0

주 : 1) 고혈압 진단 경험률 : (의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 고혈압 진단 경험률(≥30) : (의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수 / 30세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

3) 고혈압 현재치료율 : (현재 고혈압을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

4) 고혈압 현재치료율(≥30) : (현재 고혈압을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

5) 고혈압 진단 경험자의 치료율 : (현재 혈압조절약을 한 달에 20일 이상 복용하고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

6) 고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30) : (현재 혈압조절약을 한 달에 20일 이상 복용하고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

<표 91> 고혈압 관리교육 장소 선호도¹⁾

(단위: %)

구분	N	병의원		보건기관(보건소 (보건의료원), 보건지 소, 보건진료소)		공동이용시설 (주민센터, 마을회관, 경로당)		학교나 직장		기타	
		% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수
전체 ¹⁾	174	49.0(4.2)	8.6	31.6(4.3)	13.6	9.0(2.3)	25.2	9.9(2.4)	24.7	0.5(0.5)	100.2
성											
남자	95	46.7(5.2)	11.2	29.1(4.8)	16.5	10.4(3.0)	28.5	13.9(3.6)	25.8	0.0(0.0)	.
여자	79	52.9(6.0)	11.3	35.7(6.3)	17.7	6.8(2.4)	35.5	3.5(1.9)	55.0	1.2(1.2)	100.3
30세 이상 ²⁾	173	48.6(4.3)	8.8	31.9(4.4)	13.7	9.1(2.3)	25.1	10.0(2.5)	24.7	0.5(0.5)	100.2
연령											
19-29	0	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	5	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
40-49	26	47.4(10.1)	21.2	22.7(8.6)	37.8	10.5(5.2)	50.0	19.4(7.8)	40.2	0.0(0.0)	.
50-59	46	53.5(9.1)	16.9	21.9(8.3)	38.0	8.4(4.8)	56.9	14.8(5.8)	38.7	1.4(1.5)	101.1
60-69	52	47.5(8.2)	17.2	37.8(8.2)	21.6	10.9(5.1)	47.0	3.8(2.7)	71.2	0.0(0.0)	.
70 이상	44	47.5(8.1)	17.1	44.5(8.6)	19.3	8.0(3.2)	39.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.

주 : 1) 고혈압 관리교육 장소 선호도 : (응답보기별 응답자 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 고혈압 관리교육 장소 선호도(≥30세) : (응답보기별 응답자 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

<표 92> 당뇨병 최초 진단 시기¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	70	55.0(1.4)	2.6	34	54.6(1.8)	3.3	36	55.5(1.6)	2.9
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	2	-(-)	-	0	-(-)	-	2	-(-)	-
40-49	9	-(-)	-	6	-(-)	-	3	-(-)	-
50-59	14	-(-)	-	8	-(-)	-	6	-(-)	-
60-69	21	54.9(1.9)	3.5	8	-(-)	-	13	-(-)	-
70 이상	24	64.2(2.1)	3.2	12	-(-)	-	12	-(-)	-
19-64	36	48.3(1.0)	2.1	18	-(-)	-	18	-(-)	-
65 이상	34	63.2(1.6)	2.5	16	-(-)	-	18	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	11	-(-)	-	2	-(-)	-	9	-(-)	-
초등학교	10	-(-)	-	4	-(-)	-	6	-(-)	-
중학교	9	-(-)	-	4	-(-)	-	5	-(-)	-
고등학교	24	49.7(1.6)	3.2	11	-(-)	-	13	-(-)	-
대학교 이상	16	-(-)	-	13	-(-)	-	3	-(-)	-
직업									
전문행정관리	8	-(-)	-	8	-(-)	-	0	-(-)	-
사무직	5	-(-)	-	4	-(-)	-	1	-(-)	-
판매·서비스직	6	-(-)	-	1	-(-)	-	5	-(-)	-
농림어업	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	9	-(-)	-	7	-(-)	-	2	-(-)	-
기타 ³⁾	42	56.7(1.8)	3.3	14	-(-)	-	28	56.9(2.0)	3.5
월 가구소득									
100만원 미만	14	-(-)	-	6	-(-)	-	8	-(-)	-
100-200만원 미만	6	-(-)	-	1	-(-)	-	5	-(-)	-
200-300만원 미만	21	55.2(2.3)	4.1	11	-(-)	-	10	-(-)	-
300-400만원 미만	6	-(-)	-	4	-(-)	-	2	-(-)	-
400만원 이상	22	51.2(2.3)	4.4	12	-(-)	-	10	-(-)	-

주 : 1) 당뇨병 최초 진단 시기 : 당뇨병을 최초 진단받은 만 나이의 총합 / 의사진단을 받은 사람의 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 93> 당뇨병 진단 경험을 및 현재치료를, 진단 경험자의 치료율

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
당뇨병 진단 경험률									
전체 ¹⁾	902	7.0(0.9)	13.5	396	8.1(1.4)	17.4	506	5.9(1.0)	17.7
30세 이상 ²⁾	767	8.7(1.2)	13.8	340	10.2(1.8)	17.5	427	7.2(1.3)	17.7
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	188	1.0(0.7)	71.6	85	0.0(0.0)	.	103	2.0(1.4)	71.5
40-49	211	4.5(1.7)	37.9	96	7.0(2.7)	38.0	115	2.2(1.3)	58.8
50-59	182	7.2(2.1)	28.7	78	9.8(3.7)	37.6	104	4.6(1.4)	31.3
60-69	112	17.5(3.6)	20.4	48	18.1(5.6)	31.1	64	17.0(4.3)	25.2
70 이상	74	32.4(6.0)	18.6	33	37.3(10.4)	27.8	41	27.9(7.3)	26.1
당뇨병 현재치료율									
전체 ³⁾	70	87.7(4.0)	4.5	34	82.5(6.3)	7.7	36	94.7(3.8)	4.0
30세 이상 ⁴⁾	70	87.7(4.0)	4.5	34	82.5(6.3)	7.7	36	94.7(3.8)	4.0
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	2	-(-)	-	0	-(-)	-	2	-(-)	-
40-49	9	-(-)	-	6	-(-)	-	3	-(-)	-
50-59	14	-(-)	-	8	-(-)	-	6	-(-)	-
60-69	21	90.8(6.2)	6.8	8	-(-)	-	13	-(-)	-
70 이상	24	88.6(7.8)	8.8	12	-(-)	-	12	-(-)	-
당뇨병 진단 경험자의 치료율									
전체 ⁵⁾	70	81.2(3.4)	4.2	34	73.1(5.5)	7.6	36	92.1(4.3)	4.7
30세 이상 ⁶⁾	70	81.2(3.4)	4.2	34	73.1(5.5)	7.6	36	92.1(4.3)	4.7
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	2	-(-)	-	0	-(-)	-	2	-(-)	-
40-49	9	-(-)	-	6	-(-)	-	3	-(-)	-
50-59	14	-(-)	-	8	-(-)	-	6	-(-)	-
60-69	21	75.7(9.7)	12.8	8	-(-)	-	13	-(-)	-
70 이상	24	84.6(8.3)	9.8	12	-(-)	-	12	-(-)	-

주 : 1) 당뇨병 진단 경험률 : (의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 당뇨병 진단 경험률(≥30) : (의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수 / 30세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

3) 당뇨병 현재치료율 : (현재 당뇨병을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

4) 당뇨병 현재치료율(≥30) : (현재 당뇨병을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

5) 당뇨병 진단 경험자의 치료율 : (현재 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구 혈당강하제)을 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 사용한다고 응답한 사람의 수 / 의사 진단을 받은 사람의 수) × 100

6) 당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥30) : (현재 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구 혈당강하제)을 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 사용한다고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

<표 94> 당뇨병 약물치료 방법

(단위: %)

	인슐린 주사			당뇨병약(경구 혈당강하제)		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체 ¹⁾	70	4.7(2.0)	42.1	70	81.2(3.4)	4.2
성						
남자	34	0.0(0.0)	.	34	73.1(5.5)	7.6
여자	36	11.1(4.8)	43.6	36	92.1(4.3)	4.7
30세 이상 ²⁾	70	4.7(2.0)	42.1	70	81.2(3.4)	4.2
연령						
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	2	-(-)	-	2	-(-)	-
40-49	9	-(-)	-	9	-(-)	-
50-59	14	-(-)	-	14	-(-)	-
60-69	21	8.2(5.1)	62.5	21	75.7(9.7)	12.8
70 이상	24	3.4(3.2)	94.8	24	84.6(8.3)	9.8

주 : 1) 당뇨병 약물치료 방법 : (응답보기별 응답자 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 당뇨병 약물치료 방법(≥30) : (응답보기별 응답자 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

<표 95> 당화혈색소 인지율

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체 ¹⁾	70	76.7(4.4)	5.7	34	77.6(6.1)	7.9	36	75.6(5.8)	7.7
30세 이상 ²⁾	70	76.7(4.4)	5.7	34	77.6(6.1)	7.9	36	75.6(5.8)	7.7
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	2	-(-)	-	0	-(-)	-	2	-(-)	-
40-49	9	-(-)	-	6	-(-)	-	3	-(-)	-
50-59	14	-(-)	-	8	-(-)	-	6	-(-)	-
60-69	21	59.0(10.1)	17.1	8	-(-)	-	13	-(-)	-
70 이상	24	78.7(7.6)	9.7	12	-(-)	-	12	-(-)	-

주 : 1) 당화혈색소 인지율 : (당화혈색소를 알고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 당화혈색소 인지율(≥30) : (당화혈색소를 알고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

<표 96> 연간 당화혈색소 검사 횟수

(단위: %)

구분	N	4회 이상		3회		2회		1회		측정 안함	
		% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수
전체 ¹⁾	53	36.4(3.2)	8.9	19.1(4.9)	25.6	27.4(6.7)	24.6	4.2(3.1)	73.9	12.9(4.3)	33.0
성											
남자	26	29.0(6.1)	21.1	24.5(7.9)	32.2	31.2(10.6)	33.8	0.0(0.0)	.	15.2(6.8)	44.4
여자	27	46.5(7.5)	16.0	11.7(3.4)	28.9	22.0(6.5)	29.7	10.0(6.8)	67.6	9.8(4.9)	50.5
30세 이상 ²⁾	53	36.4(3.2)	8.9	19.1(4.9)	25.6	27.4(6.7)	24.6	4.2(3.1)	73.9	12.9(4.3)	33.0
연령											
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	1	-(-)	-	1	-(-)	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
40-49	6	-(-)	-	6	-(-)	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
50-59	14	-(-)	-	14	-(-)	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
60-69	14	-(-)	-	14	-(-)	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
70 이상	18	-(-)	-	18	-(-)	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-

주 : 1) 연간 당화혈색소 검사 횟수 : (응답보기별 응답자 수 / 의사진단을 받은 사람 중 당화혈색소에 대해 알고 있는 사람의 수) × 100

2) 연간 당화혈색소 검사 횟수(≥30) : (응답보기별 응답자 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람 중 당화혈색소에 대해 알고 있는 사람의 수 × 100

<표 97> 연간 당뇨병 안질환 합병증검사(안저검사) 수진율 및 연간 당뇨병 신장질환 합병증검사(미세단백뇨검사) 수진율

(단위: %)

구분	연간 당뇨병 안질환 합병증검사(안저검사) 수진율 ¹⁾			연간 당뇨병 신장질환 합병증검사(미세단백뇨검사) 수진율 ²⁾		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	70	46.4(7.2)	15.4	70	44.6(3.9)	8.7
성						
남자	34	46.2(9.1)	19.8	34	43.4(6.0)	13.7
여자	36	46.6(9.3)	19.9	36	46.3(6.4)	13.8
30세 이상 ^{3),4)}	70	46.4(7.2)	15.4	70	44.6(3.9)	8.7
연령						
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	2	-(-)	-	2	-(-)	-
40-49	9	-(-)	-	9	-(-)	-
50-59	14	-(-)	-	14	-(-)	-
60-69	21	39.0(12.4)	31.8	21	34.4(10.1)	29.3
70 이상	24	60.8(11.3)	18.6	24	49.6(9.9)	20.0

주 : 1) 연간 당뇨병 안질환 합병증검사(안저검사) 수진율 : (최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생 여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 연간 당뇨병 신장질환 합병증검사(미세단백뇨검사) 수진율 : (최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생 여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

3) 연간 당뇨병 안질환 합병증검사(안저검사) 수진율(≥30) : (최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생 여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

4) 연간 당뇨병 신장질환 합병증검사(미세단백뇨검사) 수진율(≥30) : (최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생 여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

<표 98> 고혈압 관리교육 장소 및 고혈압 관리교육 이수율

(단위: %)

구분	N ⁵⁾	고혈압 관리교육 장소 ¹⁾				고혈압 관리교육 이수율 ²⁾	
		병의원		보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소			
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	174	7.7(2.1)	26.6	7.0(1.9)	27.1	13.5(2.6)	19.0
성							
남자	95	8.0(2.8)	35.0	7.8(2.6)	34.1	13.7(3.7)	26.9
여자	79	7.3(2.9)	40.0	5.9(3.0)	51.3	13.2(4.1)	31.0
30세 이상 ^{3), 4)}	173	7.8(2.1)	26.4	7.1(1.9)	27.1	13.6(2.6)	18.8
연령							
19-29	0	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	5	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
40-49	26	18.9(9.4)	49.9	5.0(4.9)	97.8	18.9(9.4)	49.9
50-59	46	8.4(3.3)	39.0	1.9(1.9)	100.4	10.3(3.8)	37.1
60-69	52	2.0(2.0)	99.7	5.0(3.6)	71.5	7.0(4.0)	57.6
70 이상	44	6.6(3.8)	56.9	19.0(6.0)	31.8	23.5(6.6)	27.9

주 : 1) 고혈압 관리교육 장소 : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 고혈압 관리교육 이수율 : (고혈압 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

3) 고혈압 관리교육 장소(≥30) : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

4) 고혈압 관리교육 이수율(≥30) : (고혈압 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

5) 고혈압 평생 의사진단을 받은 사람의 수

<표 99> 당뇨병 관리교육 장소 및 당뇨병 관리교육 이수율

(단위: %)

구분	N ⁵⁾	당뇨병 관리교육 장소 ¹⁾				당뇨병 관리교육 이수율 ²⁾	
		병의원		보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소			
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	70	27.2(5.8)	21.5	16.0(5.3)	33.4	38.7(6.4)	16.6
성							
남자	34	23.5(8.9)	37.7	20.6(7.9)	38.2	38.2(9.2)	24.2
여자	36	32.2(7.0)	21.8	9.8(5.7)	58.4	39.4(7.0)	17.8
30세 이상 ^{3), 4)}	70	27.2(5.8)	21.5	16.0(5.3)	33.4	38.7(6.4)	16.6
연령							
19-29	0	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	2	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
40-49	9	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
50-59	14	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
60-69	21	27.4(9.2)	33.6	16.2(8.6)	52.8	43.6(10.1)	23.2
70 이상	24	21.3(8.7)	41.0	34.6(11.6)	33.4	42.6(10.8)	25.3

주 : 1) 당뇨병 관리교육 장소 : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 당뇨병 관리교육 이수율 : (당뇨병 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

3) 당뇨병 관리교육 장소(≥30) : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

4) 당뇨병 관리교육 이수율(≥30) : (당뇨병 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

5) 당뇨병 평생 의사진단을 받은 사람의 수

<표 100> 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율¹⁾

(단위: %)

구분	N	갑자기 한쪽 얼굴, 팔, 다리에 힘이 빠진다		갑자기 말이 어눌해지거나, 다른 사람의 말을 이해하지 못한다		갑자기 한쪽 눈이나 시야의 반이 보이지 않거나, 물체가 두 개로 보인다		갑자기 어지럽거나 몸의 중심을 잡기 힘들다		갑자기 이제까지 경험하지 못한 심한 두통이 생긴다		뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율 ¹⁾	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체성	896	73.9(1.7)	2.3	80.8(1.6)	2.0	66.0(1.8)	2.8	76.9(1.6)	2.1	65.8(1.9)	2.8	47.9(1.9)	4.0
남자	392	70.3(2.7)	3.8	78.1(2.3)	3.0	61.8(2.6)	4.2	74.7(2.3)	3.1	61.9(2.7)	4.4	43.3(2.6)	6.1
여자	504	77.3(1.9)	2.4	83.3(1.7)	2.0	70.1(2.2)	3.1	79.0(1.9)	2.4	69.5(2.1)	3.0	52.3(2.5)	4.8
연령													
19-29	134	68.9(5.0)	7.3	69.2(4.3)	6.2	56.3(4.4)	7.8	71.3(4.5)	6.3	66.8(4.2)	6.3	37.7(4.9)	13.0
30-39	188	70.0(3.8)	5.5	80.8(3.3)	4.1	62.7(4.3)	6.9	72.3(3.4)	4.7	60.9(4.2)	6.8	41.4(4.0)	9.6
40-49	209	75.6(3.2)	4.3	86.4(2.6)	3.1	70.0(2.9)	4.1	77.6(3.0)	3.8	66.1(3.3)	4.9	52.5(3.5)	6.8
50-59	181	82.7(2.9)	3.5	89.0(2.4)	2.7	74.1(3.7)	5.0	86.2(2.8)	3.3	71.9(3.6)	5.1	59.0(4.0)	6.8
60-69	112	71.0(4.2)	6.0	73.1(3.8)	5.2	68.9(4.6)	6.6	79.4(4.1)	5.1	65.7(4.9)	7.4	48.0(5.0)	10.4
70 이상	72	69.2(5.2)	7.5	80.9(4.3)	5.4	60.2(6.3)	10.4	69.7(5.0)	7.2	55.7(5.9)	10.7	43.9(6.2)	14.2
19-64	776	74.5(1.8)	2.5	81.8(1.8)	2.1	66.4(1.9)	2.9	77.6(1.7)	2.2	66.6(2.0)	3.0	48.6(2.0)	4.2
65 이상	120	68.9(4.4)	6.4	72.3(4.0)	5.5	62.7(4.9)	7.9	71.3(4.2)	5.9	59.0(4.3)	7.3	41.8(4.9)	11.7
교육수준 ²⁾													
무학	25	71.3(8.0)	11.2	70.8(8.1)	11.4	67.6(8.4)	12.4	65.5(9.0)	13.7	57.7(8.8)	15.3	38.4(10.2)	26.6
초등학교	50	74.2(5.8)	7.9	71.5(6.5)	9.1	52.9(8.8)	16.7	71.7(6.2)	8.6	62.2(7.5)	12.1	44.9(8.9)	19.8
중학교	61	71.2(6.9)	9.7	80.2(5.7)	7.2	70.3(5.8)	8.2	73.4(6.8)	9.3	64.7(6.4)	9.9	46.5(6.7)	14.4
고등학교	329	73.1(2.9)	4.0	81.7(2.8)	3.4	65.5(3.0)	4.6	76.3(2.8)	3.7	67.3(3.5)	5.2	46.5(3.2)	6.9
대학교 이상	431	74.9(2.4)	3.3	81.5(2.3)	2.8	67.1(2.6)	3.8	78.9(2.0)	2.5	65.4(2.5)	3.9	49.9(2.6)	5.2
직업													
전문행정관리	161	76.1(3.5)	4.6	86.9(2.8)	3.2	71.2(3.8)	5.4	80.8(3.0)	3.8	70.5(3.8)	5.5	55.2(4.0)	7.3
사무직	159	73.0(3.7)	5.1	78.4(3.8)	4.8	65.6(4.1)	6.2	75.3(3.8)	5.0	63.8(3.8)	6.0	48.9(4.1)	8.5
판매·서비스직	109	76.8(5.4)	7.0	80.3(5.0)	6.2	62.6(5.4)	8.6	71.2(5.3)	7.5	63.2(5.2)	8.2	45.3(5.2)	11.6
농림어업	2	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	158	73.9(3.5)	4.8	81.1(3.5)	4.4	62.0(3.4)	5.5	79.3(3.4)	4.3	60.5(3.8)	6.3	40.5(3.9)	9.6
기타 ³⁾	307	72.6(2.9)	4.0	79.0(2.7)	3.4	66.5(3.2)	4.8	76.3(2.9)	3.7	68.1(3.1)	4.6	48.8(3.2)	6.5
월 가구소득													
100만원 미만	54	85.3(5.7)	6.6	88.5(3.9)	4.4	72.2(5.6)	7.8	76.0(7.6)	9.9	69.9(6.7)	9.6	54.4(7.6)	13.9
100-200만원 미만	44	82.5(6.4)	7.8	82.7(6.8)	8.2	68.9(8.1)	11.7	82.2(6.0)	7.2	73.2(7.2)	9.8	54.4(10.0)	18.5
200-300만원 미만	120	70.5(4.3)	6.1	78.8(3.7)	4.6	65.1(5.0)	7.6	81.9(3.6)	4.4	67.5(4.5)	6.7	46.1(5.3)	11.5
300-400만원 미만	154	78.6(3.4)	4.3	81.9(3.7)	4.5	72.0(4.1)	5.7	78.2(3.4)	4.4	64.0(3.9)	6.1	51.1(4.4)	8.6
400만원 이상	519	71.2(2.2)	3.0	79.7(2.1)	2.6	63.4(2.2)	3.5	75.1(2.0)	2.6	64.7(2.2)	3.4	46.1(1.9)	4.2

주: 1) 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율: (증상을 모두 맞춘 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준: 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타: 군인, 학생, 주부, 무직

<표 101> 뇌졸중(중풍) 증상 대처 방법¹⁾

(단위: %)

구분	N	뇌졸중(중풍) 증상 대처방법									
		병원(한방병원 제외)으로 데려간다		한방병원으로 데려간다		119에 전화한다 (구급차를 부른다)		가족에게 연락한다		기타	
		%(표준 오차)	변동 계수	%(표준 오차)	변동 계수	%(표준 오차)	변동 계수	%(표준 오차)	변동 계수	%(표준 오차)	변동 계수
전체	902	29.6(1.5)	5.2	0.5(0.2)	34.8	64.6(1.5)	2.4	5.0(0.8)	15.7	0.2(0.1)	57.9
성											
남자	396	31.2(2.1)	6.8	0.4(0.3)	71.7	63.6(2.2)	3.5	4.8(1.3)	25.8	0.0(0.0)	.
여자	506	28.1(2.1)	7.5	0.7(0.2)	36.6	65.7(2.3)	3.5	5.2(1.0)	20.1	0.4(0.3)	58.1
연령											
19-29	135	33.3(4.3)	12.9	0.0(0.0)	.	62.8(4.4)	6.9	3.9(1.8)	46.5	0.0(0.0)	.
30-39	188	35.5(4.1)	11.5	0.0(0.0)	.	60.5(4.3)	7.1	4.0(1.4)	34.2	0.0(0.0)	.
40-49	211	32.3(3.2)	10.0	0.5(0.5)	100.5	62.4(3.1)	4.9	4.9(1.7)	35.7	0.0(0.0)	.
50-59	182	24.7(3.4)	13.9	0.9(0.4)	46.9	72.6(3.8)	5.2	1.8(0.9)	49.5	0.0(0.0)	.
60-69	112	24.0(4.4)	18.4	1.5(1.0)	71.4	65.9(4.3)	6.5	8.7(2.8)	32.2	0.0(0.0)	.
70 이상	74	19.4(5.0)	25.7	1.2(1.2)	101.4	61.4(6.1)	9.9	15.0(4.3)	28.8	3.0(1.7)	55.9
19-64	780	31.0(1.7)	5.5	0.5(0.2)	36.7	64.5(1.8)	2.8	4.0(0.8)	20.5	0.0(0.0)	.
65 이상	122	18.7(4.0)	21.4	0.7(0.8)	102.1	65.7(4.6)	7.0	12.9(3.2)	25.1	1.9(1.1)	56.6
교육수준 ²⁾											
무학	25	16.3(7.5)	46.2	4.0(3.9)	96.6	60.6(7.9)	13.0	15.5(6.3)	40.9	3.5(3.6)	101.7
초등학교	50	23.9(7.3)	30.6	3.6(1.6)	43.9	65.3(6.4)	9.9	5.7(3.1)	54.6	1.4(1.5)	101.7
중학교	62	17.1(4.7)	27.6	2.4(1.5)	63.4	72.3(5.4)	7.4	8.1(3.3)	41.1	0.0(0.0)	.
고등학교	332	23.8(2.7)	11.5	0.3(0.3)	100.2	72.4(2.6)	3.6	3.4(1.0)	30.1	0.2(0.2)	101.0
대학교 이상	433	37.4(2.3)	6.1	0.0(0.0)	.	57.2(2.6)	4.5	5.3(1.3)	24.3	0.0(0.0)	.
직업											
전문행정관리	162	41.7(3.5)	8.3	0.0(0.0)	.	53.8(3.9)	7.3	4.5(2.0)	44.8	0.0(0.0)	.
사무직	160	30.5(3.5)	11.6	0.0(0.0)	.	65.1(3.6)	5.5	4.4(1.6)	36.2	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	110	29.9(4.7)	15.9	0.5(0.5)	100.3	66.4(4.9)	7.4	3.2(1.9)	60.9	0.0(0.0)	.
농림어업	2	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	158	30.8(4.0)	12.9	2.1(0.9)	40.2	58.3(3.7)	6.3	8.8(2.3)	25.5	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	310	21.8(2.3)	10.4	0.3(0.3)	100.2	73.0(2.4)	3.3	4.4(1.0)	23.5	0.6(0.4)	57.4
월 가구소득											
100만원 미만	54	21.6(7.1)	33.1	2.9(1.9)	66.6	71.5(6.8)	9.6	1.3(1.2)	90.5	2.8(1.8)	63.7
100-200만원 미만	44	28.4(8.5)	29.9	0.0(0.0)	.	64.1(9.0)	14.0	7.5(3.9)	52.5	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	121	25.8(4.0)	15.5	1.4(0.6)	43.6	66.7(4.6)	6.9	6.0(2.0)	32.7	0.0(0.0)	.
300-400만원 미만	157	25.4(3.8)	14.9	0.0(0.0)	.	67.1(3.3)	4.9	7.5(2.3)	30.9	0.0(0.0)	.
400만원 이상	521	32.9(1.9)	5.7	0.3(0.2)	70.9	62.4(2.0)	3.2	4.2(0.9)	20.4	0.1(0.1)	100.1

주 : 1) 뇌졸중(중풍) 조기증상 대처방법 : (정답 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

* 정답: 119에 전화한다

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 102> 심근경색증 조기증상 인지율¹⁾

(단위: %)

구분	N	갑자기 턱, 목 또는 등쪽에 통증이나 답답함이 있다		갑자기 힘이 없으며, 어지럽고, 울렁거리거나 식은땀이 난다		갑자기 가슴에 통증이나 압박감 또는 짓누르는 느낌이 있다		갑자기 팔 또는 어깨에 통증이 있거나 불편감이 있다		갑자기 숨이 찬다		심근경색증 조기증상 인지율 ¹⁾	
		%(표준 오차)	변동 계수	%(표준 오차)	변동 계수	%(표준 오차)	변동 계수	%(표준 오차)	변동 계수	%(표준 오차)	변동 계수	%(표준 오차)	변동 계수
전체	895	70.2(1.7)	2.4	71.2(1.8)	2.5	88.4(1.3)	1.4	57.2(1.9)	3.3	81.0(1.4)	1.7	46.3(1.9)	4.2
성													
남자	392	68.9(2.4)	3.5	68.3(2.4)	3.5	87.9(1.7)	2.0	55.8(2.5)	4.4	78.6(2.1)	2.7	43.4(2.7)	6.1
여자	503	71.4(2.0)	2.9	74.1(2.3)	3.1	88.9(1.6)	1.8	58.6(2.5)	4.3	83.3(1.8)	2.1	49.1(2.7)	5.4
연령													
19-29	135	67.5(4.2)	6.3	68.5(4.7)	6.9	84.1(3.9)	4.7	55.5(4.3)	7.8	75.5(4.3)	5.7	41.4(4.7)	11.3
30-39	188	70.6(3.1)	4.3	68.0(3.4)	5.0	89.2(2.4)	2.7	50.0(3.8)	7.6	75.6(3.0)	4.0	39.9(3.2)	7.9
40-49	209	71.0(2.5)	3.5	71.0(3.6)	5.1	90.9(2.0)	2.2	56.4(3.6)	6.4	84.6(2.2)	2.6	47.1(3.7)	7.9
50-59	179	74.6(4.0)	5.3	75.5(4.1)	5.5	94.0(2.0)	2.1	63.5(3.8)	5.9	88.0(2.4)	2.8	53.3(4.4)	8.3
60-69	112	73.2(4.2)	5.7	77.4(3.6)	4.7	85.0(3.4)	4.0	61.3(4.5)	7.3	81.2(3.4)	4.2	53.9(4.0)	7.4
70 이상	72	55.6(5.5)	9.9	65.6(5.9)	9.0	77.9(4.8)	6.1	58.1(5.9)	10.1	77.1(5.1)	6.6	40.9(5.5)	13.5
19-64	775	70.8(1.8)	2.5	71.4(1.9)	2.6	89.3(1.4)	1.5	56.9(2.0)	3.5	81.1(1.5)	1.8	46.1(2.1)	4.5
65 이상	120	65.1(4.7)	7.3	70.0(4.6)	6.5	81.0(3.7)	4.6	59.6(4.6)	7.8	80.2(3.4)	4.2	47.4(4.4)	9.3
교육수준 ²⁾													
무학	25	76.3(7.1)	9.2	72.7(7.5)	10.3	74.2(8.1)	10.9	55.6(8.7)	15.6	78.9(7.2)	9.2	48.1(10.0)	20.8
초등학교	49	67.5(6.8)	10.0	73.9(6.2)	8.4	89.8(3.7)	4.1	59.9(6.4)	10.7	86.4(4.2)	4.9	54.8(6.4)	11.7
중학교	62	67.6(6.6)	9.8	72.0(6.4)	8.9	85.6(4.6)	5.4	59.1(6.5)	11.0	78.7(5.2)	6.6	48.1(6.9)	14.3
고등학교	328	71.2(2.7)	3.7	72.7(2.7)	3.7	86.4(2.3)	2.7	56.4(3.1)	5.6	81.8(2.4)	2.9	45.6(3.1)	6.7
대학교 이상	431	69.7(2.1)	3.1	69.5(2.4)	3.5	90.9(1.6)	1.8	57.4(2.3)	4.1	80.2(2.0)	2.5	45.6(2.5)	5.4
직업													
전문행정관리	161	76.6(3.1)	4.1	74.5(3.3)	4.4	89.7(2.4)	2.7	59.1(4.2)	7.1	80.3(3.1)	3.8	49.3(4.3)	8.6
사무직	159	74.0(3.4)	4.6	70.7(3.4)	4.8	92.8(2.1)	2.3	58.2(4.0)	6.9	84.9(2.8)	3.2	48.4(3.8)	7.9
판매·서비스직	108	65.1(5.0)	7.7	63.3(5.0)	7.9	86.9(4.5)	5.1	49.4(5.3)	10.8	79.4(4.5)	5.6	39.9(5.2)	13.0
농림어업	2	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	157	67.4(4.3)	6.4	71.7(3.5)	4.9	90.6(2.2)	2.4	57.1(4.5)	7.9	83.6(3.3)	3.9	46.8(4.8)	10.2
기타 ³⁾	308	67.9(2.8)	4.2	72.3(2.8)	3.9	84.8(2.5)	3.0	59.4(3.3)	5.5	79.0(2.4)	3.1	46.3(3.2)	6.9
월 가구소득													
100만원 미만	53	76.1(6.0)	7.9	84.4(4.6)	5.5	90.2(4.3)	4.8	60.4(8.0)	13.2	85.8(4.3)	5.0	54.9(7.8)	14.3
100-200만원 미만	44	67.7(6.7)	9.8	78.5(7.3)	9.3	93.9(3.2)	3.4	61.9(8.8)	14.2	86.6(5.7)	6.5	54.7(8.6)	15.8
200-300만원 미만	121	68.5(3.8)	5.6	72.2(3.8)	5.2	85.0(3.5)	4.2	59.6(4.8)	8.0	78.4(3.3)	4.2	47.8(5.1)	10.7
300-400만원 미만	154	69.1(4.2)	6.0	68.0(3.8)	5.6	91.4(2.3)	2.5	59.1(4.6)	7.8	84.0(3.0)	3.5	48.3(4.4)	9.0
400만원 이상	518	70.3(2.4)	3.5	69.8(2.4)	3.4	87.5(2.0)	2.2	55.4(2.6)	4.6	79.6(2.0)	2.6	43.7(2.5)	5.7

주 : 1) 심근경색증 조기증상 인지율 : (증상을 모두 맞춘 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 103> 심근경색증 증상 대처 방법¹⁾

(단위: %)

구분	N	심근경색증 증상 대처방법									
		병원(한방병원 제외)으로 데려간다		한방병원으로 데려간다		119에 전화한다 (구급차를 부른다)		가족에게 연락한다		기타	
		%(표준 오차)	변동 계수	%(표준 오차)	변동 계수	%(표준 오차)	변동 계수	%(표준 오차)	변동 계수	%(표준 오차)	변동 계수
전체	902	22.8(1.3)	5.7	0.3(0.1)	43.2	73.4(1.3)	1.7	3.1(0.6)	20.0	0.4(0.2)	52.3
성											
남자	396	25.9(2.1)	8.2	0.0(0.0)	.	70.7(2.1)	2.9	3.1(1.0)	30.9	0.3(0.3)	100.0
여자	506	19.7(1.7)	8.7	0.5(0.2)	43.2	76.1(1.9)	2.6	3.2(0.7)	23.4	0.5(0.3)	58.7
연령											
19-29	135	21.6(3.4)	15.6	0.0(0.0)	.	76.4(3.6)	4.7	1.9(1.0)	51.8	0.0(0.0)	.
30-39	188	28.4(3.5)	12.4	0.0(0.0)	.	69.7(3.6)	5.2	1.9(0.8)	40.3	0.0(0.0)	.
40-49	211	27.8(3.4)	12.4	0.0(0.0)	.	70.6(3.5)	4.9	1.6(1.0)	60.8	0.0(0.0)	.
50-59	182	17.5(2.6)	14.9	0.5(0.0)	8.7	79.7(2.9)	3.6	1.5(0.8)	49.7	0.7(0.7)	99.6
60-69	112	16.4(3.8)	23.2	0.8(0.8)	102.2	73.2(4.1)	5.6	8.6(2.5)	28.5	1.0(1.0)	100.0
70 이상	74	20.3(5.1)	25.3	1.1(1.1)	99.3	65.7(6.2)	9.4	10.8(3.9)	36.1	2.0(1.4)	69.6
19-64	780	23.4(1.5)	6.5	0.2(0.1)	44.1	73.9(1.6)	2.1	2.3(0.6)	24.3	0.3(0.2)	71.1
65 이상	122	18.1(4.2)	23.1	0.7(0.7)	100.0	70.3(4.7)	6.7	9.7(2.9)	30.2	1.3(0.9)	70.7
교육수준 ²⁾											
무학	25	19.2(8.8)	45.7	3.9(3.9)	99.9	65.9(10.5)	15.9	7.4(4.9)	65.9	3.5(3.6)	101.7
초등학교	50	16.0(6.8)	42.6	2.1(0.4)	17.7	76.5(6.5)	8.5	3.9(2.6)	66.5	1.4(1.5)	101.7
중학교	62	12.3(4.4)	35.6	1.2(1.2)	100.2	83.7(4.7)	5.6	2.8(2.0)	70.7	0.0(0.0)	.
고등학교	332	16.0(2.2)	13.5	0.0(0.0)	.	81.2(2.2)	2.7	2.8(0.8)	29.0	0.0(0.0)	.
대학교 이상	433	30.7(2.2)	7.2	0.0(0.0)	.	65.6(2.2)	3.4	3.2(0.9)	28.8	0.5(0.4)	71.2
직업											
전문행정관리	162	34.4(3.5)	10.2	0.0(0.0)	.	63.3(3.6)	5.6	2.3(1.4)	59.9	0.0(0.0)	.
사무직	160	24.0(3.4)	14.0	0.0(0.0)	.	73.4(3.6)	5.0	1.9(1.0)	50.6	0.6(0.6)	101.8
판매·서비스직	110	20.1(4.7)	23.3	0.0(0.0)	.	76.1(4.9)	6.4	3.8(1.7)	43.8	0.0(0.0)	.
농림어업	2	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	158	19.0(3.5)	18.6	1.1(0.5)	45.6	75.4(3.7)	4.9	3.6(1.3)	35.4	0.9(0.9)	100.2
기타 ³⁾	310	18.6(2.1)	11.3	0.2(0.2)	99.7	77.0(2.4)	3.1	3.7(1.2)	32.7	0.4(0.3)	70.3
월 가구소득											
100만원 미만	54	11.9(4.9)	40.9	0.0(0.0)	.	84.7(5.4)	6.4	0.0(0.0)	.	3.4(2.2)	63.9
100-200만원 미만	44	20.8(7.6)	36.7	0.0(0.0)	.	74.4(8.8)	11.8	4.8(3.2)	66.4	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	121	23.2(3.6)	15.5	0.8(0.1)	12.4	69.1(4.4)	6.3	5.7(2.2)	38.4	1.2(1.2)	99.8
300-400만원 미만	157	16.0(2.7)	16.9	0.0(0.0)	.	79.3(2.8)	3.5	4.7(1.8)	38.9	0.0(0.0)	.
400만원 이상	521	26.1(1.9)	7.2	0.3(0.2)	70.0	71.2(1.9)	2.7	2.3(0.6)	28.3	0.1(0.1)	100.1

주 : 1) 심근경색증 증상 대처 방법: (정답 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

* 정답: 119에 전화한다

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 104> 심뇌혈관질환 인지율

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	50.4(1.7)	3.3	396	45.3(2.1)	4.7	506	55.4(2.3)	4.2
연령									
19-29	135	32.1(4.5)	14.0	56	25.5(6.0)	23.4	79	39.4(5.6)	14.2
30-39	188	39.3(3.4)	8.5	85	36.2(4.8)	13.4	103	42.4(5.0)	11.8
40-49	211	62.0(3.6)	5.8	96	55.4(5.1)	9.3	115	68.2(4.8)	7.0
50-59	182	65.1(3.7)	5.6	78	61.5(5.3)	8.6	104	68.8(4.1)	6.0
60-69	112	59.2(4.9)	8.3	48	50.5(7.2)	14.3	64	66.3(5.9)	8.9
70 이상	74	34.2(5.7)	16.6	33	36.2(9.2)	25.4	41	32.4(7.3)	22.6

주 : 1) 심뇌혈관질환 인지율 : (심뇌혈관질환에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

<표 105> 심뇌혈관질환 예방생활수칙 인지도¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	16.4(1.3)	7.9	396	14.6(2.0)	13.7	506	18.2(1.8)	9.6
연령									
19-29	135	5.4(2.3)	42.9	56	5.6(3.3)	59.3	79	5.1(3.8)	74.7
30-39	188	6.3(1.9)	30.0	85	4.4(2.0)	46.0	103	8.3(3.0)	36.6
40-49	211	16.1(2.5)	15.7	96	16.3(4.1)	25.3	115	15.9(2.9)	18.3
50-59	182	25.8(4.0)	15.3	78	22.0(5.8)	26.4	104	29.7(5.1)	17.3
60-69	112	31.4(5.2)	16.7	48	23.9(6.4)	26.6	64	37.6(6.7)	17.8
70 이상	74	23.0(4.9)	21.1	33	26.1(8.5)	32.7	41	20.2(6.8)	33.6

주 : 1) 심뇌혈관질환 예방관리수칙 인지도 : ('심뇌혈관질환 예방과 관리를 위한 9대 생활수칙'에 관한 홍보물을 본 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

<표 106> 심뇌혈관질환 예방생활수칙 매체경험률¹⁾

(단위: %)

구분	N ²⁾	인터넷		TV, 라디오, 옥외광고, 지하철 등		병원		보건기관(보건소(보건 의원), 보건지소, 보건진 료소)	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	143	30.6(4.0)	12.9	49.7(4.5)	9.1	63.3(4.7)	7.4	17.3(3.3)	19.3
성									
남자	58	35.4(7.0)	19.9	35.9(7.0)	19.6	64.9(6.2)	9.5	15.3(4.6)	30.1
여자	85	26.9(4.6)	17.3	60.5(5.4)	8.9	62.0(6.3)	10.1	18.8(4.3)	23.0
연령									
19-29	7	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	11	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
40-49	35	42.9(8.8)	20.5	37.3(8.0)	21.5	67.6(6.5)	9.6	14.1(6.3)	45.0
50-59	45	34.3(7.5)	21.7	62.7(7.8)	12.5	63.6(7.7)	12.1	14.7(5.7)	39.1
60-69	31	17.2(8.2)	47.8	42.5(9.9)	23.4	63.1(9.4)	14.8	18.4(6.5)	35.2
70 이상	14	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-

주 : 1) 심뇌혈관질환 예방관리수칙 매체 경험률 : (응답보기별 응답자 수 / '심뇌혈관질환 예방과 관리를 위한 9대 생활수칙'에 관한 홍보물을 본 적이 있는 사람의 수) × 100

2) '심뇌혈관질환 예방과 관리를 위한 9대 생활수칙'에 관한 홍보물을 본 적이 있는 사람의 수

<표 107> 대사증후군 인지율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	56.9(1.6)	2.9	396	52.8(2.4)	4.5	506	61.0(1.9)	3.1
연령									
19-29	135	34.1(4.9)	14.4	56	37.5(6.6)	17.5	79	30.4(5.0)	16.3
30-39	188	55.1(3.5)	6.3	85	51.5(4.8)	9.2	103	58.6(4.9)	8.4
40-49	211	72.2(3.4)	4.7	96	60.4(4.6)	7.6	115	83.4(3.7)	4.4
50-59	182	71.1(3.5)	5.0	78	65.0(5.5)	8.5	104	77.2(4.3)	5.6
60-69	112	52.8(4.5)	8.5	48	46.8(6.4)	13.6	64	57.8(6.6)	11.3
70 이상	74	39.1(5.8)	14.9	33	45.9(9.3)	20.3	41	32.8(8.6)	26.1

주 : 1) 대사증후군 인지율 : (대사증후군에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

<표 108> 연간 미충족의료율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	10.3(0.9)	9.0	396	8.6(1.3)	15.7	506	12.0(1.4)	11.3
연령									
19-29	135	15.9(2.8)	17.4	56	12.2(4.3)	35.1	79	19.9(4.1)	20.5
30-39	188	13.5(2.6)	19.3	85	9.5(2.9)	30.9	103	17.3(4.3)	24.7
40-49	211	11.9(2.2)	18.2	96	12.2(3.4)	27.5	115	11.6(3.1)	26.8
50-59	182	4.0(1.5)	37.6	78	1.5(1.4)	97.8	104	6.5(2.7)	40.9
60-69	112	5.5(2.3)	42.9	48	7.1(4.8)	68.1	64	4.1(1.9)	46.4
70 이상	74	8.0(3.4)	42.2	33	7.9(5.6)	70.8	41	8.1(3.9)	48.6
19-64	780	10.9(1.1)	9.7	341	8.8(1.5)	16.7	439	12.9(1.5)	11.6
65 이상	122	5.7(2.3)	40.1	55	6.4(3.9)	60.3	67	5.1(2.5)	48.5
교육수준 ²⁾									
무학	25	7.1(5.1)	71.5	5	-(-)	-	20	9.0(6.3)	69.9
초등학교	50	3.6(2.6)	73.4	17	-(-)	-	33	0.0(0.0)	.
중학교	62	8.2(4.3)	52.9	22	10.2(7.4)	72.8	40	7.1(5.2)	74.1
고등학교	332	8.6(1.3)	15.1	146	6.2(2.1)	34.2	186	11.0(2.2)	19.8
대학교 이상	433	12.8(1.7)	13.5	206	10.3(2.3)	21.9	227	15.8(2.3)	14.6
직업									
전문·행정관리	162	12.1(2.8)	23.2	87	10.1(3.6)	35.7	75	15.0(4.2)	27.8
사무직	160	11.6(2.6)	22.4	84	8.2(3.0)	36.4	76	16.3(4.1)	24.9
판매·서비스직	110	11.2(3.2)	28.2	44	6.7(3.8)	56.8	66	15.0(5.1)	33.8
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	158	9.0(2.2)	24.6	109	8.3(2.9)	34.9	49	10.8(4.3)	39.8
기타 ³⁾	310	9.2(1.4)	15.4	70	8.9(3.2)	36.1	240	9.3(1.9)	20.1
월 가구소득									
100만원 미만	54	7.5(3.5)	47.0	19	-(-)	-	35	4.7(3.0)	63.9
100-200만원 미만	44	8.1(3.9)	48.3	15	-(-)	-	29	10.7(5.3)	49.6
200-300만원 미만	121	5.5(2.1)	37.5	60	5.2(3.0)	57.9	61	5.8(3.1)	54.0
300-400만원 미만	157	13.4(2.8)	20.7	72	7.8(3.9)	49.3	85	19.2(4.5)	23.6
400만원 이상	521	11.0(1.3)	11.6	228	9.8(1.8)	18.9	293	12.3(1.7)	14.2

주 : 1) 연간 미충족의료율 : (최근 1년 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 109> 미충족의료 이유¹⁾

(단위: %)

구분	N	경제적인 이유로		병의원 등에 예약을 하기 힘들어서		교통편이 불편해서		내가 갈 수 있는 시간에 병의원 등이 문을 열지 않아서		병의원 등에서 오래 기다리기 싫어서		증상이 가벼워서		기타	
		% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수
전체	902	0.7(0.3)	37.0	0.4(0.2)	49.5	0.2(0.1)	70.5	4.2(0.6)	15.0	0.8(0.4)	45.3	1.7(0.5)	29.0	2.4(0.6)	27.0
성															
남자	396	0.8(0.5)	60.9	0.2(0.2)	100.3	0.0(0.0)	.	2.7(0.7)	26.4	0.9(0.5)	58.3	2.1(0.8)	38.8	1.8(0.7)	37.7
여자	506	0.7(0.3)	39.6	0.5(0.3)	58.4	0.3(0.2)	70.6	5.8(1.0)	17.7	0.6(0.5)	72.0	1.2(0.4)	35.9	2.9(0.9)	31.7
연령															
19-29	135	0.6(0.0)	8.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	5.9(1.7)	29.1	2.6(1.5)	58.1	2.4(1.5)	59.8	4.4(1.6)	36.0
30-39	188	0.0(0.0)	.	1.0(0.7)	71.6	0.5(0.5)	101.4	7.0(1.9)	27.0	0.0(0.0)	.	1.8(0.9)	49.2	3.3(1.7)	52.8
40-49	211	0.5(0.5)	99.9	0.8(0.6)	72.5	0.0(0.0)	.	5.6(1.5)	26.9	0.5(0.5)	99.8	3.1(1.1)	36.5	1.5(0.9)	58.0
50-59	182	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.5(1.3)	49.6	0.7(0.7)	97.9	0.3(0.3)	101.2	0.4(0.4)	100.5
60-69	112	1.5(1.1)	68.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.8(0.1)	9.9	3.1(1.9)	61.4
70 이상	74	4.5(2.8)	61.7	0.0(0.0)	.	1.0(1.0)	100.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.4(1.7)	70.0
19-64	780	0.3(0.2)	46.1	0.4(0.2)	49.5	0.1(0.1)	99.9	4.8(0.7)	14.7	0.9(0.4)	45.1	1.9(0.5)	28.9	2.5(0.7)	29.0
65 이상	122	3.5(1.9)	54.2	0.0(0.0)	.	0.7(0.7)	100.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.5(1.1)	70.8
교육수준 ²⁾															
무학	25	3.6(3.6)	99.4	0.0(0.0)	.	3.5(3.6)	101.7	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
초등학교	50	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	3.6(2.6)	73.4
중학교	62	4.9(3.0)	61.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	3.3(3.2)	98.6	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
고등학교	332	0.2(0.2)	101.0	0.3(0.3)	100.5	0.2(0.2)	100.1	3.4(0.9)	26.2	0.5(0.5)	99.4	1.7(0.7)	43.5	2.4(0.9)	36.9
대학교 이상	433	0.5(0.2)	50.8	0.5(0.3)	59.1	0.0(0.0)	.	5.7(1.1)	19.3	1.3(0.6)	50.3	2.1(0.9)	41.1	2.7(1.1)	40.5
직업															
전문행정관리	162	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	4.4(1.6)	35.8	2.2(1.2)	56.3	2.8(1.5)	54.1	2.7(1.4)	50.8
사무직	160	0.7(0.7)	100.7	0.7(0.7)	100.3	0.0(0.0)	.	9.1(2.3)	24.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.1(0.8)	70.2
판매·서비스직	110	0.8(0.1)	9.4	1.3(0.9)	72.1	0.0(0.0)	.	5.4(2.4)	44.0	0.0(0.0)	.	3.1(1.7)	55.9	0.6(0.6)	100.0
농림어업	2	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	158	1.0(1.0)	99.6	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.9(1.3)	44.9	1.1(1.1)	99.4	1.7(1.2)	70.4	2.4(1.2)	51.2
기타 ³⁾	310	0.9(0.5)	50.4	0.2(0.2)	100.3	0.5(0.3)	70.0	2.0(0.8)	38.2	0.6(0.6)	100.0	1.3(0.6)	45.0	3.6(1.1)	31.6
월 가구소득															
100만원 미만	54	6.1(3.6)	58.0	0.0(0.0)	.	1.4(1.3)	92.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	44	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.6(2.6)	98.3	0.0(0.0)	.	2.1(2.0)	96.4	3.4(2.4)	71.3
200-300만원 미만	121	0.6(0.6)	100.6	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.3(0.7)	57.2	0.0(0.0)	.	0.5(0.5)	100.8	3.0(1.8)	58.3
300-400만원 미만	157	0.6(0.6)	99.1	0.6(0.6)	99.9	0.0(0.0)	.	5.3(2.0)	37.8	0.0(0.0)	.	3.7(1.7)	46.4	3.1(1.4)	45.1
400만원 이상	521	0.3(0.1)	42.0	0.5(0.3)	57.0	0.1(0.1)	100.0	5.1(0.9)	17.5	1.3(0.6)	44.5	1.5(0.5)	33.1	2.2(0.8)	39.1

주 : 1) 미충족의료 이유 : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 110> 연간 사고 및 중독 경험률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	6.3(0.9)	14.9	396	6.0(1.3)	21.3	506	6.6(1.1)	17.0
연령									
19-29	135	6.8(2.3)	34.0	56	6.7(3.3)	49.5	79	6.9(2.7)	39.0
30-39	188	3.9(1.0)	26.5	85	6.0(1.9)	32.0	103	1.9(0.9)	46.7
40-49	211	6.6(1.7)	25.9	96	8.0(2.8)	34.5	115	5.3(2.1)	39.3
50-59	182	8.8(2.3)	26.3	78	6.5(2.8)	42.2	104	11.1(3.9)	34.8
60-69	112	5.7(2.0)	35.2	48	3.4(2.4)	69.8	64	7.7(3.2)	41.8
70 이상	74	4.0(2.5)	62.3	33	0.0(0.0)	.	41	7.6(4.6)	60.0
19-64	780	6.5(1.0)	15.7	341	6.4(1.4)	22.3	439	6.6(1.2)	18.8
65 이상	122	5.1(2.1)	41.3	55	2.9(2.1)	71.2	67	7.1(3.6)	51.2
교육수준 ²⁾									
무학	25	7.1(4.9)	67.9	5	-(-)	-	20	9.0(6.3)	69.7
초등학교	50	3.2(2.2)	70.6	17	-(-)	-	33	2.3(2.4)	102.6
중학교	62	10.6(4.6)	43.8	22	3.1(3.2)	101.0	40	14.8(7.0)	47.1
고등학교	332	6.9(1.4)	20.5	146	7.1(2.1)	29.5	186	6.7(1.7)	26.2
대학교 이상	433	5.6(1.2)	21.9	206	5.8(1.8)	30.5	227	5.4(1.5)	27.9
직업									
전문·행정관리	162	3.9(1.4)	36.9	87	3.3(1.9)	58.6	75	4.8(2.5)	51.2
사무직	160	4.4(1.7)	37.6	84	2.1(1.5)	69.0	76	7.7(3.6)	46.0
판매·서비스직	110	6.8(2.7)	39.0	44	8.0(4.1)	51.4	66	5.8(3.5)	61.3
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	158	8.5(1.8)	21.0	109	6.7(2.0)	29.6	49	13.1(4.8)	36.5
기타 ³⁾	310	7.4(1.6)	21.7	70	11.2(4.0)	35.5	240	5.8(1.6)	26.6
월 가구소득									
100만원 미만	54	8.5(4.2)	50.1	19	-(-)	-	35	9.1(5.5)	60.9
100-200만원 미만	44	18.7(5.6)	29.8	15	-(-)	-	29	16.1(6.9)	43.2
200-300만원 미만	121	6.1(2.0)	32.4	60	6.7(3.0)	43.9	61	5.4(2.5)	46.7
300-400만원 미만	157	4.0(1.6)	40.3	72	4.5(2.2)	47.8	85	3.4(2.0)	58.8
400만원 이상	521	6.0(1.3)	21.7	228	5.2(1.6)	30.2	293	6.8(1.8)	26.6

주 : 1) 연간 사고 및 중독 경험률 : (연간 사고 및 중독 경험자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 111> 연간 사고 및 중독 건수율¹⁾

(단위: 건 / 인구 1,000명)

구분	전체			남자			여자		
	N	건(표준오차)	변동계수	N	건(표준오차)	변동계수	N	건(표준오차)	변동계수
전체	902	68.1(9.6)	14.1	396	65.0(12.9)	19.8	506	71.1(11.6)	16.3
연령									
19-29	135	68.1(23.2)	34.0	56	67.2(33.3)	49.5	79	69.2(27.0)	39.0
30-39	188	56.4(10.6)	18.8	85	85.0(19.8)	23.3	103	28.8(8.8)	30.7
40-49	211	66.2(17.1)	25.9	96	80.0(27.6)	34.5	115	52.9(20.8)	39.3
50-59	182	94.8(24.5)	25.8	78	65.3(27.5)	42.2	104	124.8(43.3)	34.7
60-69	112	57.4(20.2)	35.2	48	33.8(23.6)	69.8	64	76.9(32.1)	41.8
70 이상	74	39.9(24.8)	62.3	33	0.0(0.0)	.	41	75.9(45.5)	60.0
19-64	780	70.3(10.3)	14.7	341	69.4(14.3)	20.6	439	71.2(13.1)	18.4
65 이상	122	51.0(21.1)	41.3	55	29.5(21.0)	71.2	67	70.5(36.1)	51.2
교육수준 ²⁾									
무학	25	71.5(48.5)	67.9	5	-(-)	-	20	90.4(63.0)	69.7
초등학교	50	31.5(22.3)	70.6	17	-(-)	-	33	23.5(24.1)	102.6
중학교	62	105.7(46.3)	43.8	22	31.3(31.6)	101.0	40	148.2(69.8)	47.1
고등학교	332	74.6(15.0)	20.2	146	70.6(20.9)	29.5	186	78.5(20.4)	26.0
대학교 이상	433	60.8(12.3)	20.2	206	66.7(17.7)	26.5	227	53.9(15.1)	27.9
직업									
전문·행정관리	162	39.2(14.5)	36.9	87	33.0(19.3)	58.6	75	48.4(24.8)	51.2
사무직	160	44.2(16.6)	37.6	84	21.1(14.6)	69.0	76	77.2(35.5)	46.0
판매·서비스직	110	74.9(26.6)	35.5	44	80.1(41.2)	51.4	66	70.6(35.3)	50.0
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	158	97.9(17.8)	18.2	109	85.2(19.8)	23.3	49	130.7(47.7)	36.5
기타 ³⁾	310	77.8(16.6)	21.4	70	112.2(39.8)	35.5	240	64.3(17.2)	26.7
월 가구소득									
100만원 미만	54	84.7(42.5)	50.1	19	-(-)	-	35	90.6(55.1)	60.9
100-200만원 미만	44	187.1(55.7)	29.8	15	-(-)	-	29	160.7(69.4)	43.2
200-300만원 미만	121	61.4(19.9)	32.4	60	67.2(29.5)	43.9	61	54.4(25.4)	46.7
300-400만원 미만	157	47.9(19.5)	40.7	72	45.5(21.7)	47.8	85	50.4(30.1)	59.7
400만원 이상	521	65.2(13.0)	19.9	228	59.5(15.5)	26.1	293	70.7(18.1)	25.5

주 : 1) 연간 사고 및 중독 건수율 : (연간 사고 및 중독 건수 / 조사대상 응답자 수) × 1,000

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 112> 양호한 주관적 건강수준 인지율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	38.4(1.8)	4.6	396	43.4(2.6)	6.0	506	33.6(2.4)	7.1
연령									
19-29	135	46.9(4.6)	9.7	56	49.6(6.5)	13.2	79	44.0(5.7)	12.9
30-39	188	32.0(3.3)	10.4	85	35.4(4.5)	12.7	103	28.7(4.6)	16.0
40-49	211	40.4(3.5)	8.6	96	41.1(5.3)	12.9	115	39.7(4.7)	11.9
50-59	182	37.9(3.4)	9.0	78	46.5(5.1)	11.0	104	29.1(4.6)	15.7
60-69	112	34.4(4.8)	14.0	48	46.6(8.2)	17.7	64	24.3(5.8)	23.8
70 이상	74	32.9(5.4)	16.4	33	38.3(9.3)	24.3	41	27.9(7.1)	25.6
19-64	780	38.9(1.8)	4.7	341	43.2(2.8)	6.5	439	34.6(2.5)	7.3
65 이상	122	35.0(4.7)	13.3	55	44.4(8.4)	18.8	67	26.6(5.9)	22.0
교육수준 ²⁾									
무학	25	30.7(8.8)	28.6	5	-(-)	-	20	23.1(9.3)	40.2
초등학교	50	28.1(7.1)	25.2	17	-(-)	-	33	22.7(7.6)	33.4
중학교	62	20.2(5.5)	27.2	22	33.5(10.0)	30.0	40	12.7(4.8)	37.8
고등학교	332	39.6(2.9)	7.4	146	43.6(4.8)	11.0	186	35.7(4.0)	11.3
대학교 이상	433	41.5(2.5)	6.1	206	44.3(3.3)	7.4	227	38.2(3.6)	9.4
직업									
전문·행정관리	162	43.1(4.0)	9.2	87	46.4(5.5)	11.8	75	38.3(5.5)	14.4
사무직	160	40.0(4.4)	11.1	84	42.3(5.6)	13.4	76	36.7(5.7)	15.6
판매·서비스직	110	30.3(4.9)	16.3	44	37.7(8.8)	23.5	66	24.0(5.1)	21.5
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	158	38.9(4.4)	11.2	109	39.4(5.5)	14.0	49	37.5(6.1)	16.3
기타 ³⁾	310	38.5(2.9)	7.7	70	51.4(5.4)	10.5	240	33.3(3.5)	10.6
월 가구소득									
100만원 미만	54	19.6(6.1)	31.4	19	-(-)	-	35	16.0(6.2)	38.7
100-200만원 미만	44	39.7(8.1)	20.4	15	-(-)	-	29	29.3(9.8)	33.4
200-300만원 미만	121	30.4(4.3)	14.1	60	32.8(5.5)	16.8	61	27.5(6.8)	24.7
300-400만원 미만	157	35.1(3.9)	11.0	72	40.1(6.2)	15.4	85	29.8(4.9)	16.3
400만원 이상	521	43.1(2.4)	5.5	228	47.6(3.7)	7.7	293	38.7(3.4)	8.7

주 : 1) 양호한 주관적 건강수준 인지율 : (주관적 건강수준을 “매우 좋음” 또는 “좋음”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 113> 삶의 질 지수(EQ-5D Index)^{1),2)}

(단위: 점)

구분	전체			남자			여자		
	N	점(표준오차)	변동계수	N	점(표준오차)	변동계수	N	점(표준오차)	변동계수
전체	902	0.962(0.003)	0.3	396	0.969(0.004)	0.4	506	0.954(0.004)	0.4
연령									
19-29	135	0.971(0.006)	0.6	56	0.971(0.009)	0.9	79	0.971(0.008)	0.8
30-39	188	0.976(0.003)	0.3	85	0.977(0.005)	0.5	103	0.975(0.005)	0.5
40-49	211	0.968(0.004)	0.4	96	0.980(0.005)	0.5	115	0.957(0.007)	0.8
50-59	182	0.962(0.006)	0.6	78	0.966(0.009)	0.9	104	0.959(0.008)	0.9
60-69	112	0.939(0.012)	1.3	48	0.961(0.014)	1.4	64	0.921(0.020)	2.2
70 이상	74	0.910(0.014)	1.6	33	0.934(0.017)	1.9	41	0.888(0.023)	2.6
19-64	780	0.967(0.003)	0.3	341	0.973(0.004)	0.4	439	0.962(0.004)	0.4
65 이상	122	0.919(0.013)	1.4	55	0.941(0.014)	1.5	67	0.898(0.019)	2.1
교육수준 ³⁾									
무학	25	0.863(0.034)	3.9	5	-(-)	-	20	0.835(0.045)	5.4
초등학교	50	0.931(0.018)	1.9	17	-(-)	-	33	0.913(0.024)	2.7
중학교	62	0.941(0.013)	1.4	22	0.951(0.022)	2.3	40	0.935(0.016)	1.7
고등학교	332	0.965(0.005)	0.5	146	0.973(0.007)	0.7	186	0.957(0.007)	0.7
대학교 이상	433	0.969(0.003)	0.3	206	0.969(0.004)	0.4	227	0.970(0.004)	0.4
직업									
전문·행정관리	162	0.972(0.004)	0.4	87	0.974(0.005)	0.6	75	0.970(0.007)	0.7
사무직	160	0.973(0.006)	0.6	84	0.981(0.005)	0.6	76	0.962(0.011)	1.1
판매·서비스직	110	0.965(0.007)	0.7	44	0.978(0.008)	0.8	66	0.954(0.010)	1.0
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	158	0.975(0.006)	0.6	109	0.976(0.007)	0.7	49	0.972(0.007)	0.8
기타 ⁴⁾	310	0.942(0.007)	0.7	70	0.940(0.012)	1.3	240	0.943(0.007)	0.8
월 가구소득									
100만원 미만	54	0.910(0.016)	1.8	19	-(-)	-	35	0.888(0.027)	3.0
100-200만원 미만	44	0.955(0.012)	1.3	15	-(-)	-	29	0.945(0.016)	1.6
200-300만원 미만	121	0.935(0.011)	1.2	60	0.930(0.017)	1.8	61	0.941(0.013)	1.3
300-400만원 미만	157	0.957(0.007)	0.8	72	0.973(0.007)	0.7	85	0.942(0.012)	1.3
400만원 이상	521	0.975(0.003)	0.3	228	0.981(0.003)	0.3	293	0.968(0.004)	0.4

주 : 1) 삶의 질 지수 : 건강관련 삶의 질의 5가지 차원(운동능력, 자기관리, 일상 활동, 통증/불편, 불안/우울)의 기술체계를 종합한 지표

2) 삶의 질 조사도구(EQ-5D Index)의 질 가중치 추정연구(남해성, 2007)

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 114> 행복감지수¹⁾

(단위: 점)

구분	전체			남자			여자		
	N	점(표준오차)	변동계수	N	점(표준오차)	변동계수	N	점(표준오차)	변동계수
전체	902	7.2(0.1)	0.9	396	7.3(0.1)	1.2	506	7.2(0.1)	1.2
연령									
19-29	135	6.9(0.1)	2.1	56	6.7(0.2)	3.6	79	7.1(0.2)	2.5
30-39	188	7.4(0.1)	1.3	85	7.6(0.1)	1.9	103	7.2(0.1)	2.1
40-49	211	7.3(0.1)	1.4	96	7.4(0.1)	1.8	115	7.2(0.1)	1.9
50-59	182	7.4(0.1)	1.9	78	7.5(0.2)	2.9	104	7.4(0.2)	2.7
60-69	112	7.2(0.2)	3.2	48	7.5(0.2)	3.3	64	7.0(0.3)	4.2
70 이상	74	7.0(0.2)	3.4	33	7.4(0.3)	4.3	41	6.5(0.3)	4.6
19-64	780	7.2(0.1)	0.9	341	7.3(0.1)	1.4	439	7.2(0.1)	1.2
65 이상	122	7.1(0.2)	2.8	55	7.5(0.3)	3.6	67	6.8(0.3)	3.8
교육수준 ²⁾									
무학	25	6.6(0.3)	4.9	5	-(-)	-	20	6.2(0.3)	4.7
초등학교	50	7.4(0.4)	5.1	17	-(-)	-	33	7.6(0.4)	4.8
중학교	62	7.1(0.3)	4.2	22	7.7(0.3)	4.2	40	6.7(0.4)	6.3
고등학교	332	7.2(0.1)	1.4	146	7.3(0.1)	2.1	186	7.1(0.1)	1.7
대학교 이상	433	7.3(0.1)	1.1	206	7.3(0.1)	1.6	227	7.3(0.1)	1.4
직업									
전문행정관리	162	7.5(0.1)	1.8	87	7.6(0.2)	2.2	75	7.3(0.2)	2.3
사무직	160	7.5(0.1)	1.6	84	7.6(0.1)	1.6	76	7.4(0.2)	2.8
판매·서비스직	110	7.1(0.2)	2.1	44	7.1(0.2)	3.2	66	7.1(0.2)	2.4
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	158	7.3(0.1)	1.9	109	7.3(0.2)	2.4	49	7.5(0.2)	2.5
기타 ³⁾	310	7.0(0.1)	2.1	70	6.9(0.3)	4.5	240	7.0(0.1)	2.1
월 가구소득									
100만원 미만	54	6.7(0.3)	4.3	19	-(-)	-	35	6.4(0.3)	5.3
100-200만원 미만	44	7.1(0.3)	4.8	15	-(-)	-	29	6.9(0.4)	5.1
200-300만원 미만	121	6.6(0.3)	3.8	60	6.3(0.4)	5.7	61	7.0(0.3)	3.9
300-400만원 미만	157	7.5(0.2)	2.1	72	7.6(0.2)	2.7	85	7.4(0.2)	2.8
400만원 이상	521	7.4(0.1)	0.8	228	7.5(0.1)	1.2	293	7.3(0.1)	1.2

주 : 1) 행복감지수 : 행복지수의 총 합 / 조사대상 응답자 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 115> 연간 보건기관 이용률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	22.5(1.5)	6.6	396	17.1(2.0)	12.0	506	27.7(2.2)	8.0
연령									
19-29	135	30.1(4.0)	13.4	56	24.6(5.7)	23.1	79	36.1(5.2)	14.4
30-39	188	22.4(2.7)	12.1	85	15.0(4.3)	28.4	103	29.5(4.2)	14.1
40-49	211	10.6(2.1)	20.2	96	7.1(2.5)	35.4	115	13.9(3.5)	25.1
50-59	182	18.9(2.8)	14.9	78	10.8(3.4)	31.8	104	27.1(4.7)	17.5
60-69	112	27.6(4.4)	15.8	48	21.5(6.1)	28.3	64	32.7(6.4)	19.5
70 이상	74	42.6(6.4)	15.0	33	46.4(8.2)	17.6	41	39.1(8.5)	21.8
19-64	780	20.1(1.4)	7.0	341	14.2(1.9)	13.6	439	25.9(2.3)	9.0
65 이상	122	40.9(5.3)	13.0	55	40.6(7.7)	19.0	67	41.1(6.0)	14.5
교육수준 ²⁾									
무학	25	32.1(10.2)	31.9	5	-(-)	-	20	24.3(9.9)	40.7
초등학교	50	36.9(9.3)	25.2	17	-(-)	-	33	41.4(9.3)	22.6
중학교	62	31.8(6.6)	20.8	22	19.4(8.2)	42.2	40	38.8(8.1)	20.9
고등학교	332	21.0(2.6)	12.2	146	15.7(3.2)	20.4	186	26.3(4.0)	15.2
대학교 이상	433	20.4(1.7)	8.5	206	16.3(2.6)	16.3	227	25.1(2.7)	10.7
직업									
전문·행정관리	162	13.9(2.6)	18.9	87	9.2(3.1)	33.7	75	20.8(5.2)	24.9
사무직	160	13.2(2.6)	19.8	84	9.9(3.0)	30.4	76	17.8(4.2)	23.7
판매·서비스직	110	28.8(5.3)	18.4	44	14.4(6.2)	43.0	66	40.9(6.9)	16.9
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	158	17.1(3.2)	18.8	109	15.1(3.7)	24.5	49	22.4(6.3)	28.0
기타 ³⁾	310	31.7(2.8)	8.9	70	36.6(5.7)	15.6	240	29.8(3.6)	12.0
월 가구소득									
100만원 미만	54	34.2(6.0)	17.4	19	-(-)	-	35	42.9(7.9)	18.4
100-200만원 미만	44	34.7(8.8)	25.3	15	-(-)	-	29	33.1(8.1)	24.5
200-300만원 미만	121	22.6(3.7)	16.4	60	22.3(5.0)	22.4	61	22.9(5.5)	24.0
300-400만원 미만	157	29.7(3.4)	11.5	72	23.3(5.5)	23.8	85	36.4(5.7)	15.6
400만원 이상	521	18.4(1.9)	10.1	228	12.4(2.5)	20.5	293	24.3(2.9)	11.8

주 : 1) 연간 보건기관 이용률:(최근 1년 동안 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소를 이용한 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) ×100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 116> 현재 체감 환경¹⁾

1) 대기											
(단위: %)											
구분	매우좋다		약간좋다		보통이다		약간나쁘다		매우나쁘다		
	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	
전체	9.6(1.1)	11.0	24.4(1.8)	7.2	39.8(1.8)	4.5	17.9(1.4)	7.6	8.3(0.9)	10.3	
성											
남자	8.1(1.4)	17.7	22.9(2.4)	10.5	42.2(2.6)	6.1	18.1(2.1)	11.6	8.6(1.2)	14.4	
여자	11.1(1.5)	13.6	25.8(2.0)	7.9	37.3(2.1)	5.6	17.8(1.6)	9.2	7.9(1.2)	14.9	
연령											
19-29	9.6(2.4)	25.0	21.5(3.8)	17.6	37.5(4.4)	11.8	20.2(3.6)	18.0	11.2(3.1)	27.2	
30-39	3.2(1.3)	40.3	25.0(3.7)	15.0	38.3(3.8)	9.9	18.1(2.4)	13.1	15.3(2.4)	15.9	
40-49	9.1(2.2)	23.8	20.9(2.5)	12.1	42.1(3.7)	8.9	20.4(2.9)	14.3	7.5(2.2)	28.7	
50-59	12.1(2.4)	20.1	25.4(3.8)	14.8	44.2(4.1)	9.3	14.2(2.8)	19.8	4.1(1.5)	36.8	
60-69	12.6(3.0)	24.1	30.1(5.4)	17.8	36.9(4.3)	11.7	17.6(4.0)	23.0	2.8(1.5)	52.5	
70 이상	16.1(4.8)	29.7	30.1(5.2)	17.2	33.1(5.5)	16.5	15.4(4.7)	30.4	5.2(3.2)	60.5	
19-64	9.0(1.0)	11.6	23.8(1.8)	7.7	40.1(1.9)	4.7	18.4(1.4)	7.9	8.7(0.9)	10.9	
65 이상	14.9(3.8)	25.6	28.7(3.9)	13.6	37.1(4.5)	12.2	14.6(3.3)	22.5	4.7(2.4)	51.8	
교육수준 ⁹⁾											
무학	26.4(10.9)	41.1	31.2(9.6)	30.9	31.6(9.0)	28.6	7.2(5.0)	68.6	3.5(3.4)	96.8	
초등학교	9.7(3.8)	39.5	33.4(7.6)	22.6	42.1(8.4)	19.9	11.8(3.6)	30.7	2.9(2.9)	101.7	
중학교	10.1(4.8)	47.7	24.6(6.1)	24.8	48.4(7.3)	15.1	12.1(3.9)	32.7	4.8(3.4)	70.5	
고등학교	10.5(1.6)	15.4	26.9(2.5)	9.2	42.3(3.1)	7.2	13.3(1.9)	14.6	7.0(1.5)	22.2	
대학교 이상	8.1(1.4)	16.9	21.0(2.1)	10.1	36.5(2.2)	5.9	23.8(2.6)	10.8	10.6(1.3)	12.2	
직업											
전문행정관리	5.6(1.6)	28.0	25.9(3.8)	14.5	35.5(4.0)	11.1	20.0(3.5)	17.4	12.9(2.4)	18.8	
사무직	10.9(2.7)	24.4	22.6(3.6)	15.9	43.0(4.0)	9.4	18.5(3.7)	20.0	5.0(1.6)	32.7	
판매·서비스직	8.1(2.1)	26.4	25.3(4.5)	18.0	39.8(4.7)	11.8	18.5(3.8)	20.5	8.4(2.8)	33.1	
농림어업	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	
기능단순노무직	7.6(2.1)	27.6	28.2(3.7)	13.1	46.5(4.0)	8.7	11.5(2.7)	23.7	6.2(2.0)	32.2	
기타 ¹⁰⁾	13.0(2.0)	15.6	22.3(2.6)	11.8	36.3(2.9)	8.1	19.9(2.2)	11.0	8.5(1.5)	18.1	
월 가구소득											
100만원 미만	15.2(5.5)	36.5	22.3(7.3)	32.5	25.3(6.6)	26.1	28.2(8.2)	29.1	9.0(4.4)	48.5	
100-200만원 미만	11.5(6.3)	54.7	21.0(6.2)	29.7	47.9(7.1)	14.9	14.3(6.0)	42.2	5.3(5.2)	98.3	
200-300만원 미만	10.6(3.2)	30.0	21.3(3.9)	18.4	44.2(5.3)	12.0	20.0(3.7)	18.6	3.9(2.1)	52.8	
300-400만원 미만	6.2(1.7)	27.5	37.8(3.9)	10.2	35.9(4.2)	11.8	14.8(3.0)	20.0	5.2(1.6)	30.7	
400만원 이상	9.7(1.4)	14.4	21.5(2.2)	10.4	40.4(2.3)	5.7	17.8(1.6)	9.0	10.4(1.4)	13.1	

주 : 1) 현재 체감 환경 : (응답비기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 제학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

2) 수질											
(단위: %)											
구분	매우좋다		약간좋다		보통이다		약간나쁘다		매우나쁘다		
	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	
전체	8.5(1.2)	14.5	25.2(1.6)	6.3	53.9(1.9)	3.6	9.4(0.9)	9.5	2.9(0.7)	23.4	
성											
남자	9.7(1.6)	16.1	27.9(2.7)	9.8	51.9(2.7)	5.2	8.2(1.3)	15.9	2.4(0.9)	40.0	
여자	7.4(1.4)	18.3	22.6(1.9)	8.2	55.8(2.5)	4.5	10.6(1.2)	11.0	3.5(0.9)	25.9	
연령											
19-29	13.6(3.1)	23.0	30.4(4.4)	14.6	47.2(4.6)	9.8	4.1(1.7)	42.0	4.7(1.9)	39.7	
30-39	6.0(1.9)	31.1	24.2(3.1)	13.0	53.8(3.6)	6.7	14.2(2.9)	20.3	1.7(1.0)	59.8	
40-49	7.6(2.0)	26.4	23.5(3.0)	12.9	55.6(3.8)	6.8	9.1(1.9)	20.9	4.3(1.7)	39.9	
50-59	8.2(2.4)	29.1	19.5(3.0)	15.6	62.3(3.9)	6.3	8.4(2.0)	23.2	1.6(0.9)	54.6	
60-69	5.7(2.1)	37.7	28.1(4.4)	15.8	48.4(4.8)	9.9	14.2(3.6)	25.2	3.6(1.8)	50.7	
70 이상	9.4(3.4)	36.1	31.9(5.9)	18.6	49.6(6.6)	13.2	9.1(3.1)	34.5	0.0(0.0)	.	
19-64	8.6(1.3)	15.1	24.8(1.6)	6.6	54.5(1.9)	3.6	9.2(1.0)	10.7	2.9(0.8)	26.4	

65 이상	8.0(2.5)	31.8	28.5(4.8)	16.8	49.0(5.3)	10.7	11.2(2.2)	19.8	3.3(1.7)	52.1
교육수준 ⁹⁾										
무학	12.0(8.3)	69.4	24.6(9.4)	38.0	38.0(10.8)	28.5	18.6(7.6)	40.6	6.8(4.5)	65.9
초등학교	11.1(5.0)	45.1	23.7(5.4)	22.6	56.4(7.7)	13.7	8.8(3.6)	40.9	0.0(0.0)	.
중학교	7.1(3.5)	48.6	16.0(5.6)	34.7	63.5(6.9)	10.9	10.0(4.1)	41.5	3.3(2.4)	71.5
고등학교	7.8(1.6)	20.7	27.2(2.4)	9.0	52.9(3.0)	5.7	9.6(1.6)	16.9	2.5(1.0)	37.5
대학교 이상	8.9(1.5)	16.3	25.2(2.2)	8.6	53.7(2.5)	4.7	8.9(1.3)	14.4	3.3(1.1)	33.7
직업										
전문·행정관리	12.2(2.7)	21.9	28.7(3.9)	13.7	50.6(4.2)	8.3	7.6(2.0)	26.9	1.0(0.7)	69.3
사무직	7.8(3.0)	37.9	26.9(3.2)	11.9	53.8(4.0)	7.4	9.0(1.9)	21.2	2.5(1.3)	50.3
판매·서비스직	6.8(2.0)	30.1	26.4(4.9)	18.5	53.6(5.3)	9.9	8.6(3.0)	35.1	4.7(2.4)	50.4
농림어업	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	6.7(2.6)	38.8	21.2(2.7)	12.8	60.9(4.0)	6.5	9.4(2.3)	24.0	1.7(1.2)	71.5
기타 ¹⁰⁾	8.6(1.9)	21.9	24.4(2.6)	10.5	51.7(3.4)	6.6	11.1(1.7)	15.3	4.2(1.3)	31.4
월 가구소득										
100만원 미만	6.3(3.6)	57.9	34.0(8.1)	23.7	45.0(8.9)	19.9	9.1(3.4)	37.1	5.6(2.3)	40.1
100~200만원 미만	1.8(1.8)	100.9	27.0(7.6)	28.2	65.6(7.3)	11.1	5.6(3.1)	55.7	0.0(0.0)	.
200~300만원 미만	7.3(3.0)	40.4	14.6(3.8)	26.2	57.0(4.3)	7.5	17.8(3.1)	17.4	3.3(2.0)	60.5
300~400만원 미만	1.1(0.8)	70.9	27.3(3.4)	12.3	56.4(3.7)	6.5	8.8(2.3)	26.6	6.5(2.1)	33.1
400만원 이상	11.5(1.6)	14.3	26.3(2.2)	8.5	52.1(2.4)	4.7	8.2(1.0)	11.9	1.8(0.9)	47.8

주 : 1) 현재 체감 환경 : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

3) 토양(쓰레기, 폐기물로 인한 오염)

(단위 : %)

구분	매우좋다		약간좋다		보통이다		약간나쁘다		매우나쁘다	
	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수
전체	8.8(1.0)	11.5	30.2(1.8)	6.0	43.4(1.7)	4.0	11.5(1.1)	9.2	6.2(0.9)	14.1
성										
남자	9.3(1.5)	16.3	33.4(2.8)	8.3	43.3(2.7)	6.2	9.8(1.5)	15.7	4.3(1.1)	25.5
여자	8.3(1.3)	16.0	27.0(1.9)	7.2	43.5(2.2)	5.1	13.2(1.8)	13.3	8.0(1.2)	15.4
연령										
19~29	9.9(2.4)	24.0	28.9(4.2)	14.6	38.5(4.8)	12.5	15.1(3.1)	20.2	7.6(2.3)	30.6
30~39	6.4(1.8)	28.4	27.8(3.6)	13.1	45.9(3.4)	7.4	13.2(2.5)	18.9	6.7(2.1)	31.6
40~49	10.6(2.4)	22.6	25.7(3.1)	12.1	47.0(3.8)	8.1	10.5(2.4)	22.3	6.2(2.2)	34.6
50~59	8.3(2.1)	24.8	32.5(3.7)	11.5	44.9(3.8)	8.5	9.6(2.1)	22.0	4.7(1.7)	36.4
60~69	6.6(2.2)	33.4	34.8(5.3)	15.3	42.1(4.9)	11.5	10.0(2.7)	26.9	6.6(2.6)	39.2
70 이상	10.6(3.1)	29.3	39.9(5.4)	13.5	36.3(5.6)	15.5	8.6(3.2)	36.9	4.5(3.1)	69.5
19~64	8.7(1.1)	12.5	28.8(1.9)	6.6	44.4(1.8)	4.2	11.8(1.2)	10.2	6.2(0.9)	14.5
65 이상	9.4(2.7)	28.2	40.2(4.8)	11.9	35.2(4.4)	12.5	9.5(2.7)	27.9	5.7(2.9)	51.2
교육수준 ⁹⁾										
무학	11.3(5.9)	51.9	39.3(9.7)	24.6	38.9(11.6)	29.8	7.2(5.0)	68.6	3.3(3.2)	96.3
초등학교	4.9(2.9)	59.2	34.6(5.7)	16.5	32.8(5.8)	17.6	14.8(5.3)	35.7	12.9(5.4)	41.5
중학교	6.9(3.0)	42.7	25.2(5.9)	23.5	48.4(6.2)	12.8	13.7(4.9)	36.1	5.7(3.5)	61.0
고등학교	7.2(1.3)	17.8	32.3(2.8)	8.7	44.1(2.9)	6.5	9.0(1.8)	20.2	7.3(1.6)	22.4
대학교 이상	10.6(1.5)	14.0	28.2(2.4)	8.4	43.3(2.5)	5.8	13.2(1.9)	14.1	4.7(1.0)	21.2
직업										
전문·행정관리	10.3(2.3)	22.1	30.9(3.5)	11.2	42.0(3.4)	8.1	11.9(2.3)	19.5	4.9(1.7)	35.3
사무직	9.0(2.8)	31.4	32.2(4.2)	13.0	46.5(4.3)	9.3	9.2(2.2)	23.9	3.1(1.4)	45.7
판매·서비스직	10.6(2.9)	27.6	25.9(4.6)	17.9	39.5(5.4)	13.7	14.5(3.9)	26.7	9.4(3.0)	31.9
농림어업	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	4.9(1.7)	34.7	29.4(4.4)	15.1	47.7(4.0)	8.4	7.9(2.1)	26.5	10.0(3.0)	29.9
기타 ¹⁰⁾	9.3(1.6)	17.0	31.1(2.4)	7.7	41.8(2.6)	6.3	12.8(2.2)	17.2	5.1(1.2)	23.4
월 가구소득										
100만원 미만	11.2(3.7)	33.4	34.1(6.2)	18.2	29.9(4.8)	15.9	11.0(4.4)	39.7	13.8(4.2)	30.1
100~200만원 미만	4.9(3.3)	67.8	34.3(8.6)	25.2	48.5(9.6)	19.8	0.0(0.0)	.	12.3(7.1)	57.2
200~300만원 미만	6.5(2.1)	33.0	25.5(4.3)	17.1	45.6(5.2)	11.4	15.7(2.9)	18.2	6.9(2.5)	36.1
300~400만원 미만	2.6(1.3)	51.1	33.7(4.4)	13.0	43.3(4.5)	10.3	13.1(2.7)	20.4	7.3(2.1)	29.3
400만원 이상	11.2(1.6)	14.5	29.0(2.1)	7.4	44.1(2.0)	4.6	11.2(1.5)	13.2	4.5(1.0)	21.7

주 : 1) 현재 체감 환경 : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
 2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 제학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
 3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

4) 소음 진동

(단위 : %)

구분	매우좋다		약간좋다		보통이다		약간나쁘다		매우나쁘다	
	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수
전체	13.0(1.4)	11.1	26.0(1.8)	6.9	32.6(2.0)	6.2	19.8(1.4)	7.1	8.6(1.1)	12.2
성										
남자	12.7(1.8)	14.2	26.8(2.7)	10.0	33.7(2.8)	8.5	19.6(2.0)	10.0	7.4(1.5)	20.2
여자	13.3(2.0)	15.1	25.2(2.2)	8.7	31.7(2.3)	7.3	20.0(2.0)	9.9	9.8(1.2)	12.2
연령										
19-29	14.2(3.0)	21.2	28.4(3.8)	13.5	28.9(4.9)	17.1	16.9(3.1)	18.6	11.6(3.0)	25.5
30-39	12.4(2.2)	18.0	24.0(3.2)	13.3	33.9(3.8)	11.2	21.9(2.8)	13.0	7.8(2.1)	26.5
40-49	13.8(2.7)	19.6	20.3(2.9)	14.1	33.6(3.4)	10.2	23.7(3.4)	14.4	8.6(2.0)	23.3
50-59	9.9(2.7)	27.1	30.5(4.2)	13.6	36.7(3.4)	9.4	16.6(2.4)	14.7	6.3(1.4)	23.1
60-69	10.5(3.7)	34.8	24.0(4.2)	17.4	30.5(4.2)	13.9	26.8(4.9)	18.4	8.1(3.2)	38.9
70 이상	21.3(4.8)	22.5	31.9(6.4)	19.9	27.5(6.2)	22.4	9.5(3.0)	31.5	9.9(4.4)	44.4
19-64	12.6(1.5)	11.6	25.5(1.8)	6.9	33.2(2.2)	6.6	20.3(1.5)	7.6	8.4(1.0)	11.8
65 이상	16.2(3.6)	22.6	29.5(4.7)	15.8	28.3(4.3)	15.3	16.0(3.0)	18.6	10.0(3.2)	32.5
교육수준 ⁹⁾										
무학	23.5(9.8)	41.7	38.6(12.1)	31.4	31.0(10.5)	33.9	3.5(3.6)	101.7	3.3(3.2)	96.3
초등학교	20.5(7.7)	37.5	23.2(6.2)	26.7	25.5(6.1)	23.7	16.5(5.7)	34.6	14.3(6.2)	43.1
중학교	15.0(4.9)	33.0	33.5(6.4)	19.2	21.9(5.2)	23.7	19.5(4.8)	24.4	10.1(3.8)	37.5
고등학교	10.7(1.9)	17.9	25.5(2.7)	10.4	33.7(2.9)	8.6	20.9(2.2)	10.4	9.2(1.7)	18.2
대학교 이상	13.3(1.5)	11.0	25.0(2.1)	8.4	34.1(2.6)	7.7	20.0(2.1)	10.6	7.5(1.3)	17.0
직업										
전문행정관리	10.9(2.3)	21.4	29.1(3.7)	12.8	31.8(4.0)	12.4	19.1(3.1)	16.5	9.0(2.3)	25.0
사무직	16.3(3.4)	20.7	27.0(4.1)	15.1	35.5(4.3)	12.1	16.3(3.0)	18.3	4.9(1.5)	31.7
판매·서비스직	7.9(2.4)	31.2	19.5(4.1)	20.9	37.7(4.4)	11.7	24.3(3.7)	15.4	10.7(3.1)	28.5
농림어업	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	11.5(3.5)	30.6	22.5(3.9)	17.5	34.0(3.8)	11.3	21.8(3.2)	14.7	10.1(3.0)	29.6
기타 ¹⁰⁾	15.3(2.3)	15.1	27.4(2.6)	9.5	29.3(2.8)	9.5	19.3(2.3)	12.1	8.7(1.6)	18.0
월 가구소득										
100만원 미만	13.3(5.1)	38.6	15.7(4.9)	31.4	30.5(7.7)	25.3	23.7(5.7)	23.9	16.7(7.1)	42.5
100-200만원 미만	9.7(4.3)	43.9	32.4(8.5)	26.3	31.4(6.5)	20.5	14.2(4.9)	34.3	12.2(7.0)	57.9
200-300만원 미만	9.6(3.2)	33.5	18.3(4.1)	22.7	30.4(4.0)	13.1	28.7(3.9)	13.4	13.0(3.1)	23.9
300-400만원 미만	8.6(2.3)	26.5	32.6(3.9)	12.1	36.1(5.0)	13.8	17.1(3.5)	20.5	5.6(2.1)	37.1
400만원 이상	14.6(1.9)	12.7	26.2(2.4)	9.2	32.8(2.5)	7.7	18.8(2.0)	10.5	7.6(1.3)	17.1

주 : 1) 현재 체감 환경 : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
 2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 제학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
 3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

5) 녹지 환경(공원, 가로수 등)

(단위 : %)

구분	매우좋다		약간좋다		보통이다		약간나쁘다		매우나쁘다	
	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수
전체	31.8(1.9)	6.1	37.9(1.9)	5.1	24.0(1.7)	7.0	5.0(0.8)	15.9	1.3(0.3)	27.5
성										
남자	31.8(2.6)	8.0	38.1(2.8)	7.4	24.2(2.4)	9.7	4.5(1.1)	24.6	1.4(0.6)	42.2
여자	31.8(2.4)	7.7	37.7(2.5)	6.7	23.9(2.1)	9.0	5.4(1.0)	18.1	1.2(0.3)	29.5
연령										
19-29	22.5(3.9)	17.2	45.2(4.9)	10.9	27.4(4.1)	15.1	4.4(2.1)	46.8	0.5(0.5)	98.4
30-39	39.4(3.6)	9.1	34.9(3.2)	9.2	18.5(2.8)	14.9	6.7(2.0)	29.9	0.5(0.5)	100.1
40-49	33.7(3.2)	9.6	34.5(3.5)	10.0	23.2(2.9)	12.6	5.7(2.0)	34.2	2.8(1.0)	37.2

50-59	27.2(4.1)	15.0	41.5(4.0)	9.6	26.9(3.4)	12.5	4.4(1.6)	34.9	0.0(0.0)	.
60-69	34.3(4.3)	12.5	33.5(4.8)	14.4	24.5(3.7)	15.3	4.5(2.0)	45.0	3.2(2.0)	62.4
70 이상	41.9(5.5)	13.0	32.4(5.2)	16.1	22.5(5.6)	25.1	2.0(1.4)	69.6	1.2(1.2)	98.8
19-64	30.7(2.0)	6.7	38.5(1.9)	5.0	24.5(1.8)	7.2	5.1(0.8)	16.2	1.1(0.3)	29.7
65 이상	40.0(4.5)	11.3	33.0(4.9)	14.8	20.9(4.1)	19.5	3.9(1.7)	44.4	2.2(1.1)	52.0
교육수준 ⁹⁾										
무학	46.9(10.2)	21.8	18.7(7.5)	40.0	34.3(8.8)	25.6	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
초등학교	32.6(7.1)	21.9	23.6(6.1)	26.0	34.0(7.7)	22.6	6.3(2.8)	44.5	3.5(2.5)	71.3
중학교	29.8(5.6)	18.7	31.0(6.0)	19.4	27.8(6.0)	21.7	10.2(4.4)	43.0	1.2(1.2)	100.2
고등학교	26.9(2.8)	10.3	43.8(3.2)	7.3	23.6(2.6)	10.8	5.0(1.2)	24.7	0.7(0.5)	75.4
대학교 이상	35.4(2.3)	6.5	36.4(2.6)	7.0	22.4(1.9)	8.4	4.3(1.0)	24.0	1.6(0.5)	30.4
직업										
전문·행정관리	30.7(3.3)	10.9	44.4(3.3)	7.5	19.7(3.2)	16.1	2.8(1.1)	38.0	2.5(0.8)	31.8
사무직	36.5(3.9)	10.7	42.0(4.0)	9.4	18.0(2.9)	16.2	3.4(1.4)	39.7	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	27.2(4.4)	16.3	33.2(5.4)	16.3	33.2(4.6)	14.0	5.6(2.7)	49.2	0.8(0.8)	100.9
농림어업	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능·단순노무직	28.1(4.1)	14.5	36.9(4.2)	11.3	28.3(4.2)	14.9	4.4(1.6)	37.2	2.2(1.3)	60.2
기타 ¹⁰⁾	34.1(3.0)	8.9	34.6(2.8)	8.0	23.3(2.4)	10.4	7.0(1.6)	22.8	1.0(0.6)	60.0
월 가구소득										
100만원 미만	30.3(9.3)	30.7	34.7(8.7)	25.1	26.2(7.6)	28.9	8.7(5.1)	58.2	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	24.0(7.1)	29.7	35.8(8.3)	23.3	33.1(10.0)	30.1	1.6(1.6)	100.9	5.5(4.0)	73.7
200-300만원 미만	28.6(5.2)	18.1	30.4(4.0)	13.1	33.8(4.9)	14.6	5.9(2.2)	38.0	1.4(1.0)	70.5
300-400만원 미만	24.3(3.6)	14.8	42.4(4.3)	10.1	26.1(4.2)	15.9	6.6(2.1)	31.4	0.6(0.6)	96.4
400만원 이상	34.8(2.4)	6.9	39.1(2.4)	6.1	20.6(2.0)	9.6	4.3(1.0)	23.2	1.2(0.4)	34.9

주 : 1) 현재 체감 환경 : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 117> 심폐소생술 인지율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	96.2(0.7)	0.7	396	96.6(1.0)	1.0	506	95.9(0.9)	0.9
연령									
19-29	135	99.5(0.5)	0.5	56	100.0(0.0)	0.0	79	98.9(1.1)	1.1
30-39	188	98.5(1.1)	1.1	85	98.8(1.2)	1.2	103	98.1(1.8)	1.9
40-49	211	99.7(0.3)	0.3	96	100.0(0.0)	0.0	115	99.4(0.6)	0.6
50-59	182	94.0(1.8)	1.9	78	93.8(2.7)	2.9	104	94.2(2.2)	2.3
60-69	112	92.8(2.8)	3.0	48	88.9(5.0)	5.6	64	96.0(2.3)	2.4
70 이상	74	82.9(3.8)	4.6	33	89.0(5.3)	5.9	41	77.4(5.8)	7.5
19-64	780	97.3(0.6)	0.7	341	97.2(1.0)	1.0	439	97.3(0.8)	0.8
65 이상	122	88.5(2.6)	3.0	55	91.6(4.0)	4.3	67	85.7(3.9)	4.6
교육수준 ²⁾									
무학	25	70.2(8.2)	11.6	5	-(-)	-	20	62.3(9.7)	15.6
초등학교	50	82.2(5.9)	7.2	17	-(-)	-	33	83.5(5.2)	6.2
중학교	62	91.4(3.9)	4.3	22	90.8(6.6)	7.3	40	91.7(4.8)	5.3
고등학교	332	96.5(1.0)	1.1	146	95.4(1.7)	1.8	186	97.6(1.3)	1.3
대학교 이상	433	99.3(0.4)	0.4	206	99.2(0.6)	0.6	227	99.5(0.5)	0.5
직업									
전문행정관리	162	99.6(0.4)	0.4	87	100.0(0.0)	0.0	75	99.0(1.0)	1.0
사무직	160	99.4(0.6)	0.6	84	100.0(0.0)	0.0	76	98.5(1.5)	1.5
판매·서비스직	110	96.6(1.7)	1.8	44	98.2(1.8)	1.8	66	95.3(2.9)	3.0
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	158	91.5(2.0)	2.1	109	91.3(2.6)	2.8	49	92.2(3.3)	3.6
기타 ³⁾	310	95.1(1.2)	1.3	70	95.0(2.1)	2.2	240	95.2(1.4)	1.5
월 가구소득									
100만원 미만	54	92.0(4.5)	4.9	19	-(-)	-	35	95.0(3.4)	3.6
100-200만원 미만	44	96.8(2.3)	2.4	15	-(-)	-	29	94.7(3.8)	4.1
200-300만원 미만	121	93.7(2.3)	2.4	60	96.4(1.9)	1.9	61	90.6(4.1)	4.6
300-400만원 미만	157	95.6(1.6)	1.7	72	96.2(2.0)	2.1	85	95.0(2.1)	2.3
400만원 이상	521	97.3(0.8)	0.8	228	97.2(1.1)	1.1	293	97.4(1.0)	1.0

주 : 1) 심폐소생술 인지율 : (심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 제학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 118> 심폐소생술 교육경험률¹⁾

(단위: %)

구분	심폐소생술 교육경험률 ¹⁾			심폐소생술 마네킹 실습 경험률 ²⁾		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	30.2(1.6)	5.4	902	27.3(1.5)	5.7
성						
남자	396	43.7(2.4)	5.6	396	39.7(2.5)	6.3
여자	506	17.0(2.0)	11.6	506	15.3(1.9)	12.5
연령						
19-29	135	51.1(4.9)	9.6	135	46.2(5.0)	10.9
30-39	188	40.3(3.3)	8.2	188	34.4(3.2)	9.3
40-49	211	23.9(2.6)	11.0	211	21.7(2.6)	12.1
50-59	182	26.6(3.7)	14.0	182	26.6(3.7)	14.0
60-69	112	12.0(3.2)	26.9	112	11.3(3.2)	28.1
70 이상	74	5.2(2.5)	48.3	74	2.2(1.5)	68.5
19-64	780	33.2(1.7)	5.1	780	30.4(1.7)	5.5
65 이상	122	6.5(2.1)	33.0	122	4.0(1.7)	42.3
교육수준 ³⁾						
무학	25	0.0(0.0)	.	25	0.0(0.0)	.
초등학교	50	5.9(3.3)	55.7	50	4.5(2.9)	64.6
중학교	62	12.3(5.2)	42.3	62	10.4(4.2)	40.4
고등학교	332	30.9(2.8)	9.0	332	28.2(2.8)	10.1
대학교 이상	433	36.0(2.5)	6.8	433	32.7(2.4)	7.2
직업						
전문행정관리	162	38.8(4.0)	10.2	162	38.3(3.9)	10.3
사무직	160	45.6(4.0)	8.8	160	39.5(4.0)	10.1
판매·서비스직	110	42.6(4.7)	11.0	110	37.0(4.6)	12.4
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-
기능단순노무직	158	24.8(3.6)	14.5	158	22.4(3.3)	14.9
기타 ⁴⁾	310	15.6(2.4)	15.2	310	14.0(2.2)	15.9
월 가구소득						
100만원 미만	54	13.6(4.2)	30.7	54	11.2(4.4)	39.2
100-200만원 미만	44	34.9(10.0)	28.5	44	31.2(10.2)	32.6
200-300만원 미만	121	22.3(3.5)	15.9	121	19.0(3.3)	17.5
300-400만원 미만	157	28.9(4.1)	14.3	157	27.2(4.3)	15.8
400만원 이상	521	33.8(2.0)	5.9	521	30.8(1.8)	6.0

주 : 1) 심폐소생술 교육 경험률 : (최근 2년 동안 심폐소생술 교육을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 심폐소생술 마네킹 실습 경험률 : (최근 2년 동안 마네킹을 이용한 심폐소생술 실습을 한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 119> 심폐소생술 시행능력률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	66.0(1.5)	2.2	396	85.0(1.7)	2.0	506	47.5(2.3)	4.8
연령									
19-29	135	75.8(4.0)	5.3	56	95.7(2.7)	2.8	79	54.1(6.5)	11.9
30-39	188	62.2(2.8)	4.5	85	83.8(4.0)	4.8	103	41.4(4.6)	11.0
40-49	211	69.7(3.3)	4.7	96	85.6(3.7)	4.3	115	54.5(5.3)	9.7
50-59	182	71.0(3.0)	4.2	78	85.0(4.1)	4.8	104	56.8(4.9)	8.6
60-69	112	59.4(4.5)	7.6	48	81.2(5.5)	6.8	64	41.4(6.0)	14.5
70 이상	74	33.2(5.6)	16.9	33	60.0(8.7)	14.5	41	8.9(4.1)	46.5

주 : 1) 심폐소생술 시행능력률 : (심폐소생술을 "정확하게" 또는 "대략" 시행할 수 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

<표 120> 식품 안정성 확보율¹⁾

(단위: %)

구분	N	우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다		우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다		경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다		경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다		식품 안정성 확보율 ¹⁾	
		% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수
전체	460	58.3(2.1)	3.7	37.8(2.2)	5.8	3.1(1.0)	31.9	0.8(0.4)	50.2	96.1(1.2)	1.3
월 가구소득											
100만원 미만	36	40.2(7.7)	19.2	28.6(5.6)	19.6	20.2(6.3)	31.3	11.1(4.8)	42.9	68.7(9.2)	13.4
100-200만원 미만	26	23.6(8.4)	35.6	64.3(9.9)	15.4	12.1(7.0)	57.7	0.0(0.0)	.	87.9(7.0)	7.9
200-300만원 미만	68	50.7(5.8)	11.4	49.3(5.8)	11.7	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	100.0(0.0)	0.0
300-400만원 미만	84	52.1(6.2)	12.0	44.5(5.9)	13.3	3.4(2.5)	72.5	0.0(0.0)	.	96.6(2.5)	2.6
400만원 이상	243	69.0(2.7)	3.9	30.6(2.7)	8.8	0.4(0.4)	100.3	0.0(0.0)	.	99.6(0.4)	0.4

주 : 1) 식품 안정성 확보율 : (“우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다” 혹은 “우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다”에 응답한 가구의 수 / 조사대상 가구 수) × 100

<표 121> (가구)치매환자 가족 가구율 및 동거가구율

(단위: %)

구분	치매환자 가족 가구율 ¹⁾			치매환자 동거가구율 ²⁾		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	460	9.6(1.4)	14.8	45	12.4(5.4)	43.3
월 가구소득						
100만원 미만	36	2.7(2.7)	98.6	1	-(-)	-
100-200만원 미만	26	4.0(3.9)	98.6	1	-(-)	-
200-300만원 미만	68	10.0(3.3)	33.2	7	-(-)	-
300-400만원 미만	84	6.9(2.4)	35.0	6	-(-)	-
400만원 이상	243	11.8(2.2)	18.6	29	9.4(5.1)	54.4

주 : 1) 치매환자 가족 가구율 : (가족 중에 의사로 부터 치매를 진단받은 환자가 있는 응답가구의 수 / 조사대상 가구 수) × 100

2) 치매환자 동거가구율 : (현재 치매환자와 함께 거주하고 있는 가구의 수 / 가족 중에 의사로 부터 치매를 진단받은 환자가 있는 응답가구의 수) × 100

<표 122> 비만도 분포¹⁾ 및 비만율²⁾(실제계측)

(단위: %)

구분	N	비만도 분포 ¹⁾						체질량지수(BMI)	
		저체중		정상		비만(비만율) ²⁾		평균 (표준오차)	변동계수
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수		
전체	824	4.9(0.8)	16.6	61.1(1.9)	3.1	34.0(2.0)	5.8	23.9(0.2)	0.6
성									
남자	362	2.6(0.8)	31.1	55.7(2.7)	4.9	41.7(2.8)	6.7	24.9(0.2)	0.8
여자	462	7.2(1.5)	20.5	66.3(2.2)	3.3	26.5(2.1)	7.9	22.9(0.2)	0.8
연령									
19-29	119	9.5(2.5)	26.7	70.3(4.3)	6.1	20.2(4.0)	20.0	23.0(0.5)	2.1
30-39	177	7.1(2.3)	31.6	68.5(3.3)	4.8	24.4(3.3)	13.5	23.2(0.3)	1.4
40-49	194	3.1(1.2)	38.9	58.2(3.9)	6.8	38.7(3.7)	9.5	24.2(0.3)	1.1
50-59	156	3.2(1.6)	50.3	58.1(4.5)	7.7	38.6(4.0)	10.3	24.1(0.3)	1.1
60-69	107	2.7(1.1)	39.4	45.1(5.5)	12.3	52.2(5.6)	10.7	25.3(0.3)	1.3
70 이상	71	1.0(1.0)	98.5	58.6(6.5)	11.1	40.4(6.7)	16.6	24.3(0.4)	1.7
19-64	707	5.5(0.9)	17.0	61.8(2.0)	3.2	32.8(2.0)	6.2	23.8(0.2)	0.7
65 이상	117	1.3(0.9)	69.1	55.9(5.1)	9.1	42.8(5.2)	12.2	24.5(0.3)	1.1
교육수준 ³⁾									
무학	25	0.0(0.0)	.	39.4(8.3)	21.1	60.6(8.3)	13.7	25.5(0.5)	2.0
초등학교	49	1.5(1.5)	101.7	51.1(7.5)	14.8	47.5(7.7)	16.3	24.5(0.4)	1.8
중학교	57	3.2(3.1)	97.6	60.5(7.5)	12.4	36.3(7.3)	20.2	24.0(0.5)	2.1
고등학교	298	4.9(1.2)	24.4	60.6(2.9)	4.8	34.5(3.1)	8.9	24.2(0.3)	1.1
대학교 이상	395	5.9(1.3)	22.3	63.7(2.4)	3.8	30.5(2.6)	8.5	23.5(0.2)	0.8
직업									
전문행정관리	146	5.2(1.7)	33.6	59.5(4.3)	7.2	35.3(4.6)	13.0	24.0(0.4)	1.5
사무직	148	3.8(1.7)	44.3	67.0(4.1)	6.1	29.1(4.0)	13.6	23.8(0.3)	1.3
판매·서비스직	94	5.9(2.6)	44.2	58.5(4.9)	8.4	35.6(4.9)	13.8	23.7(0.5)	1.9
농림어업	2	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	146	3.3(1.6)	48.8	52.7(3.7)	7.1	44.0(4.0)	9.0	24.8(0.3)	1.3
기타 ⁴⁾	288	6.0(1.5)	26.0	63.7(3.2)	5.0	30.3(3.0)	9.9	23.6(0.3)	1.1
월 가구소득									
100만원 미만	48	2.2(2.2)	100.1	54.4(7.6)	13.9	43.5(7.3)	16.9	24.6(0.4)	1.6
100-200만원 미만	39	9.0(5.3)	58.9	61.0(6.1)	10.1	29.9(6.2)	20.7	23.6(0.7)	3.0
200-300만원 미만	109	4.3(2.1)	48.9	51.8(5.0)	9.7	43.9(4.8)	10.8	24.6(0.5)	2.0
300-400만원 미만	147	3.3(1.7)	50.7	63.5(4.0)	6.3	33.1(4.1)	12.4	23.9(0.3)	1.1
400만원 이상	477	5.1(1.1)	22.0	63.2(2.5)	3.9	31.6(2.6)	8.2	23.8(0.2)	0.9

주 : 1) 비만도 분포 : 저체중(BMI<18.5), 정상(18.5≤BMI<25), 비만(BMI≥25)

2) 비만율 : (체질량지수(kg/m²) 25 이상인 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 123> 남자 비만도 분포¹⁾ 및 비만율²⁾(실제계측)

(단위: %)

구분	N	비만도 분포 ¹⁾						체질량지수(BMI)	
		저체중		정상		비만(비만율) ²⁾		평균 (표준오차)	변동계수
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수		
남자	362	2.6(0.8)	31.1	55.7(2.7)	4.9	41.7(2.8)	6.7	24.9(0.2)	0.8
연령									
19-29	54	3.5(2.4)	68.4	66.1(6.0)	9.0	30.4(5.4)	17.9	24.8(0.6)	2.6
30-39	80	1.2(1.3)	101.9	63.0(5.8)	9.2	35.8(5.8)	16.1	25.0(0.4)	1.8
40-49	88	3.9(2.2)	55.8	46.5(4.9)	10.6	49.6(4.6)	9.3	25.3(0.4)	1.5
50-59	66	2.6(1.8)	71.3	51.4(6.8)	13.2	46.0(6.8)	14.8	24.7(0.4)	1.6
60-69	44	2.3(0.3)	13.3	45.9(8.5)	18.6	51.8(8.5)	16.5	25.6(0.4)	1.8
70 이상	30	0.0(0.0)	.	58.0(9.5)	16.4	42.0(9.5)	22.7	24.0(0.6)	2.7
19-64	312	3.0(0.9)	30.7	55.8(2.9)	5.1	41.3(2.9)	7.0	25.0(0.2)	0.8
65 이상	50	0.0(0.0)	.	54.9(8.1)	14.7	45.1(8.1)	17.9	24.5(0.5)	2.0
교육수준 ³⁾									
무학	5	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	16	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
중학교	20	0.0(0.0)	.	76.4(9.2)	12.0	23.6(9.2)	39.0	23.5(0.6)	2.5
고등학교	131	4.1(1.7)	41.9	54.4(3.9)	7.2	41.5(4.1)	9.8	25.1(0.3)	1.3
대학교 이상	190	2.1(0.9)	45.0	55.4(4.0)	7.1	42.5(3.9)	9.2	25.0(0.2)	0.9
직업									
전문행정관리	78	1.7(1.7)	99.2	52.1(6.1)	11.7	46.2(6.0)	13.0	25.3(0.4)	1.6
사무직	80	2.3(1.5)	65.5	58.6(5.7)	9.7	39.1(5.7)	14.6	25.0(0.4)	1.7
판매·서비스직	39	7.1(4.0)	57.2	53.6(7.3)	13.6	39.4(6.7)	17.1	24.4(0.6)	2.5
농림어업	2	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	100	3.7(2.0)	55.3	50.6(4.7)	9.3	45.7(4.9)	10.8	25.1(0.4)	1.7
기타 ⁴⁾	63	0.0(0.0)	.	62.7(6.7)	10.7	37.3(6.7)	17.9	24.7(0.6)	2.2
월 가구소득									
100만원 미만	14	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
100-200만원 미만	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
200-300만원 미만	55	3.2(1.7)	51.5	52.3(5.3)	10.1	44.4(5.4)	12.1	24.8(0.6)	2.5
300-400만원 미만	68	1.7(1.6)	97.8	61.0(5.3)	8.8	37.4(5.5)	14.7	24.7(0.4)	1.5
400만원 이상	208	1.6(0.8)	53.9	55.2(4.0)	7.2	43.3(4.0)	9.3	25.2(0.3)	1.2

주 : 1) 비만도 분포 : 저체중(BMI<18.5), 정상(18.5≤BMI<25), 비만(BMI≥25)

2) 비만율 : (체질량지수(kg/m²) 25 이상인 사람의 수 / 남자 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 124> 여자 비만도 분포¹⁾ 및 비만율²⁾(실제계측)

(단위: %)

구분	N	비만도 분포 ¹⁾						체질량지수(BMI)	
		저체중		정상		비만(비만율) ²⁾		평균 (표준오차)	변동계수
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수		
여자	462	7.2(1.5)	20.5	66.3(2.2)	3.3	26.5(2.1)	7.9	22.9(0.2)	0.8
연령									
19-29	65	17.0(4.9)	28.7	75.7(5.5)	7.3	7.4(2.8)	38.1	20.9(0.4)	1.7
30-39	97	12.8(4.1)	31.7	73.8(4.6)	6.2	13.4(3.5)	26.2	21.6(0.3)	1.6
40-49	106	2.4(1.4)	59.2	69.1(4.8)	6.9	28.6(4.8)	16.8	23.2(0.4)	1.7
50-59	90	3.9(2.7)	70.3	64.7(4.6)	7.2	31.5(4.5)	14.2	23.6(0.3)	1.5
60-69	63	3.1(1.9)	62.3	44.5(7.3)	16.4	52.4(7.7)	14.6	25.1(0.5)	1.8
70 이상	41	1.8(1.9)	102.1	59.1(8.0)	13.5	39.1(8.1)	20.7	24.5(0.5)	1.9
19-64	395	7.9(1.7)	21.3	67.8(2.4)	3.5	24.3(2.1)	8.8	22.7(0.2)	0.8
65 이상	67	2.4(1.7)	70.4	56.7(6.5)	11.5	40.9(6.9)	16.8	24.5(0.4)	1.5
교육수준 ³⁾									
무학	20	0.0(0.0)	.	49.9(9.2)	18.4	50.1(9.2)	18.3	25.0(0.7)	2.6
초등학교	33	2.3(2.3)	99.5	46.6(8.6)	18.5	51.1(9.4)	18.3	25.0(0.6)	2.4
중학교	37	5.0(4.8)	96.5	51.7(9.7)	18.8	43.3(9.7)	22.5	24.3(0.7)	2.8
고등학교	167	5.7(1.9)	32.6	66.8(3.3)	4.9	27.5(3.5)	12.6	23.3(0.3)	1.2
대학교 이상	205	10.3(2.5)	24.6	73.3(3.1)	4.2	16.4(2.6)	15.6	21.8(0.2)	1.0
직업									
전문행정관리	68	10.0(3.7)	36.5	69.9(5.5)	7.9	20.1(4.7)	23.5	22.1(0.4)	1.9
사무직	68	6.2(3.6)	58.2	80.0(5.3)	6.6	13.8(4.1)	30.1	22.0(0.4)	1.6
판매·서비스직	55	4.8(3.5)	72.4	62.9(6.9)	11.0	32.3(7.1)	22.1	23.1(0.7)	2.9
농림어업	0	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	46	2.3(2.2)	98.9	58.0(6.6)	11.3	39.8(6.5)	16.2	24.1(0.4)	1.5
기타 ⁴⁾	225	8.2(2.0)	24.8	64.1(3.6)	5.6	27.6(3.1)	11.2	23.1(0.3)	1.1
월 가구소득									
100만원 미만	34	3.3(3.3)	99.0	60.4(9.7)	16.1	36.3(9.3)	25.6	24.2(0.5)	2.3
100-200만원 미만	24	3.5(3.1)	91.2	60.3(9.0)	14.9	36.2(10.0)	27.6	24.4(0.9)	3.9
200-300만원 미만	54	5.7(4.2)	73.3	51.1(7.1)	13.9	43.3(6.1)	14.2	24.4(0.5)	1.9
300-400만원 미만	79	5.1(3.1)	60.7	66.3(5.6)	8.4	28.6(5.2)	18.2	23.0(0.3)	1.3
400만원 이상	269	8.6(2.1)	24.3	71.0(2.6)	3.6	20.5(2.4)	11.7	22.4(0.2)	1.1

주 : 1) 비만도 분포 : 저체중(BMI<18.5), 정상(18.5≤BMI<25), 비만(BMI≥25)

2) 비만율 : (체질량지수(kg/m²) 25 이상인 사람의 수 / 여자 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직



제4부 부록

- I. 개인조사표
- II. 가구조사표
- III. 지표정의
- IV. 2008-2018 산출지표

CHS

Community Health Survey

제 4 부 부록

I. 개인조사표



CHS

Community Health Survey

다음은 2018년 지역사회건강조사 개인조사표(인천권역)입니다. →

 승인번호 제 117075 호	 지역사회건강조사 Community Health Survey	인천
---	--	-----------

안녕하십니까?

질병관리본부에서는 「지역보건법」 제4조(지역사회 건강실태조사), 「지역보건법 시행령」 제2조(지역사회 건강실태조사의 방법 및 내용)에 의거하여 지역 건강통계를 생산하여 근거 중심의 보건사업 수행 기반을 마련하고자 매년 「지역사회건강조사」를 실시하오니 적극적인 협조 부탁드립니다.

지역사회건강조사는 전국 254개 보건소에서 매년 8월에서 10월까지 실시하며, 만 19세 이상 성인을 대상으로 흡연, 음주, 신체활동 등의 건강행태, 의료이용, 삶의 질 등을 조사합니다.

조사 자료는 통계법 제33조에 따라 비밀이 보장되며, 통계작성 외의 목적으로는 사용하지 않습니다. 정확한 응답을 위하여 반드시 조사대상자 본인이 성실하게 조사에 응답하여 주시기 바랍니다.

※ 통계법 제32조(통계응답자의 성실응답의무)

통계응답자는 통계의 작성에 관한 사무에 종사하는 자로부터 통계의 작성을 목적으로 질문 또는 자료제출 등의 요구를 받은 때에는 신뢰성 있는 통계가 작성될 수 있도록 조사사항에 대하여 성실하게 응답하여야 한다.

※ 통계법 제33조(비밀의 보호)

- ① 통계의 작성과정에서 알려진 사항으로서 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 사항은 보호되어야 한다.
- ② 통계의 작성을 위하여 수집된 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 자료는 통계 작성 외의 목적으로 사용되어서는 아니 된다.



보건복지부
질병관리본부

시도 보건소 표본지점 가구 가구원

관리번호 :

2018년 지역사회건강조사 참여 동의서

『지역사회건강조사』는 지역주민의 건강수준을 파악하여 지역단위 건강통계를 생산하기 위한 목적으로 실시되며, 수집된 개인정보는 조사의 진실성 검증을 위한 전화 확인 조사 후 파기됩니다. 그 외 수집된 자료는 통계 자료로서 보건정책 수립 및 보건사업 평가, 관련 연구 수행을 위한 용도로만 활용됩니다.

■ 개인정보 수집 및 이용 동의

[개인정보의 수집·이용 목적]

- 지역주민의 건강수준에 관한 지역사회건강통계 생산 및 관련 연구 수행
- 조사 진실성 검증을 위한 전화 확인 조사

[수집하려는 개인정보 항목]

- 개인정보: 성명, 생년월일, 전화번호
- 민감정보: 키, 몸무게, 혈압, 설문조사를 통한 질병에 관한 정보

[개인정보의 보유 및 이용 기간]

- 개인정보: 2018년 11월 30일까지
- 민감정보: 영구

개인정보 수집에 대한 동의를 거부할 수 있으며, 거부할 경우 불이익은 없습니다.

- 개인정보 수집·이용에 동의합니까?
☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음
- 민감정보 수집·이용에 동의합니까?
☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

위 동의 사항을 확인하였습니다.

2018년 월 일

참여자 성명 : (인) 또는 서명

수령증

조사를 마친 후 조사원으로부터 답례품을 받았습니다.

2018년 월 일

참여자 성명 : (인) 또는 서명

조사원 성명:

서명

 승 인 번 호 제 117075 호	2018년 지역사회건강조사	이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.
--	----------------	--

※ 조사대상자 번호를 정확히 기입하십시오.

시도 번호	보건소번호			표본지점번호					가구번호				가구원번호	

조 사 대 상 자

성명		주민등록 생년월일	□□□□ 년 □□ 월 □□ 일
성별	① 남자 ② 여자		가구명부의 주민등록상 생년월일과 동일한지 확인하십시오. 다른 경우 가구명부를 수정합니다.

조사장소 (* CAPI 내 조사원 입력 사항)

1. 조사 장소

- ① 실내(집 안) ② 실외(마당, 논밭 등 바깥)

☐

혈압측정 기초설문

1. 현재부터 30분 이내에 담배, 술, 커피, 격렬한 운동을 하셨습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

2. 오늘 고혈압 약을 복용하셨습니까?

- ① 예 ② 아니오 ③ 해당없음

☐

3. 본인의 혈압수치를 알고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

4. 마지막 음식섭취 시간은 언제입니까?

□□월 □□일 □□시 □□분

□□	월	□□	일
□□	시	□□	분

혈압측정(실제계측) 1차 (*CAPI 내 조사원 입력 사항)

1. 미측정 이유

- ① 측정 ② 제외대상 ③ 계측거부 ④ 기타()

☐

기 타

2. 혈압 측정 팔

- ① 오른쪽 ② 왼쪽
③ 비해당(문항1/②, ③, ④: 제외대상, 계측거부, 기타의 이유로 미측정)

☐

8. 비해당

3. 측정 전 5분 안정

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항1/②, ③, ④: 제외대상, 계측거부, 기타의 이유로 미측정)

☐

8. 비해당

4. 혈압측정 값 입력

수축기(최고혈압/SYS) □□□ mmHG

이완기(최저혈압/DIA) □□□ mmHG

888 888. 비해당(문항1/②, ③, ④: 제외대상, 계측거부, 기타의 이유로 미측정)

수축기	□□□ mmHG
이완기	□□□ mmHG
888 888. 비해당	

흡연

1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 5번 문항으로)



1-1. 처음으로 담배 한 대를 다 피운 시기는 언제입니까?

만 세 888. 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음)

세

888. 비해당

2. 현재 담배를 피우니까?

① 매일 피움 → 2-1-1. 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? 개비 (→ 3번 문항으로)

888. 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비)이상 피우지 않음, 문항2/②, ③: 현재 담배를 가끔 피우거나 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음)

8. 비해당

개비

888. 비해당

② 가끔 피움 → 2-2-1. 최근 1달간 흡연일 수는 며칠입니까? 일

→ 2-2-2. 흡연하는 날 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? 개비
(→ 3번 문항으로)

88 888. 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비)이상 피우지 않음, 문항2/①, ③: 현재 담배를 매일 피우거나 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음)

일

개비

88. 비해당

888. 비해당

③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음

→ 2-3-1. 과거흡연 기간은 얼마입니까? 년 개월

→ 2-3-2. 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? 개비

88 88 888. 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비)이상 피우지 않음,
문항2/①, ②: 현재 담배를 매일 피우거나 가끔 피움)

→ 2-3-3. 담배를 완전히 끊은 지 얼마나 되었습니까? (→ 5번 문항으로)

- ① 1년 미만
② 1년-5년 미만
③ 5년-10년 미만
④ 10년-15년 미만
⑤ 15년-20년 미만
⑥ 20년 이상

⑧ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비)이상 피우지 않음,
문항2/①, 현재 담배를 매일 피우거나 가끔 피움)

⑧ 비해당(문항 1/②: 평생 5갑(100개비)이상 피우지 않았음)

년 월

개비

88. 88. 비해당

888. 비해당

8. 비해당

3. 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 있습니까?

- ① 최근 1년간 금연한 적이 있다
② 과거에는 있었지만, 최근 1년간 없다
③ 금연한 적이 없다

⑧ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음, 문항2/③: 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음)

8. 비해당

4. 앞으로 담배를 끊을 계획이 있습니까?

- ① 1개월 안에 금연할 계획이 있다
 ② 6개월 안에 금연할 계획이 있다
 ③ 6개월 이내는 아니지만 언젠가는 금연할 생각이 있다
 ④ 현재로서는 전혀 금연할 생각이 없다
 ⑧ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음, 문항2/③: 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음)

☐

8. 비해당

※ 5-6번은 간접흡연에 대한 질문입니다. 질문에 모두 응답해 주십시오.

5. 본인을 제외한 가족 중 가정의 실내에서 일상적으로 담배를 피우는 분이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 6번 문항으로)

☐

5-1. 최근 1주일 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ⑧ 비해당(문항5/②: 가정실내에서 일상적으로 담배를 피우는 사람이 없음)

☐

8. 비해당

6. 최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까?

- ① 예
 ② 아니오
 ③ 직장엔 다니지 않음(일을 하지 않음)

☐

7. 지금까지 살아오는 동안 전자담배를 사용한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 8번 문항으로)

☐

7-1. 최근 1달 동안 전자담배를 사용한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ⑧ 비해당(문항7/②: 평생 전자담배를 사용한 적이 없음)

☐

8. 비해당

8. 지금까지 사용해본 것을 모두 표시해 주십시오. ※ 일반담배, 전자담배는 제외합니다.

- ① 피운적 없다 (⇒ 9번 문항으로)
 ② 머금는담배(스누스) ③ 물담배 ④ 시가
 ⑤ 껴련형 전자담배(아이코스, 글로 등, 쥘담배, 가열담배라고도 불림)
 ⑥ 씹는 담배 ⑦ 파이프 담배
 ⑧ 각련(롤링타바코) ⑨ 냄새 맡는 담배 ⑩ 기타()

☐기
타

8-1. 최근 1달 동안 사용해본 것을 모두 표시해 주십시오. ※ 일반담배, 전자담배는 제외합니다.

- ① 피운적 없다
 ② 머금는담배(스누스) ③ 물담배 ④ 시가
 ⑤ 껴련형 전자담배(아이코스, 글로 등, 쥘담배, 가열담배라고도 불림)
 ⑥ 씹는 담배 ⑦ 파이프 담배
 ⑧ 각련(롤링타바코) ⑨ 냄새 맡는 담배 ⑩ 기타()
 88. 비해당(문항8/①: 평생 다른 담배 제품을 사용하지 않음)

☐기
타

88. 비해당

건강조사 참여 Energy, 지역건강 Synergy

9. (지역) 담배를 끊기 위해 사용했던 방법들은 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오.

9-1. 특별한 방법 없이 자신의 의지로 참았음	① 예 ② 아니오
9-2. 니코틴 대체용품(금연패치, 금연껌, 금연사탕)	① 예 ② 아니오
9-3. 금연초	① 예 ② 아니오
9-4. 보건소 금연클리닉	① 예 ② 아니오
9-5. 금연상담센터(금연콜센터)	① 예 ② 아니오
9-6. 의사 처방에 의한 금연 치료(약물치료 또는 상담)	① 예 ② 아니오
9-7. 금연침	① 예 ② 아니오
9-8. 기타()	① 예 ② 아니오

88888888. 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음,
문항3/③: 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 없음)

☐ 8. 비해당

☐ 8. 비해당

☐ 8. 비해당

☐ 8. 비해당

☐ 8. 비해당

☐ 8. 비해당

☐ 8. 비해당

☐

기
타

☐

10. (지역) 최근 1년 동안 몇 번 금연을 시도하셨습니다? ☐ 회

88. 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음, 문항 2-3-3/②~⑥: 1년 이상 금연자,
문항3/②,③: 최근 1년 또는 평생 금연한 적 없음)

☐ 회

88. 비해당

11. (지역) 최근 1년 동안 공공장소(버스/택시 정거장, 길거리, 음식점, 유흥업소, PC방 등)에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 경험이 있습니까?

① 예 ② 아니오

☐

12. (지역) 금연구역이 지정되어 있다는 것을 알고 있습니까?

- ① 지정된 사실 및 구체적인 구역을 알고 있다
② 지정된 사실은 알지만, 구체적으로 어느 구역인지는 모른다
③ 지정된 것을 모른다

☐

13. (지역) 가장 효과적인 금연 프로그램은 무엇이라고 생각합니까?

- ① 공익광고(TV, 라디오, 포스터 등)
② 금연교육
③ 금연클리닉
④ 금연상담전화
⑤ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음)

☐

8. 비해당

14. (지역) 현재 살고 있는 시·군·구에서 강화해야 할 금연정책은 무엇인지 한 가지만 선택하여 주십시오.

- ① 금연구역 확대
② 금연구역 내 흡연 단속(과태료 인상)
③ 금연클리닉 확대 운영
④ 금연 교육 및 홍보 강화
⑤ 더 강화할 정책이 없다

☐

음주

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 음주에서 제외합니다.

1. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 3번 문항으로)

☐

2. 최근 1년 동안 술을 마신 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 3번 문항으로)

☐

⑧ 비해당(문항1/②: 평생 술을 마신 적이 없음)

8. 비해당



2-1. 술을 얼마나 자주 마십니까?

- ① 한 달에 1번 미만
② 한 달에 1번 정도
③ 한 달에 2~4번 정도
④ 일주일에 2~3번 정도
⑤ 일주일에 4번 이상
⑧ 비해당(문항1/②, 문항2/②: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적이 없음)

☐

8. 비해당

2-2. 한 번에 술을 얼마나 마십니까?

(※ 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단, 캔 맥주 1개(355cc)는 맥주 1.6잔과 같습니다)

- ① 1~2잔 ② 3~4잔 ③ 5~6잔 ④ 7~9잔 ⑤ 10잔 이상
⑧ 비해당(문항1/②, 문항2/②: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적이 없음)

☐

8. 비해당

2-3. 최근 1년 동안 절주(음주량을 줄임)나 금주를 시도한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항1/②, 문항2/②: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적이 없음)

☐

8. 비해당

3. 최근 1년 동안 타인의 음주로 인하여 소란, 폭행, 성추행, 작업 또는 일상생활 중 사고(몸을 다칩), 음주운전 사고 등을 경험한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

안전의식

【자동차 운전】

1. 자동차 운전을 합니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 2번 문항으로)

☐


1-1. 운전할 때 안전벨트를 맵니까?

- ① 전혀 매지 않는다
② 거의 매지 않는 편이다
③ 가끔 매는 편이다
④ 대체로 매는 편이다
⑤ 항상 맨다
⑧ 비해당(문항1/②: 자동차 운전을 하지 않음)

☐

8. 비해당

1-2. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자동차를 운전한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항1/②: 자동차 운전을 하지 않음, 「음주」문항1/②, 문항2/②: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적이 없음)

☐

8. 비해당

2. 다른 사람이 운전하는 자동차나 택시 앞좌석에 탈 때 안전벨트를 맵니까?

- ① 앞좌석에 타지 않는다
② 전혀 매지 않는다
③ 가끔 매는 편이다
④ 대체로 매는 편이다
⑤ 항상 맨다

☐

3. 다른 사람이 운전하는 자동차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 맵니까?

- ① 뒷좌석에 타지 않는다
② 전혀 매지 않는다
③ 가끔 매는 편이다
④ 대체로 매는 편이다
⑤ 항상 맨다

☐

4. 버스(광역 시내버스, 시외버스, 전세버스)를 탈 때 안전벨트를 맵니까?

- ① 버스를 타지 않는다
② 전혀 매지 않는다
③ 가끔 매는 편이다
④ 대체로 매는 편이다
⑤ 항상 맨다

☐

5. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 사람이 운전하는 자동차를 탄 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

【오토바이 운전】

6. 오토바이 운전을 합니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 7번 문항으로)

 6-1. 오토바이를 운전할 때 헬멧을 착용합니까?

- ① 전혀 착용하지 않는다
 ② 거의 착용하지 않는 편이다
 ③ 가끔 착용하는 편이다
 ④ 대체로 착용하는 편이다
 ⑤ 항상 착용한다
 ⑧ 비해당(문항6/②: 오토바이 운전을 하지 않음)

6-2. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 오토바이를 운전한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ⑧ 비해당(문항6/②: 오토바이 운전을 하지 않음, 「음주」문항1/②, 문항2/②: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적이 없음)

【자전거 운전】

7. 자전거 운전을 합니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 「운동 및 신체활동」 1번 문항으로)

 7-1. 자전거를 탈 때 헬멧을 착용합니까?

- ① 전혀 착용하지 않는다
 ② 거의 착용하지 않는 편이다
 ③ 가끔 착용하는 편이다
 ④ 대체로 착용하는 편이다
 ⑤ 항상 착용한다
 ⑧ 비해당(문항7/②: 자전거를 타지 않음)

7-2. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자전거를 운전한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ⑧ 비해당(문항7/②: 자전거를 타지 않음, 「음주」문항1/②, 문항2/②: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적이 없음)

운동 및 신체활동

1. 우선 본인이 일하는 시간을 생각해 보세요. 돈을 받고 하는 일, 돈을 받지 않고 하는 일, 학교생활/교육, 집안일, 농업, 어업, 목축업, 구직과 같이 현재 하고 있는 일이라고 생각하시면 됩니다(예: 직업, 학업, 집안일, 봉사활동, 학교 체육 수업 등).



- 1-1. 본인의 일은 최소 10분 이상 계속 숨이 많이 차거나 심장이 매우 빠르게 뛰는 고강도 신체 활동을 포함하고 있습니까?

※ 고강도 신체활동: 무거운 것을 들어 올리거나 나르는 일(약 20kg 이상), 땅파기, 건설 현장에서의 노동, 계단으로 물건 나르기 등

- ① 예
② 아니오(→ 문항 1-4번으로)

☐

- 1-2. 평소 1주일 동안 일과 관련된 고강도 신체활동을 며칠 하십니까?

일주일에 ☐ 일 8. 비해당(문항1-1/② : 고강도 운동을 하지 않음)

☐ 일
8. 비해당

- 1-3. 평소 하루에 일과 관련된 고강도 신체활동을 몇 시간 하십니까?

하루에 시간 분
88 88. 비해당(문항1-1/② : 고강도 운동을 하지 않음)

 시간 분
88 88. 비해당

- 1-4. 본인의 일은 최소 10분 이상 계속 숨이 차거나 심장이 약간 빠르게 뛰는 중강도 신체 활동을 포함하고 있습니까?

※ 중강도 신체활동: 빠르게 걷기(일하는 중에), 가벼운 물건 나르기, 청소, 육아(목욕 시키기, 아이 안아 주기 등) 등

- ① 예
② 아니오(→ 문항 2번으로)

☐

- 1-5. 평소 1주일 동안 일과 관련된 중강도 신체활동을 며칠 하십니까?

일주일에 ☐ 일 8. 비해당(문항1-4/② : 중강도 운동을 하지 않음)

☐ 일
8. 비해당

- 1-6. 평소 하루에 일과 관련된 중강도 신체활동을 몇 시간 하십니까?

하루에 시간 분
88 88. 비해당(문항1-4/② : 중강도 운동을 하지 않음)

 시간 분
88 88. 비해당

2. 앞서 말한 일과 관련된 신체활동은 제외합니다. 본인이 장소를 이동할 때, 어떻게 하시는데에 대해 묻겠습니다.



- 2-1. 평소 장소를 이동할 때 최소 10분 이상 계속 걸거나 자전거 이용을 하십니까?

- ① 예
② 아니오(→ 문항 3번으로)

☐

- 2-2. 평소 1주일 동안 장소를 이동할 때 최소 10분 이상 계속 걸거나 자전거 이용을 며칠 하십니까?

일주일에 ☐ 일 8. 비해당(문항2-1/② : 걸거나 자전거 이용하지 않음)

☐ 일
8. 비해당

- 2-3. 평소 하루에 장소를 이동할 때 걸거나 자전거 이용을 몇 시간 하십니까?

하루에 시간 분
88 88. 비해당(문항2-1/② : 걸거나 자전거 이용하지 않음)

 시간 분
88 88. 비해당

3. 앞서 말한 일과 장소 이동 시 신체활동에 대해서는 제외합니다. 스포츠, 운동 및 여가 활동에 대하여 묻겠습니다.

3-1. 평소 최소 10분 이상 계속 숨이 많이 차거나 심장이 매우 빠르게 뛰는 고강도의 스포츠, 운동 및 여가 활동을 하십니까?

※ 고강도 운동 및 여가활동: 달리기, 줄넘기, 등산, 농구 시합, 수영, 배드민턴 등

① 예

② 아니오(⇒ 문항 3-4번으로)

3-2. 평소 1주일 동안 고강도의 스포츠, 운동 및 여가 활동을 며칠 하십니까?

일주일예 ☐ 일

8. 비해당(문항3-1/② : 고강도의 스포츠, 운동 및 여가 활동을 하지 않음)

3-3. 평소 하루에 고강도의 스포츠, 운동 및 여가 활동을 몇 시간 하십니까?

하루에 시간 분

88 88. 비해당(문항3-1/②, 문항3-2/0일 : 고강도의 스포츠, 운동 및 여가 활동을 하지 않음)

3-4. 평소 최소 10분 이상 계속 숨이 약간 차거나 심장이 약간 빠르게 뛰는 중강도의 스포츠, 운동 및 여가 활동을 하십니까?

※ 중강도 운동 및 여가활동: 빠르게 걷기, 가볍게 뛰기(조깅), 웨이트 트레이닝(근력 운동), 골프, 댄스스포츠, 필라테스 등

① 예

② 아니오(⇒ 문항 4번으로)

3-5. 평소 1주일 동안 중강도의 스포츠, 운동 및 여가 활동을 며칠 하십니까?

일주일예 ☐ 일

8. 비해당(문항3-4/② : 중강도의 스포츠, 운동 및 여가 활동을 하지 않음)

3-6. 평소 하루에 중강도의 스포츠, 운동 및 여가 활동을 몇 시간 하십니까?

하루에 시간 분

88 88. 비해당(문항3-4/② : 중강도의 스포츠, 운동 및 여가 활동을 하지 않음)

4. 다음은 자는 시간을 제외하고, 일할 때나 집에 있을 때, 장소를 이동할 때, 친구와 함께 할 때에 앉아 있거나 누워 있는 것에 대한 질문입니다.

※ 예: 책상에 앉아 있기, 친구와 앉아 있기, 자동차·버스·기차를 이용해 이동하기, 책읽기, 글쓰기, 카드 놀이 하기, 텔레비전 보기, 게임 하기(닌텐도, 컴퓨터, 플레이스테이션), 인터넷 사용, 음악 감상 등

4-1. 평소 하루에 앉아 있거나, 누워 있는 시간이 몇 시간 입니까?

하루에 시간 분

5. 최근 1주일 동안 한 번에 적어도 10분 이상 걸었던 날은 며칠입니까? ☐ 일

※ 출퇴근 또는 등하교, 이동 및 운동을 위해 걷는 것을 모두 포함하여 대답해 주십시오.

5-1. 이러한 날 중 하루 동안 걷는 시간은 보통 얼마나 됩니까?

하루에 시간 분 88 88. 비해당(문항5/0일: 걷기운동 없음)

6. 최근 1년 동안 본인이 거주하고 있는 지역에서 운동을 할 수 있는 장소를 쉽게 찾을 수 있었습니까?

① 매우 쉬웠다

② 쉬운 편이었다

③ 어려운 편이었다

④ 매우 어려웠다

7. (지역) 최근 1달 동안 규칙적으로 운동을 하고 있습니까?

① 예

② 아니오

식생활

1. 최근 1주일 동안 아침식사를 한 날은 며칠입니까? ☐ 일
2. 가공식품에 '영양표시'를 알고 있습니까? ☐
 - ① 예 ② 아니오 (⇒ 3번 문항으로)
- ↳ 2-1. 가공식품을 사거나 고를 때, '영양표시'를 읽습니까? ☐
 - ① 예 ② 아니오 (⇒ 3번 문항으로)
 - ⑧ 비해당(문항2/②: 영양표시를 모름)
- ↳ 2-1-1. 영양표시 내용이 가공식품을 고르는데 영향을 미칩니까? ☐
 - ① 예 ② 아니오
 - ⑧ 비해당(문항2/②: 영양표시를 모름, 문항2-1/②: 영양표시를 읽지 않음)
3. (지역) 평소 덜 짜게 먹으려고 노력합니까? ☐
 - ① 전혀 노력하지 않는다
 - ② 거의 노력하지 않는다
 - ③ 가끔 노력한다
 - ④ 대체로 노력한다
 - ⑤ 항상 노력한다

비만 및 체중조절**1. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각합니까?**

- ① 매우 마른 편임
- ② 약간 마른 편임
- ③ 보통임
- ④ 약간 비만임
- ⑤ 매우 비만임

☐**2. 최근 1년 동안 몸무게를 조절하려고 노력한 적이 있습니까?**

- ① 몸무게를 줄이려고 노력했다
- ② 몸무게를 유지하려고 노력했다
- ③ 몸무게를 늘리려고 노력했다
- ④ 몸무게를 조절하기 위해 노력해 본 적 없다

☐

구강건강

1. 스스로 생각할 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각합니까?

- ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨

☐

2. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데 어려움이나 불편함을 느낍니까?
(※ 틀니를 사용하는 경우에는 틀니를 낀 상태에서 느끼는 상태를 말씀해 주십시오.)

☐

- ① 매우 불편하다
② 불편하다
③ 그저 그렇다
④ 별로 불편하지 않다
⑤ 전혀 불편하지 않다

3. 어제 하루 동안 다음 시기에 첫술질(잇솔질)을 했습니까?

3-1. 아침식사 후에	① 예 ② 아니오 ③ 어제 아침식사 하지 않음
3-2. 점심식사 후에	① 예 ② 아니오 ③ 어제 점심식사 하지 않음
3-3. 저녁식사 후에	① 예 ② 아니오 ③ 어제 저녁식사 하지 않음
3-4. 잠자기 전에	① 예 ② 아니오 ③ 어제 잠자지 않음

☐
☐
☐
☐

4. 최근 1년 동안 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 5번 문항으로)

☐


4-1. 진료를 받지 못한 가장 주된 이유는 무엇입니까?(한 가지만 선택)

☐
☐

- ① 경제적인 이유로
② 치과병의원(또는 보건소, 보건지소 등)이 너무 멀어서
③ 직장이나 학교를 비울 수 없어서
④ 거동이 불편해서 혹은 건강 문제 때문에
⑤ 아이를 봐줄 사람이 없어서
⑥ 다른 문제들에 비해서 덜 중요하다고 느껴서
⑦ 치과진료를 받기가 무서워서
⑧ 기타()

기
타

88. 비해당(문항4/②: 진료를 받지 못한 적이 없음)

88. 비해당

5. (지역) (만 50세 이상만 응답해 주십시오.) 현재 끼었다 뺏다 할 수 있는 틀니를 하고 있습니까?

☐

- ① 위아래 둘 다 있음 (→ 「정신건강」 1번 문항으로)
② 위쪽만 있음
③ 아래쪽만 있음
④ 아니오

⑧ 비해당(나이: 만 50세 미만)



5-1. (지역) (만 50세 이상만 응답해 주십시오.) 현재 틀니가 필요하다고 생각합니까?

☐

- ① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(나이: 만 50세 미만, 문항5/①: 위아래 둘 다 있음)

8. 비해당

정신건강

1. 하루에 보통 몇 시간 주무십니까? 시간시간

2. 평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?

- ① 대단히 많이 느낀다] (⇒ 2-1번 문항으로)
 ② 많이 느끼는 편이다
 ③ 조금 느끼는 편이다] (⇒ 3번 문항으로)
 ④ 거의 느끼지 않는다

2-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

③ 비해당(문항2/③, ④: 평소 스트레스를 조금 느끼거나 거의 느끼지 않음)

8. 비해당

3. 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 4번 문항으로)

3-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

③ 비해당(문항3/②: 2주 이상 슬프거나 절망감을 느낀 적이 없음)

8. 비해당

4. 지난 2주 동안 아래 나열되는 증상들에 얼마나 자주 시달렸습니까?

4-1. 일을 하는 것에 대한 흥미나 재미가 거의 없음	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
4-2. 가리אות는 느낌, 우울감 혹은 절망감	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
4-3. 잠들기 어렵거나 자꾸 깨어남, 혹은 너무 많이 잠	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
4-4. 피곤함, 기력이 저하됨	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
4-5. 식욕 저하 혹은 과식	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
4-6. 내 자신이 나쁜 사람이라는 느낌 혹은 내 자신을 실패자라고 느끼거나, 나 때문에 나 자신이란 내 가족이 불행하게 되었다는 느낌	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
4-7. 신문을 읽거나 TV를 볼 때 집중하기 어려움	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
4-8. 남들이 알아챌 정도로 거동이나 말이 느림 또는 반대로 너무 초조하고 안절부절하지 못해서 평소보다 많이 돌아다니고 서성거림	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
4-9. 나는 차라리 죽는 것이 낫겠다 등의 생각 혹은 어떤 면에서건 당신 스스로에게 상처를 주는 생각들	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일

5. 최근 1년 동안 정신적인 문제 때문에 방문, 전화, 인터넷을 통해 상담을 받아 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

【수면의 질】

※ 다음은 지난 1달(4주) 동안 당신의 일상적인 수면 습관에 관한 질문입니다. 지난 1달 동안 대부분의 일상에서 가장 적합한 답변에 응답해 주시기 바랍니다(반드시 모든 질문에 답하여 주시기 바랍니다).

1. **지난 1달 동안** 당신은 평소 몇 시에 잠자리에 들었습니까?

- ① 보통 오전 시 분에 잠자리에 든다
 ② 보통 오후 시 분에 잠자리에 든다

시 분

2. **지난 1달 동안** 당신은 밤에 잠자리에 들어가서 잠이 들기까지 보통 얼마나 오래 걸렸습니까?

시간 분이 걸린다

시 분

3. **지난 1달 동안** 당신은 평소 아침 몇 시에 일어났습니까?

- ① 보통 오전 시 분에 일어난다
 ② 보통 오후 시 분에 일어난다

시 분

4. **지난 1달 동안** 당신은 밤에 **실제로 잠잔** 시간은 얼마나 됩니까?(이것은 당신이 잠자리에서 보낸 시간과 다를 수 있습니다.)

하루 밤에 시간 분

시 분

※ 다음 각 문항에서 가장 적합한 응답을 하나만 고르십시오. 모든 질문에 응답해 주시기 바랍니다.

5. **지난 1달 동안** 당신은 아래의 이유로 잠자는데 얼마나 자주 문제가 있었습니까?

5-1. 취침 후 30분 이내에 잠들 수 없었다	①지난 한달 동안 없었다 (없다)	②한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)
5-2. 한밤중이나 새벽에 깼다	①지난 한달 동안 없었다 (없다)	②한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)
5-3. 화장실에 가려고 일어나야 했다	①지난 한달 동안 없었다 (없다)	②한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)
5-4. 편안하게 숨 쉴 수가 없었다	①지난 한달 동안 없었다 (없다)	②한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)
5-5. 기침을 하거나 시끄럽게 코를 골았다	①지난 한달 동안 없었다 (없다)	②한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)
5-6. 너무 춥다고 느꼈다	①지난 한달 동안 없었다 (없다)	②한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)
5-7. 너무 덥다고 느꼈다	①지난 한달 동안 없었다 (없다)	②한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)
5-8. 나쁜 꿈을 꾸었다	①지난 한달 동안 없었다 (없다)	②한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)
5-9. 통증이 있었다	①지난 한달 동안 없었다 (없다)	②한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)
5-10. 그 외에 다른 이유가 있다면, 기입해 주세요 (이유:) 지난 1달 동안 당신은 위에 기입한 이유들 때문에 잠자는데 얼마나 자주 어려움이 있었습니까?	①지난 한달 동안 없었다 (없다)	②한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)

이유

6. **지난 1달 동안** 당신은 전반적으로 수면의 질이 어느 정도라고 평가 하십니까?

- ① 매우 좋음 ② 상당히 좋음 ③ 상당히 나쁨 ④ 매우 나쁨

☐

7. **지난 1달 동안** 당신은 잠이 들기 위해 얼마나 자주 약을 복용했습니까? (처방약 또는 약국에서 구입한 약)

- ① 지난 한달 동안 없었다.
② 한 주에 1번보다 적게
③ 한 주에 1~2번 정도
④ 한 주에 3번 이상

☐

8. **지난 1달 동안** 당신은 운전하거나, 식사 때 혹은 사회활동을 하는 동안 얼마나 자주 졸음을 느꼈습니까?

- ① 지난 한달 동안 없었다.
② 한 주에 1번보다 적게
③ 한 주에 1~2번 정도
④ 한 주에 3번 이상

☐

9. **지난 1달 동안** 당신은 일에 열중하는데 얼마나 많은 문제가 있었습니까?

- ① 전혀 없었다
② 매우 조금 있었다
③ 다소 있었다
④ 매우 많이 있었다

☐

【치매】

1. 치매 상담 콜센터(☎1899-9988)가 있다는 것을 알고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 2-1번 문항으로)

☐


1-1. 치매 상담 콜센터(☎1899-9988)를 이용한 적이 있습니까?

- ① 예(→ 2-1번 문항으로) ② 아니오
③ 비해당(문항1/2: 치매 상담 콜센터가 있다는 것을 모름)

☐

8. 비해당

1-2. 치매 상담 콜센터(☎1899-9988)를 이용하지 않은 이유는 무엇입니까?

- ① 나에게 필요가 없어서
② 별로 도움이 되지 않을 것 같아서
③ 비용이 발생할 것 같아서
④ 개인정보가 노출될 것 같아서
⑤ 개인과 가족의 사생활을 외부에 알리고 싶지 않아서
⑥ 기타()

☐

기
타

8. 비해당

- ③ 비해당(문항 1/2: 치매 상담 콜센터가 있다는 것을 모름, 문항1-1/①: 치매 상담 콜센터를 이용한 적이 있음)

※ 다음은 귀하의 인지 기능에 대한 질문입니다. 질문을 잘 듣고 본인에게 해당되는 내용에 응답해 주시기 바랍니다.

2-1. **최근 1년 동안** 점점 더 자주 또는 더 심하게 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 만 50세 이상 3번 문항으로,
만 50세 미만 「예방접종」1번 문항으로)

☐

건강조사 참여 Energy, 지역건강 Synergy

2-2. 최근 1년 동안 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어져서 평소 잘 하던 집안일이나 일상생활에서의 일을 못한 적이 얼마나 자주 있습니까?(예: 요리, 청소, 약 복용, 운전, 공과금 납부 등)

- ① 항상
② 자주
③ 가끔
④ 거의 그런 적 없다
⑤ 전혀 없다
⑧ 비해당(문항2-1/②: 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적이 없음)

☐
8. 비해당

2-3. 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어진 것 때문에, 일상생활에서 얼마나 자주 도움이 필요했습니까?

- ① 항상
② 자주
③ 가끔
④ 거의 필요 없다
⑤ 전혀 필요 없다
⑧ 비해당(문항2-1/②: 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적이 없음)

☐
8. 비해당

2-4. 일상생활에서 도움이 필요할 때, 얼마나 자주 도움을 받을 수 있습니까?

- ① 항상
② 자주
③ 가끔
④ 거의 받을 수 없다
⑤ 전혀 받을 수 없다
⑧ 비해당(문항2-1/②: 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적이 없음, 문항2-3/④, ⑤: 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어진 것 때문에, 일상생활에 도움이 필요 없었음)

☐
8. 비해당

2-5. 최근 1년 동안 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어져서 직장생활이나 자원봉사, 사회활동을 하는데 얼마나 자주 지장이 있었습니까?

- ① 항상
② 자주
③ 가끔
④ 거의 없었다
⑤ 전혀 없었다
⑧ 비해당(문항2-1/②: 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적이 없음)

☐
8. 비해당

2-6. 귀하의 정신 혼란이나 기억력 감소 때문에 본인이나 다른 사람이 전문가의 상담을 받은 적이 있습니까?

- ① 예
② 아니오
⑧ 비해당(문항2-1/②: 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적이 없음)

☐
8. 비해당

3. (만 50세 이상 응답해 주십시오) 최근 1년 동안 치매선별검사를 받은 적이 있습니까?

- ① 예
② 아니오 (⇒ 「지역-정신건강」 1번 문항으로)
⑧ 비해당(나이: 만 50세 미만)

☐
8. 비해당

3-1. 최근 1년 동안 치매선별검사를 받은 장소는 어디입니까?

- ① 치매안심센터(보건소)
② 보건지소, 보건진료소
③ 병원
④ 기타 ()
⑧ 비해당(나이: 만 50세 미만, 문항3/②: 최근 1년 동안 치매선별검사를 받은 적이 없음)

☐
기
타
8. 비해당

【지역선택문항-정신건강】

1. (지역) 스트레스를 느끼는 가장 큰 원인은 무엇입니까?

- ① 경제적인 문제
 ② 질병문제
 ③ 가족문제
 ④ 진로문제
 ⑤ 대인관계(친척, 동료, 친구, 이웃 등)
 ⑥ 기타()
 ⑧ 비해당(문항2/③, ④: 평소 스트레스를 조금 느끼거나 거의 느끼지 않음)

☐기
타

8. 비해당

2. (지역) 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 가장 큰 원인은 무엇입니까?

- ① 경제적인 문제
 ② 질병문제
 ③ 가족문제
 ④ 진로문제
 ⑤ 대인관계(친척, 동료, 친구, 이웃 등)
 ⑥ 기타()
 ⑧ 비해당(문항3/②: 2주 이상 슬프거나 절망감을 느낀 적이 없음)

☐기
타

8. 비해당

【지역선택문항-치매】

1. (지역) (만 60세 이상만 응답해 주십시오.) 지금까지 살아오면서 치매선별검사를 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ⑧ 비해당(나이: 만 60세 미만)

☐

8. 비해당

예방접종

1. 최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

이환

※ 지금부터 우리나라 국민들이 많이 걸리는 질병에 대해서 질문하도록 하겠습니다. 질문을 잘 듣고 본인에게 해당되는 내용을 응답해 주시기 바랍니다.

【고혈압】

1. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 「당뇨병」1번 문항으로)

☐

1-1. 의사로부터 고혈압을 처음 진단받은 때는 언제입니까?

만 세

888. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

888. 비해당

1-2. 본인의 혈압은 잘 조절되고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐

8. 비해당

1-3. 혈압을 관리하기 위해 현재 치료를 받고 있습니까? 모두 응답해 주십시오.

1-3-1. 혈압약 복용	① 예 ⇒ 한 달에 일 ② 아니오
1-3-2. 비약물요법(운동, 식사요법)	① 예 ② 아니오

8 88 8. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

 한달에 일

2 00. 아니오

8 88. 비해당

☐ 8. 비해당

1-4. 고혈압을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오(※ 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외).

1-4-1. 병원	① 예 ② 아니오
1-4-2. 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소	① 예 ② 아니오

88. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐ 8. 비해당

☐ 8. 비해당

【당뇨병】

1. 본인의 혈당수치를 알고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

2. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 「뇌졸중(중풍)」1번 문항으로)

☐


2-1. 의사로부터 당뇨병을 처음 진단받은 때는 언제입니까?

 만 세

⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

2-2. 본인의 혈당은 잘 조절되고 있습니까?

① 예 ② 아니오

888. 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

2-3. 혈당을 관리하기 위해 현재 치료를 받고 있습니까? 모두 응답해 주십시오.

2-3-1. 인슐린 주사	① 예 ② 아니오
2-3-2. 당뇨병약(경구 혈당강하제)	① 예 ② 아니오
2-3-3. 비약물요법(운동, 식사요법)	① 예 ② 아니오

888. 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

2-4. 당뇨병을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까?

 모두 응답해 주십시오(※ 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료상
담은 제외).

2-4-1. 병의원	① 예 ② 아니오
2-4-2. 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소	① 예 ② 아니오

88. 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

2-5. 최근 1년 동안 당화혈색소 검사를 몇 번이나 했습니까?

① 4회 이상

② 3회

③ 2회

④ 1회

⑤ 측정 안함

⑥ 당화혈색소가 무엇인지 모름

⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

2-6. 최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 눈의 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 눈검사(안저검사)를 받은 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오

⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

2-7. 최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 스팩검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨 검사)를 한 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오

⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

8. 비해당

888. 비해당

8. 비해당

8. 비해당

8. 비해당

8. 비해당

8. 비해당

8. 비해당

8. 비해당

8. 비해당

【뇌졸중(중풍)】

1. 다음의 질문들은 귀하의 뇌졸중(중풍)에 대한 지식을 알아보기 위한 것입니다. 맞다고 생각하면 “예”, 아니라고 생각하면 “아니오”를 선택해 주십시오.

1-1. 갑자기 한쪽 얼굴, 팔, 다리에 힘이 빠진다	① 예 ② 아니오
1-2. 갑자기 말이 어눌해지거나, 다른 사람의 말을 이해하지 못한다	① 예 ② 아니오
1-3. 갑자기 한쪽 눈이나 시야의 반이 보이지 않거나, 물체가 두 개로 보인다	① 예 ② 아니오
1-4. 갑자기 어지럽거나 몸의 중심을 잡기 힘들다	① 예 ② 아니오
1-5. 갑자기 이제까지 경험하지 못한 심한 두통이 생긴다	① 예 ② 아니오

☐
☐
☐
☐
☐

2. 만약 누군가가 뇌졸중(중풍)의 증상을 보인다면, 가장 먼저 무엇을 해야 한다고 생각합니까?

- ① 병원(한방병원 제외)으로 데려간다
 ② 한방병원으로 데려간다
 ③ 119에 전화한다(구급차를 부른다)
 ④ 가족에게 연락한다
 ⑤ 기타()

☐

기
타

【심근경색증】

1. 다음의 질문들은 귀하의 심근경색증(심장발작)에 대한 지식을 알아보기 위한 것입니다. 맞다고 생각하면 “예”, 아니라고 생각하면 “아니오”를 선택해 주십시오.

1-1. 갑자기 턱, 목 또는 등쪽에 통증이나 답답함이 있다	① 예 ② 아니오
1-2. 갑자기 힘이 없으며, 어지럽고, 울렁거리거나 식은땀이 난다	① 예 ② 아니오
1-3. 갑자기 가슴에 통증이나 압박감 또는 짓누르는 느낌이 있다	① 예 ② 아니오
1-4. 갑자기 팔 또는 어깨에 통증이나 불편감이 있다	① 예 ② 아니오
1-5. 갑자기 숨이 찬다	① 예 ② 아니오

☐
☐
☐
☐
☐

2. 만약 누군가가 심근경색증의 증상을 보인다면, 가장 먼저 무엇을 해야 한다고 생각합니까?

- ① 병원(한방병원 제외)으로 데려간다
 ② 한방병원으로 데려간다
 ③ 119에 전화한다(구급차를 부른다)
 ④ 가족에게 연락한다
 ⑤ 기타()

☐

기
타

【지역선택문항-고혈압】

1. (지역) 고혈압에 대한 교육을 어디에서 받는 것이 좋습니까?

- ① 병의원
 ② 보건기관(보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소)
 ③ 거주지 내 공동이용 시설(주민센터, 마을회관, 경로당)
 ④ 학교나 직장
 ⑤ 기타()
 ⑧ 비해당(「고혈압」문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐기
타

8. 비해당

【지역선택문항-심뇌혈관질환 예방관리】

1. (지역) 심뇌혈관질환에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

2. (지역) '심뇌혈관질환 예방과 관리를 위한 9대 생활수칙'에 관한 홍보물(소책자, 동영상, 홍보물품)을 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 「지역-대사증후군」 1번 문항으로)

☐

2-1. (지역) '심뇌혈관질환 예방과 관리를 위한 9대 생활수칙'에 관한 홍보물(소책자, 동영상, 홍보물품)을 어떤 경로를 통해 보았습니까? 모두 응답해 주십시오.

2-1-1. 인터넷	① 예 ② 아니오
2-1-2. TV, 라디오, 옥외광고, 지하철 등	① 예 ② 아니오
2-1-3. 병의원	① 예 ② 아니오
2-1-4. 보건기관[보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소]	① 예 ② 아니오

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

8888. 비해당(문항2/②: 심뇌혈관질환 예방과 관리를 위한 9대 생활수칙에 관한 홍보물을 본 적이 없음)

【지역선택문항-대사증후군】

1. (지역) 대사증후군에 대한 내용을 보거나 들어 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

의료이용

1. 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 미포함)에 가고 싶을 때, 가지 못한 적이 있습니까?

① 예

② 아니오 (➡ 「사고 및 중독」 1번 문항으로)

--	--



1-1. 그런 적이 있다면, 다음 중 어떤 이유로 본인이 원하는 때 병의원에 가지 못했습니까?

(한 가지만 선택)

① 경제적인 이유로

② 병의원 등에 예약을 하기가 힘들어서

③ 교통편이 불편해서

④ 내가 갈 수 있는 시간에 병의원 등이 문을 열지 않아서

⑤ 병의원 등에서 오래 기다리기 싫어서

⑥ 증상이 가벼워서

⑦ 기타()

⑧ 비해당(문항1/②: 병의원(치과 미포함)에 가지 못한 적이 없음)

--	--

기
타

8. 비해당

사고 및 중독

1. 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까?

☐ 회

※ 음식물 섭취로 인한 식중독은 제외

2 0. 아니오

① 예 ➡ ☐ 회 ② 아니오 (➡ 「활동제한 및 삶의 질」 1-1번 문항으로)

※ 여러 번 발생했다면, 각각의 손상 및 사고중독에 대해 2~5번 문항을 반복합니다.

2. 이 사고 또는 중독은 언제 발생했습니까?

20 년 월

88 88. 비해당(문항1/② : 최근 1년 동안 사고나 중독이 발생한 적이 없음)

3. 이 사고 또는 중독은 어떻게 발생했습니까?

- ① 운수사고
 ② 추락
 ③ 낙상(미끄러짐 포함)
 ④ 부딪힘(충돌 포함)
 ⑤ 자상 및 관통상(찔림 포함)
 ⑥ 화상(전기, 열, 불로 인한)
 ⑦ 익수
 ⑧ 질식
 ⑨ 중독
 ⑩ 감전
 ⑪ 개 물림
 ⑫ 고양이 물림
 ⑬ 뱀 물림
 ⑭ 벌 쏘임
 ⑮ 기타()

88. 비해당(문항1/② : 최근 1년 동안 사고나 중독이 발생한 적이 없음)

4. 이 사고 또는 중독으로 입은 손상을 어디에서 치료를 받았습니까?

- ① 응급실
 ② 병의원 외래 이용
 ③ 병의원 병실입원
 ④ 기타()

⑧ 비해당(문항1/② : 최근 1년 동안 사고나 중독이 발생한 적이 없음)

5. 이 사고 또는 중독은 비의도적 사고였습니까? 아니면 본인이나 타인에 의해 의도적으로 발생한 것입니까?

- ① 비의도적 사고(불의의 사고)
 ② 의도적 자해
 ③ 다른 사람의 폭력

⑧ 비해당(문항1/② : 최근 1년 동안 사고나 중독이 발생한 적이 없음)

사고 및 중독 응답표

1회	2회	3회	4회	5회
20 년 월 88 88. 비해당	20 년 월 88 88. 비해당	20 년 월 88 88. 비해당	20 년 월 88 88. 비해당	20 년 월 88 88. 비해당
 기 타 88. 비해당	 기 타 88. 비해당	 기 타 88. 비해당	 기 타 88. 비해당	 기 타 88. 비해당
 기 타 8. 비해당	 기 타 8. 비해당	 기 타 8. 비해당	 기 타 8. 비해당	 기 타 8. 비해당
 8. 비해당	 8. 비해당	 8. 비해당	 8. 비해당	 8. 비해당

활동제한 및 삶의 질

※ 아래의 각 문항에서 오늘 귀하의 건강상태를 가장 잘 설명해주는 하나의 항목에 표시해 주십시오.

1-1. 운동능력

- ① 나는 걷는데 지장이 없다
- ② 나는 걷는데 다소 지장이 있다
- ③ 나는 종일 누워 있어야 한다

☐

1-2. 자기관리

- ① 나는 목욕을 하거나 옷을 입는데 지장이 없다
- ② 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입는데 다소 지장이 있다
- ③ 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입을 수가 없다

☐

1-3. 일상 활동(예: 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가활동)

- ① 나는 일상 활동을 하는데 지장이 없다
- ② 나는 일상 활동을 하는데 다소 지장이 있다
- ③ 나는 일상 활동을 할 수가 없다

☐

1-4. 통증/불편

- ① 나는 통증이나 불편감이 없다
- ② 나는 다소 통증이나 불편감이 있다
- ③ 나는 매우 심한 통증이나 불편감이 있다

☐

1-5. 불안/우울

- ① 나는 불안하거나 우울하지 않다
- ② 나는 다소 불안하거나 우울하다
- ③ 나는 매우 심하게 불안하거나 우울하다

☐

(지역) ※ 다음은 귀하의 삶에 대해 얼마나 만족하고 있는지를 알아보기 위한 질문입니다. 매우 만족하는 경우를 '10'으로, 매우 불만족하는 경우를 '1'로 생각하시고 다음 질문에 응답해 주십시오.

2. 모든 사항을 고려할 때, 최근 귀하의 삶에 (대체로) 어느 정도 만족합니까?

☐

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

매우 불만족

매우 만족

보건기관 이용

1. 최근 1년 동안 보건소(보건의원), 보건지소, 보건진료소를 이용한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

사회 물리적 환경

1. 현재 살고 있는 지역의 환경은 어떻다고 생각하십니까?

1-1. 대기	①매우좋다	②약간좋다	③보통이다	④약간나쁘다	⑤매우나쁘다
1-2. 수질	①매우좋다	②약간좋다	③보통이다	④약간나쁘다	⑤매우나쁘다
1-3. 토양 (쓰레기, 폐기물로 인한 오염)	①매우좋다	②약간좋다	③보통이다	④약간나쁘다	⑤매우나쁘다
1-4. 소음 진동	①매우좋다	②약간좋다	③보통이다	④약간나쁘다	⑤매우나쁘다
1-5. 녹지 환경(공원, 가로수 등)	①매우좋다	②약간좋다	③보통이다	④약간나쁘다	⑤매우나쁘다

☐☐☐☐☐

2. 현재 살고 있는 광역 시·도에서 얼마나 오래 살았습니까?

- ① 5년 미만
 ② 5-10년 미만
 ③ 10-15년 미만
 ④ 15-20년 미만
 ⑤ 20년 이상

☐

3. 현재 살고 있는 시·군·구에서 얼마나 오래 살았습니까?

- ① 5년 미만
 ② 5-10년 미만
 ③ 10-15년 미만
 ④ 15-20년 미만
 ⑤ 20년 이상

☐

교육 및 경제활동

1. 귀하께서는 **최근 1주일 동안** 수입을 목적으로 1시간 이상 일을 하거나, 18시간 이상 무급 가족 종사자로 일하신 적이 있습니까? 원래 일을 하고 있지만 일시 휴직 상태도 일을 하신 경우에 포함 됩니다.

① 예 ② 아니오

2. 귀하께서 종사하고 계신 직업은 무엇입니까? **일의 종류를 구체적으로 말씀해주십시오.**
(예를 들면, 은행에서 출납 일을 함, 건설현장에서 교통정리를 함, 벽지 도배, 내과질환진료 및 치료 등)

일의 종류		
직 업 분 류	① 관리자	② 전문가 및 관련종사자
	③ 사무종사자	④ 서비스종사자
	⑤ 판매종사자	⑥ 농·림·어업종사자
	⑦ 기능원 및 관련기능종사자	⑧ 장치, 기계조작 및 조립종사자
	⑨ 단순노무종사자	⑩ 군인(직업군인)
	⑪ 학생/재수생	⑫ 주부 ⑬ 무직

- 2-1. 귀하께서 하시는 일은 다음 중 어디에 해당됩니까?

(※ 문항 2번 응답보기 ①~⑩에 응답하신 분만 응답해 주십시오.)

- ① 고용주 및 자영업자(내 사업을 한다)
② 임금근로자(타인 또는 회사에 고용되어 보수를 받고 일한다)
③ 무급가족종사자(가족, 친척의 일을 돈을 받지 않고 돕는다)
⑧ 비해당(문항1/②: 최근 1주일 동안 일을 하지 않음, 문항2/⑪, ⑫, ⑬: 학생/재수생, 주부, 무직)

3. 귀하는 학교를 어디까지 다니셨습니까?

- ① 무학 (⇒ 4번 문항으로) ② 서당/한학 (⇒ 4번 문항으로) ③ 초등학교
④ 중학교 ⑤ 고등학교 ⑥ 2년/3년제 대학
⑦ 4년제 대학 ⑧ 대학원 이상

- 3-1. 귀하는 그 학교를 졸업하셨습니까? 졸업여부를 말씀해 주십시오.

- ① 졸업
② 수료
③ 중퇴
④ 재학/휴학 중
⑧ 비해당(문항3/①, ②: 무학, 서당/한학)

4. 귀하의 현재 혼인상태(사실혼 포함)는 다음 중 무엇에 해당합니까?

- ① 배우자 있음(같이 살고 있음)
② 이혼
③ 사별
④ 별거
⑤ 미혼

혈압측정(실체계측) 2차 (*CAPI 내 조사원 입력 사항)

1. 미측정 이유

- ① 측정 ② 제외대상 ③ 계측거부 ④ 기타()
 ⑧ 비해당(「혈압측정(신체계측) 1차」문항1/②, ③, ④: 제외대상, 계측거부, 기타의 이유로 미측정)

☐

기
타

8. 비해당

2. 혈압 측정 팔

- ① 오른쪽 ② 왼쪽
 ⑧ 비해당(「혈압측정(신체계측) 1차」문항1/②, ③, ④: 제외대상, 계측거부, 기타의 이유로 미측정,
 「혈압측정(신체계측) 2차」문항1/②, ③, ④: 제외대상, 계측거부, 기타의 이유로 미측정)

☐

8. 비해당

3. 측정 전 5분 안정

- ① 예 ② 아니오
 ⑧ 비해당(「혈압측정(신체계측) 1차」문항1/②, ③, ④: 제외대상, 계측거부, 기타의 이유로 미측정,
 「혈압측정(신체계측) 2차」문항1/②, ③, ④: 제외대상, 계측거부, 기타의 이유로 미측정)

☐

8. 비해당

4. 혈압측정 값 입력

수축기(최고혈압/SYS) mmHG

이완기(최저혈압/DIA) mmHG

888 888. 비해당(「혈압측정(신체계측) 1차」문항1/②, ③, ④: 제외대상, 계측거부, 기타의 이유로 미측정,
 「혈압측정(신체계측) 2차」문항1/②, ③, ④: 제외대상, 계측거부, 기타의 이유로 미측정)

수축기

mmHG

이완기

mmHG

888 888. 비해당

제 4 부 부록

Ⅱ. 가구조사표



CHS

Community Health Survey

다음은 2018년 지역사회건강조사 가구조사표(인천권역)입니다. ➔

2018년 지역사회건강조사 가구명부

시도 보건소 표본지점 가구

번호 :

가구현황

주소	(표본지점 주소)		집전화 ☎ () -	총 방문횟수	() 회
	(이하 상세주소)			방문 1차	2018. . .
				방문 2차	2018. . .
				방문 3차	2018. . .

가 구 구 분 ☐ 본표본가구 ☐ 예비표본가구(본표본가구 번호:) 가구대체 발생시 본표본 가구번호를 기입합니다.

성인거주여부 ☐ 성인거주 ☐ 성인미거주 ☐ 모름 성인기준 : 주민등록상 생일로 1999. 7.31 이전 출생자

조사적합여부 ☐ 적합 ➡ 가구원정보 기입 ☐ 부적합 ➡ 조사종료 & 가구대체 (사유:)

가구원현황

‘가구조사’ 기입란은 가구조사를 한 대표 가구원 1인만 ☑하십시오.

가구원 번호	가구원 성명	성별	주민등록상 생년월일	가구주와의 관계	휴대전화	조사수행 여부	미수행 사유	가구 조사
01		남 / 여			- -	Y / N		☐
02		남 / 여			- -	Y / N		☐
03		남 / 여			- -	Y / N		☐
04		남 / 여			- -	Y / N		☐
05		남 / 여			- -	Y / N		☐
06		남 / 여			- -	Y / N		☐
07		남 / 여			- -	Y / N		☐
08		남 / 여			- -	Y / N		☐
09		남 / 여			- -	Y / N		☐
10		남 / 여			- -	Y / N		☐
11		남 / 여			- -	Y / N		☐
12		남 / 여			- -	Y / N		☐

조사원 성명:

가구완료

조 사 인 원 : 만 19세 이상 성인 ()명 중 ()명 조사

조 사 완 료 : 만 19세 이상 성인을 모두 조사하였습니까? ☐예 ☐아니오

가 구 조 사 : 가구 대표1명만 가구조사를 실시하였습니까? ☐예 ☐아니오

답 레 품 전 달 : 조사인원 수만큼 답례품을 제공하였습니까? ☐예 ☐아니오

가구선정통지서 : 이 가구는 가구선정통지서를 받았습니까? ☐예 ☐아니오

조 사 상 황 : 이 가구에서 처음 만난 조사대상자가 조사 거부했습니까? ☐예 ☐아니오

거 부 반 응 : 조사 거부 시 반응은 어떠했습니까?
☐매우 화냄 ☐화냄 ☐보통 ☐별로 화내지 않음 ☐전혀 화내지 않음

거 부 이 유 : 조사 거부 이유는 무엇입니까?
☐바빠다 ☐귀찮다 ☐이유없음(무조건) ☐기타()

설 득 방 법 : 조사 거부 시 어떻게 설득을 하였습니까? (한 가지만 선택)
☐조사목적 재설명을 통해서 ☐지속적인 재방문을 통해서
☐책임대학교 담당자 또는 보건소담당자의 도움을 통해서
☐통·반리장의 협조를 통해서 ☐기타()

2018년 지역사회건강조사 1

가구조사

※ 가구대표 1명만 가구조사에 참여해 주시기 바랍니다.

1. 세대 유형은 다음 중 무엇에 해당합니까?

1 세 대	☐ 1. 1인 가구	☐ 2. 응답자+미혼형제자매	☐ 7. 기타: 상기를 제외한 모든 1세대 가구
	☐ 3. 부부(응답자+배우자)	☐ 4. 부부+기타 친인척	
	☐ 5. 부부+미혼형제자매	☐ 6. 응답자+기타 친인척	
2 세 대	☐ 8. 부부+미혼자녀	☐ 9. 부부+양친	☐ 10. 조부모+미혼 손자녀
	☐ 11. 편부+미혼자녀	☐ 12. 부부+편부/편모	☐ 13. 편조부/편조모+미혼 손자녀
	☐ 14. 편모+미혼자녀	☐ 15. 부부+자녀+부부의 형제 또는 자매	☐ 16. 기타: 상기를 제외한 모든 2세대 가구
3 세 대	☐ 17. 부부+미혼자녀+양친		
	☐ 18. 부부+미혼자녀+편부/편모		
	☐ 19. 기타 상기를 제외한 모든 3세대 이상 가구		

2. 귀 가구는 현재 기초생활 수급자(구. 생활보호대상자 혹은 영세민)입니까?

- ① 그렇다
② 지금은 아니지만, 과거에 수급자였던 적이 있다
③ 아니다

3. 임금, 부동산 소득, 연금, 이자, 정부 보조금, 친척이나 자녀들의 용돈 등 모든 수입을 합쳐 최근 1년 동안 가구의 총 소득은 대략 얼마입니까? 만일 연간 소득을 대답하기 어려운 경우 월 평균 액수를 말씀해 주십시오.

(기준기간)

(소득액)

- ① 연 □□□□ 만원
- ② 월 □□□□ 만원

4. 다음 중 최근 1년 동안 귀하의 식생활 형편을 가장 잘 나타낸 것은 어느 것입니까?

- ① 우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다
- ② 우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다
- ③ 경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다
- ④ 경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다

5. 귀 가족 중에 의사로부터 치매를 진단받은 환자가 있습니까?

(※ 가족: 가구주 기준으로 부모(배우자 부모 포함), 배우자, 형제, 자매, 본인, 자녀)

- ① 예 ② 아니오(➡ 가구조사 종료)

5-1. 있다면, 누구입니까?(※ 가구주 기준에서 응답)

- ① 부모(배우자 부모 포함)
- ② 배우자
- ③ 형제 또는 자매
- ④ 본인(기각주)
- ⑤ 자녀
- ⑧ 비해당(문항5/②: 가족 중에 의사로부터 치매를 진단받은 환자가 없음)

--	--	--

--	--

□ (연/월)

[illegible]

--	--

--	--

--	--

8. 비해당

5-2. 귀 가구는 의사로부터 치매를 진단받은 환자와 함께 거주하고 있습니까?

- ① 예 (⇒ 7번 문항으로) ② 아니오 (⇒ 5-3번 문항으로)
 ⑧ 비해당(문항5/②: 가족 중에 의사로부터 치매를 진단받은 환자가 없음)

☐

8. 비해당

5-3. 함께 거주하지 않는다면, 치매환자는 어디에서 거주하고 있습니까?

- ① 요양 시설에 거주 (⇒ 6번 문항으로)
 ② 다른 가족과 함께 거주 (⇒ 7번 문항으로)
 ③ 혼자 거주 (⇒ 7번 문항으로)
 ④ 기타() (⇒ 7번 문항으로)
 ⑧ 비해당(문항5/②: 가족 중에 의사로부터 치매를 진단받은 환자가 없음.
 문항5-2/①: 치매환자 동거하고 있음)

☐

8. 비해당

6. (* 치매환자가 시설에서 거주할 경우) 거주 비용(경비)을 주로 지원하는 분은 치매환자와 관계가 어떻게 됩니까?

- ① 부모(배우자 부모 포함)
 ② 배우자
 ③ 형제 또는 자매
 ④ 자녀
 ⑤ 친척
 ⑥ 치매환자(본인)
 ⑦ 외부지원기관(보험, 기부금, 공공 보조금)
 ⑧ 비해당(문항5/②: 가족 중에 의사로부터 치매를 진단받은 환자가 없음, 문항5-2/①: 치매환자 동거하고 있음, 문항5-3/②③④: 다른 가족과 함께 거주하거나 혼자 거주하거나, 기타 등)

☐

8. 비해당

7. (* 치매환자가 시설 외에 거주할 경우) 가족 중 치매 환자를 주로 돌보는 분이 계십니까?

- ① 예
 ② 아니오(⇒ 8번 문항으로)
 ⑧ 비해당(문항5/②: 가족 중에 의사로부터 치매를 진단받은 환자가 없음,
 문항5-3/①: 요양시설에 거주)

☐

8. 비해당



7-1. 있다면, 주로 돌보는 분은 치매환자와의 관계가 어떻게 됩니까?

- ① 부모(배우자 부모 포함)
 ② 배우자
 ③ 형제 또는 자매
 ④ 자녀
 ⑤ 친척
 ⑧ 비해당(문항5/②: 가족 중에 의사로부터 치매를 진단받은 환자가 없음,
 문항5-3/①: 요양시설에 거주, 문항7/②: 가족 중에 치매환자를 주로 돌보는 사람이 없음)

☐

8. 비해당

8. 치매환자로 인해 가장 부담스러운 점은 무엇입니까?

- ① 경제적 부담
 ② 심리정서적 부담
 ③ 육체적 부담
 ④ 시간적 부담
 ⑤ 사회적 편견에 대한 부담
 ⑧ 비해당(문항5/②: 가족 중에 의사로부터 치매를 진단받은 환자가 없음)

☐

8. 비해당



지역사회건강조사
Community Health Survey

문의 : 질병관리본부 만성질환관리과
☎ 043-719-7385 / 7391
7397~7399

제 4 부 부록

Ⅲ. 지표정의



지표정의

1. 건강행태

가. 흡연

(1) 현재흡연율

지표정의		평생 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람으로서 현재 흡연하는 사람(“매일 파움” 또는 “가끔 파움”)의 분율
관련문항		1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까? ① 예 ② 아니오
		2. 현재 담배를 파웁니까? ① 매일 파웁 → 2-1-1. 하루 평균 흡연량은 몇 개비 입니까? □□□개비 ② 가끔 파웁 → 2-2-1. 최근 1달간 흡연일 수는 며칠입니까? □□일 → 2-2-2. 흡연하는 날 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 ③ 과거에는 파웠으나 현재 파우지 않음 → 2-3-1. 과거흡연 기간은 얼마입니까? □□년 □□개월 → 2-3-2. 과거 담배를 파울 때 하루 평균 흡연량은 몇 개비 입니까? □□□개비 → 2-3-3. 담배를 완전히 끊은 지 얼마나 되었습니까? ① 1년 미만 ② 1년-5년 미만 ③ 5년-10년 미만 ④ 10년-15년 미만 ⑤ 15년-20년 미만 ⑥ 20년 이상
산출식	분자	평생 5갑(100개비) 이상 파운 사람 중에서 현재흡연자(“매일 파움” 또는 “가끔 파움”)의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 남자 현재흡연율

지표정의		평생 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람으로서 현재 흡연하는 남자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 분율
관련문항		1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까? ① 예 ② 아니오 2. 현재 담배를 피웁니까? ① 매일 피움 → 2-1-1. 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 ② 가끔 피움 → 2-2-1. 최근 1달간 흡연일 수는 며칠입니까? □□일 → 2-2-2. 흡연하는 날 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음 → 2-3-1. 과거흡연 기간은 얼마입니까? □□년 □□개월 → 2-3-2. 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 → 2-3-3. 담배를 완전히 끊은 지 얼마나 되었습니까? ① 1년 미만 ② 1년-5년 미만 ③ 5년-10년 미만 ④ 10년-15년 미만 ⑤ 15년-20년 미만 ⑥ 20년 이상
산출식	분자	평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수×100
	분모	남자 조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(3) 매일흡연자의 하루 평균 흡연량

지표정의		평생 담배 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람으로서 매일 흡연하는 사람의 하루 평균 흡연량
관련문항		1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까? ① 예 ② 아니오
		2. 현재 담배를 피웁니까? ① 매일 피움 → 2-1-1. 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 ② 가끔 피움 → 2-2-1. 최근 1달간 흡연일 수는 며칠입니까? □□일 → 2-2-2. 흡연하는 날 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음 → 2-3-1. 과거흡연 기간은 얼마입니까? □□년 □□개월 → 2-3-2. 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 → 2-3-3. 담배를 완전히 끊은 지 얼마나 되었습니까? ① 1년 미만 ② 1년-5년 미만 ③ 5년-10년 미만 ④ 10년-15년 미만 ⑤ 15년-20년 미만 ⑥ 20년 이상
산출식	분자	하루 평균 흡연개비수의 총 합
	분모	평생 5갑(100개비) 이상 피운 매일 흡연자 수
단위		개비
조사주기		1년

(4) 현재흡연자의 금연시도율

지표정의		현재흡연자 중 최근 1년 동안 담배를 끊고자 24시간 이상 금연을 시도한 사람의 분율
관련문항		1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까? ① 예 ② 아니오
		2. 현재 담배를 피웁니까? ① 매일 피움 → 2-1-1. 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 ② 가끔 피움 → 2-2-1. 최근 1달간 흡연일 수는 며칠입니까? □□일 → 2-2-2. 흡연하는 날 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음 → 2-3-1. 과거흡연 기간은 얼마입니까? □□년 □□개월 → 2-3-2. 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 → 2-3-3. 담배를 완전히 끊은 지 얼마나 되었습니까? ① 1년 미만 ② 1년-5년 미만 ③ 5년-10년 미만 ④ 10년-15년 미만 ⑤ 15년-20년 미만 ⑥ 20년 이상
		3. 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 있습니까? ① 최근 1년간 금연한 적이 있다. ② 과거에는 있었지만, 최근 1년간 없다 ③ 금연한 적이 없다
산출식	분자	최근 1년 동안 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 사람의 수×100
	분모	현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수
단위		%
조사주기		1년

(5) 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률

지표정의		현재흡연자 중 1개월 내에 금연할 계획이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까? ① 예 ② 아니오 2. 현재 담배를 피웁니까? ① 매일 파움 → 2-1-1. 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 ② 가끔 파움 → 2-2-1. 최근 1달간 흡연일 수는 며칠입니까? □□일 → 2-2-2. 흡연하는 날 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음 → 2-3-1. 과거흡연 기간은 얼마입니까? □□년 □□개월 → 2-3-2. 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 → 2-3-3. 담배를 완전히 끊은 지 얼마나 되었습니까? □□년 □□개월 ① 1년 미만 ② 1년-5년 미만 ③ 5년-10년 미만 ④ 10년-15년 미만 ⑤ 15년-20년 미만 ⑥ 20년 이상 3. 앞으로 담배를 끊을 계획이 있습니까? ① 1개월 안에 금연할 계획이 있다 ② 6개월 안에 금연할 계획이 있다 ③ 6개월 이내는 아니지만 언젠가는 금연할 생각이 있다 ④ 현재로서는 전혀 금연할 생각이 없다
	산출식	분자 1개월 내 금연계획이 있는 사람의 수×100 분모 현재흡연자(“매일 파움” 또는 “가끔 파움”) 수
	단위	%
조사주기		1년

(6) 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률

지표정의		최근 1주일 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 본인을 제외한 가족 중 가정의 실내에서 일상적으로 담배를 피우는 분이 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-1. 최근 1주일 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1주일 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적 있는 사람의 수×100
	분모	현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수
단위		%
조사주기		1년

(7) 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률

지표정의		최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 ③ 직장에 다니지 않음(일을 하지 않음)
산출식	분자	최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수×100
	분모	일을 하고 있는 현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수
단위		%
조사주기		1년

(8) 현재비흡연자의 공공장소 간접흡연 노출률

지표정의		공공장소에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 경험이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 공공장소(버스/택시 정거장, 길거리, 음식점, 유흥업소, PC 방 등)에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 경험이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	공공장소에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 경험이 있는 사람의 수×100
	분모	현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수
단위		%
조사주기		2년

(9) 효과적인 금연프로그램

지표정의		효과적인 금연 프로그램
관련문항		1. 가장 효과적인 금연 프로그램은 무엇이라고 생각합니까? ① 공익광고(TV, 라디오, 포스터 등) ② 금연교육 ③ 금연클리닉 ④ 금연상담전화
산출식	분자	응답보기별 응답자 수×100
	분모	평생 5갑 (100개비) 이상 피운 흡연자 수
단위		보기별 %
조사주기		1년

나. 음주

(1) 월간음주율

지표정의		최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 음주한 사람의 분율
관련문항		1. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
		2. 최근 1년 동안 술을 마신 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
		2-1. 술을 얼마나 자주 마십니까? ① 한 달에 1번 미만 ② 한 달에 1번 정도 ③ 한 달에 2-4번 ④ 일주일에 2-3번 정도 ⑤ 일주일에 4번 이상
산출식	분자	최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 연간음주자의 고위험음주율

지표정의		최근 1년 동안 음주한 사람 중에서 남자는 한 번의 술자리에서 7잔 이상(또는 맥주 5캔 정도), 여자는 5잔 이상(또는 맥주 3캔 정도)을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 술을 마신 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-1. 술을 얼마나 자주 마십니까? ① 한 달에 1번 미만 ② 한 달에 1번 정도 ③ 한 달에 2~4번 정도 ④ 일주일에 2~3번 정도 ⑤ 일주일에 4번 이상 1-2. 한 번에 술을 얼마나 마십니까?(※ 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단, 캔 맥주 1개(355cc)는 맥주 1.6잔과 같습니다) ① 1~2잔 ② 3~4잔 ③ 5~6잔 ④ 7~9잔 ⑤ 10잔 이상
산출식	분자	최근 1년 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔)이상을 주 2회 이상 마신 적이 있는 사람의 수×100
	분모	최근 1년 동안 음주한 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(3) 연간 음주폐해 경험률

지표정의		최근 1년 동안 타인의 음주로 인하여 소란, 폭행, 성추행, 작업 또는 일상생활 중 사고(몸을 다침), 음주운전사고 등을 경험한 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 타인의 음주로 인하여 소란, 폭행, 성추행, 작업 또는 일상생활 중 사고(몸을 다침), 음주운전 사고 등을 경험한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 타인의 음주로 인하여 소란, 폭행, 성추행, 작업 또는 일상생활 중 사고(몸을 다침), 음주운전 사고 등을 경험한 적이 있는 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

다. 안전의식

(1) 운전자석 안전벨트 착용률

지표정의		자동차 운전 시 안전벨트를 항상 착용하는 사람의 분율
관련문항		1. 자동차를 운전을 합니까? ① 예 ② 아니오
		1-1. 운전할 때 안전벨트를 맵니까? ① 전혀 매지 않는다 ② 거의 매지 않는 편이다 ③ 가끔 매는 편이다 ④ 대체로 매는 편이다 ⑤ 항상 맨다
산출식	분자	자동차 운전 시 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수×100
	분모	자동차 운전자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률

지표정의		승용차나 택시 앞좌석에 탈 때 안전벨트를 항상 착용하는 사람의 분율
관련문항		1. 다른 사람이 운전하는 자동차나 택시 앞좌석에 탈 때 안전벨트를 맵니까? ① 앞좌석에 타지 않는다 ② 전혀 매지 않는다 ③ 가끔 매는 편이다 ④ 대체로 매는 편이다 ⑤ 항상 맨다
산출식	분자	다른 사람이 운전하는 승용차나 택시 앞좌석에 탈 때 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수×100
	분모	동승차량 앞좌석 탑승자 수
단위		%
조사주기		1년

(3) 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률

지표정의		승용차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 항상 착용하는 사람의 분율
관련문항		1. 다른 사람이 운전하는 자동차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 맵니까? ① 뒷좌석에 타지 않는다 ② 전혀 매지 않는다 ③ 가끔 매는 편이다 ④ 대체로 매는 편이다 ⑤ 항상 맨다
산출식	분자	다른 사람이 운전하는 승용차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수×100
	분모	동승차량 뒷좌석 탑승자 수
단위		%
조사주기		1년

(4) 연간 음주음전 경험률(자동차 또는 오토바이)

지표정의		최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 사람의 분율
관련문항		1. 자동차를 운전을 합니까? ① 예 ② 아니오 1-1. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자동차를 운전한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 2. 오토바이를 운전을 합니까? ① 예 ② 아니오 2-1. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 오토바이를 운전한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 적이 있는 사람의 수×100
	분모	자동차 또는 오토바이 운전자 수
단위		%
조사주기		1년

라. 신체활동

(1) 걷기 실천율

지표정의		최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1주일 동안 한 번에 적어도 10분 이상 걸었던 날은 며칠입니까? ※출퇴근 또는 등하교, 이동 및 운동을 위해 걷는 것을 모두 포함하여 대답해 주십시오. ☐일 1-1. 이러한 날 중 하루 동안 걷는 시간은 보통 얼마나 됩니까? 하루에 시간 분
산출식	분자	최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 지역사회 내 운동시설 접근율

지표정의		최근 1년 동안 본인이 거주하고 있는 지역에서 운동을 할 수 있는 장소를 쉽게 찾을 수 있다고 응답한 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 본인이 거주하고 있는 지역에서 운동을 할 수 있는 장소를 쉽게 찾을 수 있었습니까? ① 매우 쉬웠다 ② 쉬운 편이었다 ③ 어려운 편이었다 ④ 매우 어려웠다
산출식	분자	최근 1년 동안 본인이 거주하고 있는 지역에서 운동을 할 수 있는 장소를 찾기 "매우 쉬웠다" 또는 "쉬운 편이었다"에 응답한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

마. 식생활

(1) 아침결식 예방인구비율

지표정의		최근 1주일 동안 아침식사를 주 5회 이상 먹은 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 1주일 동안</u> 아침식사를 한 날은 며칠입니까? ☐ 일
산출식	분자	최근 1주일 동안 아침식사를 5~7일 먹은 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 영양표시 활용률

지표정의		영양표시 내용이 가공식품을 사거나 고를 때 영향을 미친다고 응답한 사람의 분율
관련문항		1. ‘영양표시’를 알고 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-1. 가공식품을 사거나 고를 때 ‘영양표시’를 읽습니까? ① 예 ② 아니오 1-2. 영양표시 내용이 가공식품을 사거나 고르는데 영향을 미칩니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	영양표시 내용이 가공식품을 사거나 고를 때 영향을 미친다고 응답한 사람의 수×100
	분모	가공식품을 사거나 고를 때 영양표시를 읽는 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(3) 저염식 실천 노력 경험률

지표정의		'평소 덜 짜게 먹으려고 "항상" 또는 "대체로" 노력한다고 응답한 사람의 분율
관련문항		1. 평소 덜 짜게 먹으려고 노력합니까? ① 전혀 노력하지 않는다 ② 거의 노력하지 않는다 ③ 가끔 노력한다 ④ 대체로 노력한다 ⑤ 항상 노력한다
산출식	분자	평소 덜 짜게 먹으려고 "항상 노력한다" 또는 "대체로 노력한다"에 응답한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

바. 비만 및 체중조절

(1) 비만율(자가보고)

지표정의		체질량지수
관련문항		1. 현재 본인의 키는 얼마입니까? □□□.□cm 2. 현재 본인의 몸무게는 얼마입니까? □□□.□kg
산출식	분자	체질량지수(kg/m ²)가 25 이상인 사람의 수×100 - 저체중 = BMI<18.5 인 사람의 수×100 - 정상 = 18.5≤BMI<25 인 사람의 수×100 - 비만(비만인구율) = BMI≥25 인 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 주관적 비만인지율

지표정의		주관적으로 “약간 비만” 또는 “매우 비만”이라고 생각하는 사람의 분율
관련문항		1. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각합니까? ① 매우 마른 편임 ② 약간 마른 편임 ③ 보통임 ④ 약간 비만임 ⑤ 매우 비만임
산출식	분자	“약간 비만임” 또는 “매우 비만임”에 응답한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(3) 연간 체중조절 시도율

지표정의		최근 1년 동안 체중을 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 노력했던 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 몸무게를 조절하려고 노력한 적이 있습니까? ① 몸무게를 줄이려고 노력했다 ② 몸무게를 유지하려고 노력했다 ③ 몸무게를 늘리려고 노력했다 ④ 몸무게를 조절하기 위해 노력해본 적 없다
산출식	분자	최근 1년 동안 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 했던 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

사. 구강건강

(1) 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율

지표정의		주관적으로 구강건강이 나쁘다고 인식하는 사람의 분율
관련문항		1. 스스로 생각할 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각합니까? ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨
산출식	분자	“나쁨” 또는 “매우 나쁨”에 응답한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 저작불편호소율(65세 이상)

지표정의		현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는데 불편하다고 인식하는 65세 이상 사람의 분율
관련문항		1. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데 어려움이나 불편함을 느끼니까? (※틀니를 사용하는 경우에는, 틀니를 낀 상태에서 느끼는 상태를 말씀해 주십시오) ① 매우 불편하다 ② 불편하다 ③ 그저 그렇다 ④ 별로 불편하지 않다 ⑤ 전혀 불편하지 않다
산출식	분자	“매우 불편하다” 또는 “불편하다”에 응답한 사람의 수×100
	분모	65세 이상 조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(3) 어제 아침식사 후 칫솔질 실천율

지표정의		아침식사 후 칫솔질 한 사람의 분율
관련문항		1. 어제 하루 동안 다음 시기에 칫솔질(잇솔질)을 했습니까? 아침 식사 후에 ① 예 ② 아니오 ③ 어제 아침식사 하지 않음
산출식	분자	아침식사 후 칫솔질 한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(4) 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율

지표정의		점심식사 후 칫솔질 한 사람의 분율
관련문항		1. <u>어제 하루 동안</u> 다음 시기에 칫솔질(잇솔질)을 했습니까? 점심 식사 후에 ① 예 ② 아니오 ③ 어제 점심식사 하지 않음
산출식	분자	점심식사 후 칫솔질 한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(5) 어제 저녁식사 후 칫솔질 실천율

지표정의		저녁식사 후 칫솔질 한 사람의 분율
관련문항		1. <u>어제 하루 동안</u> 다음 시기에 칫솔질(잇솔질)을 했습니까? 저녁 식사 후 ① 예 ② 아니오 ③ 어제 저녁식사 하지 않음
산출식	분자	저녁식사 후 칫솔질 한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(6) 어제 잠자기 전 칫솔질 실천율

지표정의		잠자기 전 칫솔질 한 사람의 분율
관련문항		1. <u>어제 하루 동안</u> 다음 시기에 칫솔질(잇솔질)을 했습니까? 잠자기 전에 ① 예 ② 아니오 ③ 어제 잠자지 않음
산출식	분자	잠자기 전 칫솔질 한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(7) 연간 치과진료 미치료율

지표정의		최근 1년 동안 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

아. 정신건강

(1) 스트레스 인지율

지표정의		평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이” 또는 “많이” 느끼는 사람의 분율
관련문항		1. 평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까? ① 대단히 많이 느낀다 ② 많이 느끼는 편이다 ③ 조금 느끼는 편이다 ④ 거의 느끼지 않는다
산출식	분자	평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이 느낀다” 또는 “많이 느끼는 편이다”에 응답한 사람의 수 ×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 우울감 경험률

지표정의		최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감(슬픔이나 절망감 등)을 경험한 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 1년 동안</u> 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 슬픔이나 절망감을 느낀 적이 있는 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(3) 평생 치매선별검사 수검률(≥ 60)

지표정의		평생동안 치매 선별검사를 받은 적이 있는 60세 이상 사람의 분율
관련문항		1. 지금까지 살아오면서 치매선별검사를 받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	평생동안 치매 선별검사를 받은 적이 있는 사람의 수×100
	분모	60세 이상 조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

2. 예방접종 및 검진

(1) 연간 인플루엔자 예방접종률

지표정의		최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있습니까?</u> ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

3. 이환

(1) 고혈압 진단 경험률(≥30)

지표정의		의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	의사에게 고혈압을 진단 받은 사람의 수×100
	분모	30세 이상 조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30)

지표정의		의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람으로 현재 혈압조절약을 한 달에 20일 이상 복용한 분율
관련문항		1. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
		1-1. 현재 치료를 받고 있습니까? ① 예 ② 아니오
		1-2. 혈압을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까? 모두 응답 해 주십시오. 혈압약 복용 ① 예→한 달에 □□일 ② 아니오 비약물요법 (운동, 식사요법) ① 예 ② 아니오
산출식	분자	현재 혈압조절약을 “한 달에 20일 이상 복용”하고 있는 사람의 수×100
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(3) 고혈압 관리교육 이수율(≥ 30)

지표정의		의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람 중 고혈압 관리에 관한 교육을 받은 사람의 비율
관련문항		1. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
		2. 고혈압을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모든 응답해 주십시오(※단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외) 병의원 ① 예 ② 아니오 한방병원 ① 예 ② 아니오 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소 ① 예 ② 아니오
산출식	분자	고혈압 관리 교육을 받은 사람의 수×100
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(4) 고혈압 관리교육 장소선호도(≥ 30)

지표정의		고혈압 관리교육 희망 장소
관련문항		1. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
		2. 고혈압에 대한 교육을 어디에서 받는 것이 좋습니까? ① 병의원 ② 보건기관(보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소) ③ 거주지 내 공동이용 시설(주민센터, 마을회관, 경로당) ④ 학교나 직장 ⑤ 기타()
산출식	분자	응답보기별 응답자 수×100
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위		%
조사주기		2년

(5) 당뇨병 진단 경험률(≥30)

지표정의		의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	의사에게 당뇨병을 진단 받은 사람의 수×100
	분모	30세 이상 조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(6) 당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥30)

지표정의		의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 혈당을 관리하기 위해 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구혈당강하제)을 치료 받고 있는 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
		1-2. 현재 치료를 받고 있습니까? ① 예 ② 아니오
		1-3. 혈당을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오.
		인슐린 주사 ① 예 ② 아니오 당뇨병 약(경구 혈당강하제) 복용 ① 예 ② 아니오 비약물요법(운동, 식사요법) ① 예 ② 아니오
산출식	분자	현재 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구용 혈당강하제)을 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 사용한다고 응답한 사람의 수×100
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(7) 당뇨병 관리교육 이수율(≥30)

지표정의		의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 당뇨병 관리에 관한 교육을 받은 사람의 분율
관련문항	1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오	
	2. 당뇨병을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오(※단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외) 병의원 ① 예 ② 아니오 한방병의원 ① 예 ② 아니오 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소 ① 예 ② 아니오	
산출식	분자	당뇨병 관리 교육을 받은 사람의 수×100
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(8) 연간 당뇨병성 안질환 합병증 검사(안저검사) 수진율(≥30)

지표정의		의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 최근 1년 동안 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 분율
관련문항	1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오	
	1-2. <u>최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 눈의 합병증이 발생했는지</u> 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오	
산출식	분자	최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수×100
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(9) 연간 당뇨병 신장질환 합병증 검사(미세단백뇨검사) 수진율(≥30)

지표정의		의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 최근 1년 동안 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-2. 최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨 검사)를 한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨 검사)를 받은 적이 있는 사람의 수×100
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(10) 대사증후군 인지율

지표정의		대사증후군에 대한 내용을 들어본 사람의 분율
관련문항		1. 대사증후군에 대한 내용을 보거나 들어 본 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	대사증후군에 대한 내용을 보거나 들어본 사람의 수 × 100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(11) 심뇌혈관질환 인지율

지표정의		심뇌혈관질환에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 심뇌혈관에 대한 내용을 보거나 들어 본 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	심뇌혈관질환에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있는 사람의 수 × 100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(12) 심뇌혈관질환 예방관리수칙 인지율

지표정의		‘심뇌혈관질환 예방과 관리를 위한 9대 생활수칙’에 관한 홍보물을 본 적이 있는 사람의 비율
관련문항		1. ‘심뇌혈관질환 예방과 관리를 위한 9대 생활수칙’에 관한 홍보물(소책자, 동영상, 홍보물품)을 본 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	심뇌혈관질환에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있는 사람의 수 × 100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(13) 심뇌혈관질환 예방관리수칙 매체 경험률

지표정의		“심뇌혈관질환 예방과 관리를 위한 9대 생활수칙”에 관한 홍보물을 접한 경로
관련문항		1. “심뇌혈관질환 예방과 관리를 위한 9대 생활수칙”에 관한 홍보물(소책자, 동영상, 홍보물품)을 어떤 경로를 통해 보았습니까? 인터넷 ① 예 ② 아니오 TV,라디오, 옥외광고, 지하철 등 ① 예 ② 아니오 병의원 ① 예 ② 아니오 보건기관(보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소) ① 예 ② 아니오
산출식	분자	심뇌혈관질환에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있는 사람의 수 × 100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

4. 의료이용

(1) 연간 미충족의료율

지표정의		최근 1년 동안 필요한 의료서비스를 받지 못한 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 1년 동안</u> 본인이 병원(치과 미포함)에 가고 싶을 때, 가지 못한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

5. 사고 및 중독

(1) 연간 사고 및 중독 경험률

지표정의		최근 1년 동안 병원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독을 경험한 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 1년 동안</u> 병원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까? ※ 음식물 섭취로 인한 식중독은 제외 ① 예 → □회 ② 아니오
산출식	분자	연간 사고 및 중독 경험자 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

6. 활동제한 및 삶의 질

(1) 양호한 주관적 건강수준 인지율

지표정의		주관적 건강수준을 “매우 좋음” 또는 “좋음”이라고 응답한 사람의 분율
관련문항		1. 평소에 본인의 건강은 어떻다고 생각합니까? ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨
산출식	분자	주관적 건강수준을 “매우 좋음” 혹은 “좋음”에 응답한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

7. 보건기관 이용

(1) 연간 보건기관 이용률

지표정의		최근 1년 동안 보건기관을 이용한 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소를 이용한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소를 이용한 적이 있는 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

8. 심폐소생술

(1) 심폐소생술 인지도

지표정의		심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 사람의 분율
관련문항		1. 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있는 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		2년

(2) 심폐소생술 교육경험률

지표정의		최근 2년 동안 심폐소생술 교육을 받은 사람의 분율
관련문항		1. 심폐소생술 교육을 받은 경험이 있습니까? ① 최근 2년간 교육을 받은 적이 있다. ② 과거에는 있었지만, 최근 2년간 없다. ③ 교육을 받은 적이 없다.
산출식	분자	최근 2년 동안 심폐소생술 교육을 받은 사람의 수 × 100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		4년

9. 가구조사

(1) 식품 안정성 확보율

지표정의		최근 1년 동안 가구 식생활 형편을 물었을 때 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었거나 혹은 충분한 양이지만 다양하지 못한 음식을 먹은 사람의 분율
관련문항		1. 다음 중 최근 1년 동안 귀댁의 식생활 형편을 가장 잘 나타낸 것은 어느 것입니까? ① 우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다 ② 우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다 ③ 경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다 ④ 경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다
산출식	분자	“우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다” 혹은 “우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다”에 응답한 가구의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 치매환자 가족 가구율

지표정의		귀 가족 중에 의사로부터 치매를 진단받은 환자가 있는 가구의 분율
관련문항		1. 귀 가족 중에 의사로부터 치매를 진단받은 환자가 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	가족 중에 의사로부터 치매를 진단받은 환자가 있는 응답가구의 수×100
	분모	조사대상 가구 수
단위		%
조사주기		1년

제 4 부 부록

IV. 2008-2018 산출지표



2008-2018 산출지표

1. 흡연

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
평생흡연율	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
흡연시작연령 ¹⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
현재흡연율	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
매일흡연자의 하루 평균 흡연량	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
현재흡연자의 1개월 내 금연계획률	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
현재흡연자의 금연시도율	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
과거흡연자의 금연기간	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률 ²⁾	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○
현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률 ³⁾	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○
현재비흡연자의 공공장소 간접흡연 노출률 ⁴⁾	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
연간 금연캠페인 경험률	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	-
연간 금연교육 경험률	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	-
현재흡연자의 금연교육 경험률	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	-
금연구역 인지율	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
현재흡연자의 금연구역 내 흡연 경험률	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
평생 전자담배 사용 경험률	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
현재 전자담배 사용 경험률	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
평생 다른 담배 제품 사용 경험률	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○
현재 다른 담배 제품 사용 경험률	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○
총계	8	10	10	13	8	13	11	19	11	17	13

1) '08년 지표명: 처음 흡연경험연령

2) '08년 지표명: 가정 내 간접흡연 노출률, '10-'13년 지표명: 가정실내 간접흡연 노출률

3) '09-'14년 지표명: 직장실내 간접흡연 노출률

4) '11-'13년 지표명: 공공장소 간접흡연 노출률

2. 음주

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
평생음주율	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
음주시작연령 ⁵⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
연간음주율	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
월간음주율	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
고위험음주율(연간음주자의 고위험음주율)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
전체 고위험음주율	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
연간 음주폐해 경험률	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
연간 절주 또는 금주시도율	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
총계	5	6	6	6	6	6	8	8	8	8	7

3. 안전의식

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
운전자석 안전벨트 착용률 ⁶⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
버스 안전벨트 착용률	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이) ⁷⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
연간 음주운전차량 동승경험률 ⁸⁾	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
오토바이 헬멧 착용률	-	○	○	○	-	○	○	-	○	-	○
자전거 헬멧 착용률	-	○	○	○	-	○	○	-	○	-	○
연간 자전거 음주운전 경험률	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
총계	3	5	6	6	4	6	9	7	9	7	9

5) '08년 지표명: 처음 음주경험연령

6) '08-'16년 지표명: 운전 시 안전벨트 착용률

7) '08년 지표명: 연간 음주운전 경험률(자동차, 오토바이)

8) '14년 지표명: 연간 자동차 음주운전차량 동승률

4. 운동 및 신체활동

산출지표	년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
격렬한 신체활동 실천율		-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
중등도 신체활동 실천율		-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
중등도 이상 신체활동 실천율		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
걷기 실천율 ⁹⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
근력운동 실천율		-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
유연성운동 실천 빈도		-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
주중 여가시간에 앉아서 보내는 시간		-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
주말 여가시간에 앉아서 보내는 시간		-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
지역사회 내 운동시설 접근율		○	○	○	-	○	-	○	-	○	-	○
총계		3	5	5	8	5	8	5	8	5	8	2

5. 식생활

산출지표	년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
아침식사빈도 ¹⁰⁾		-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
아침결식 예방인구비율		-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
저염선택율		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
영양표시 인지율		-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
영양표시 독해율 ¹¹⁾		-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
영양표시 활용율		-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
총계		1	2	2	4	4	4	6	6	6	6	5

6. 비만 및 체중조절

산출지표	년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
비만율(자가보고) ¹²⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
비만율(실제계측)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
비만도 분포		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
주관적 비만인지율		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
연간 체중조절 시도율		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
총계		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5

9) '08년 지표명: 걷기운동 실천율

10) '11-'14년 지표명: 아침식사 섭취빈도

11) '09-'13년 지표명: 가공식품 선택 시 영양표시 이용률

12) '08년 지표명: 비만인구율

7. 구강건강

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
저작불편호소율(65세 이상)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
틀니 이용 행태(50세 이상)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
주관적 틀니 필요 인지율(50세 이상)	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
어제 아침식사 후 칫솔질 실천율	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
어제 점심식사 후 칫솔질 실천율	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
어제 저녁식사 후 칫솔질 실천율	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
어제 잠자기 전 칫솔질 실천율	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
연간 구강검진 수진율	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
연간 스케일링 경험률	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
연간 치과진료 미치료율	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○
치과진료 미치료자의 미치료 이유 ¹³⁾	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○
주관적 잇몸 건강 인지율	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
총계	7	8	6	10	8	10	11	13	11	13	8

13) '14년 지표명: 치과진료 미치료자의 미치료 이유

8. 정신건강

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
하루 평균 수면시간	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
스트레스 인지율 ¹⁴⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
스트레스로 인한 정신상담률	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
우울감 경험률	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
우울증상으로 인한 정신상담률	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
자살생각률	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-
자살생각으로 인한 정신상담률	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-
자살시도율	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-
자살시도로 인한 정신상담률	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-
자살생각행동 원인	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
인터넷, 게임(오락), 스마트폰일상생활지장경험빈도	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-
인터넷, 게임(오락), 스마트폰의 지나친 사용에 대한 지적 경험률	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-
우울증상유병률	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
정신문제 상담경험률 ¹⁵⁾	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
치매상담 콜센터 인지율	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
치매상담 콜센터 이용률	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
치매상담 콜센터 미이용 이유	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
인지장애 경험률	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
인지장애로 인한 일상생활 지장률	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
인지장애로 인한 도움 필요율	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
일상생활 도움 수혜율	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
인지장애로 인한 사회생활 지장률	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
인지장애 상담률	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
연간 치매선별검사 수진율	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
치매선별검사 장소	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
총계	4	5	5	5	5	11	5	5	5	14	18

14) '08년 지표명: 주관적 스트레스 인지율

15) '08년 지표명: 우울장애로 인한 상담 경험률

9. 예방접종 및 검진

산출지표	년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
연간 인플루엔자 예방접종률		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
건강검진 수진율		○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	-
건강검진 사후 관리 상담률		-	○	○	-	○	-	○	-	○	-	-
건강검진 미수진 이유		-	○	○	-	○	-	○	-	○	-	-
암 검진율		○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	-
암 검진 사후 관리 상담률		-	○	○	-	○	-	○	-	○	-	-
암 검진 미수검 이유		-	○	○	-	○	-	○	-	○	-	-
연간 인플루엔자 예방접종 횟수		-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
계절별 인플루엔자 예방접종 경험률		-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
연간 인플루엔자 예방접종 장소		-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
총계		3	7	7	1	7	1	7	3	7	6	1

10. 이환

산출지표	년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
[이환]												
만성·급성질환 및 사고중독 경험률 ¹⁶⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
만성·급성질환 및 사고중독 경험일수 ¹⁷⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
[고혈압]												
고혈압 진단 경험률 ¹⁸⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
고혈압 최초 진단 시기		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
본인 인지 혈압조절률		-	-	○	○	○	○	○	-	○	-	○
고혈압 현재치료율		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
고혈압 진단 경험자의 치료율 ¹⁹⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
고혈압 관리교육 이수율		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
고혈압 관리교육 장소		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
혈압수치 인지율 ²⁰⁾		-	-	-	○	-	○	○	-	○	○	○

16) '08-'10년 영역: 활동제한 및 삶의 질

17) '08-'10년 영역: 활동제한 및 삶의 질

18) '08년 지표명: 고혈압 평생 의사진단 유병률, '09-'16년 지표명: 고혈압 평생 의사진단 경험률

19) '08년 지표명: 혈압조절약의 정기적 복용률 '09-'16년 지표명: 고혈압 약물치료율

20) '11-'16년 지표명: 혈압 인지율

21) '08년 지표명: 당뇨병 평생 의사진단 유병률, '09-'16년 지표명: 당뇨병 평생 의사진단 경험률

22) '08-'16년 지표명: 당뇨병 약물치료율

23) '08년 지표명: 당뇨병 관리형태(혈당관리방법)

24) '11-'16년 지표명: 혈당 인지율

25) '08년 지표명: 고지혈증 평생 의사진단 유병률, '09-'10년 지표명: 고지혈증 평생 의사진단 경험률, '11-'16년 지표명: 이상지질혈증(고지혈증 포함) 평생 의사진단 경험률

26) '08년 지표명: 골관절염 평생 의사진단 유병률, '09-'16년 지표명: 관절염 평생 의사진단 경험률

27) '08-'16년 지표명: 백내장 평생 의사진단 경험률

산출지표	년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
[당뇨병]												
당뇨병 진단 경험률 ²¹⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
당뇨병 최초 진단 시기		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
본인 인지 혈당조절률		-	-	○	○	○	○	○	-	○	-	○
당뇨병 현재치료율		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
당뇨병 진단 경험자의 치료율 ²²⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
당뇨병 치료방법 ²³⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
당뇨병 관리교육 이수율		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
당뇨병 관리교육 장소		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
연간 당뇨병 안정혈합병증검사(안저검사) 수진율		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
연간 당뇨병 산장질환 합병증검사(미세단백뇨검사) 수진율		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
혈당수치 인지율 ²⁴⁾		-	-	-	○	-	○	○	-	○	○	○
당화혈색소 인지율		-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
당화혈색소 검사 횟수		-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
[이상지질혈증(고지혈증 포함)]												
이상지질혈증(고지혈증 포함) 진단 경험률 ²⁵⁾		-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
이상지질혈증(고지혈증 포함) 현재치료율		-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
이상지질혈증(고지혈증 포함) 약물치료율		-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
[뇌졸중(중풍)]												
뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율		-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
뇌졸중(중풍) 증상 대처 방법		-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
[심근경색증]												
심근경색증 조기증상 인지율		-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
심근경색증 증상 대처 방법		-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
[관절염]												
관절염 진단 경험률 ²⁶⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
관절염 현재치료율		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
관절염 관리교육 이수율		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
관절염 관리교육 장소		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
[백내장]												
백내장 진단 경험률 ²⁷⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
백내장 현재치료율		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
총계		21	21	23	28	26	28	30	26	30	32	22

11. 의료이용

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
연간 필요의료서비스 미치료율 ²⁸⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
필요의료서비스 미치료 이유	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
총계	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2

12. 사고 및 중독

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
연간 사고 및 중독 경험률 ²⁹⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
연간 사고 및 중독 건수율 ³⁰⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
연간 낙상 경험률	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
연간 낙상 건수율	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
연간 낙상 치료 경험률	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
장소별 낙상 분포	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-
원인별 낙상 분포	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-
계절별 사고 및 중독 경험률	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	○
사고 및 중독 원인	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	○
주 치료처별 사고 및 중독 분포	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	○
의도성 및 비의도성 사고분포	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-	○
총계	5	6	6	6	2	6	6	5	2	7	6

13. 활동제한 및 삶의 질

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
양호한 주관적 건강수준 인지율 ³¹⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
삶의 질 지수(EQ-5D Index)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
월간 침상와병 경험률	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	-
월간 침상와병 일수	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	-
월간 결근결석 경험률	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	-
월간 결근결석 일수	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	-
행복감 지수	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
총계	6	6	6	7	6	7	2	7	2	7	2

28) '10년 치과포함 미치료율

29) '08년 지표명: 사고중독 발생률

30) '08년 지표명: 연간 사고중독발생 건수율

14. 보건기관 이용

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
연간 보건기관 이용률	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
총계	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

15. 사회 물리적 환경

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
지역의 사회물리적 환경에 대한 긍정적 태도율	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
사회적 연결망(친척, 이웃, 친구)	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
사회활동 참여율	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
현재 체감 환경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
광역 시·도 거주기간	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
시·군·구 거주기간	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
총계	-	-	-	5	2	5	2	5	2	5	3

16. 개인위생

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
손 씻기 감염병 예방 인지도	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	-
식사 전 손 씻기 실천율	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	-
화장실 다녀온 후 손 씻기 실천율	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	-
외출 후 손 씻기 실천율	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	-
비누, 손 세정제 사용률	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	-
연간 손 씻기 교육 및 홍보 경험률	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	-
총계	-	-	-	-	-	6	-	6	-	6	-

31) '09-'11년 지표명: 주관적 건강수준 인지도

17. 심폐소생술

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
심폐소생술 인지율	-	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○
심폐소생술 교육 경험률	-	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○
심폐소생술 마네킹 실습 경험률	-	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○
심폐소생술 시행능력률	-	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○
총계	-	-	-	-	4	-	4	-	4	-	4

18. 여성건강

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
최근 출산 경험률	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
모유수유 경험률	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
총계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

19. 가구조사

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
식품 안정성 확보율 ³²⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
치매환자 가족 가구율	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
치매환자 가족관계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
치매환자 동거 가구율	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
비동거 치매환자의 거주상태	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
시설거주 치매환자 비용부담자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
시설 외 거주 치매환자의 돌봄자율	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
시설 외 거주 치매환자의 돌봄자의 관계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
치매 질병 부담 이유	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
총계	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	9

32) '09-'13년 영역: 개인조사 「식생활」

참고문헌

1. 질병관리본부. 삶의 질 조사도구(EQ-5D)의 질 가중치 추정 연구 보고서. 2007.
2. 보건복지부. 질병관리본부. 2011년 국민건강통계, 국민건강영양조사 제 5기 2차년도(2011). 2012.
3. 보건복지부. 질병관리본부. 2012년 국민건강통계, 국민건강영양조사 제 5기 3차년도(2012). 2013.
4. 배상수, 보건사업기획(제2판). 계축문화사. 2013.

참여연구진

지역책임교수 고광필 가천대학교

지역부책임교수 최윤형 가천대학교

지역담당연구원 이진영 가천대학교

조사관리담당관 이경희 연수구보건소

지역조사원 김연수 연수구보건소

김용순 연수구보건소

문효숙 연수구보건소

송성부 연수구보건소

이은미 연수구보건소

2018년 인천광역시 연수구 지역사회 건강통계

발 행 : 2019. 3.

발 행 인 : 노 순 호(인천광역시 연수구 보건소장)

편 집 인 : 고 광 필(가천대학교)

이 경 희(인천광역시 연수구 보건소)

발 행 처 : 기 관 명 인천광역시 연수구 보건소

홈페이지 <http://www.yeonsu.go.kr/clinic/>

주 소 (21915)인천광역시 연수구 함박외로 13

전화번호 (032) 749-8000

팩 스 (032) 749-8009

이 책은 인천광역시 연수구 보건소에 소유권이 있습니다. 인천광역시 연수구 보건소
승인 없이 상업적인 목적으로 사용하거나 판매할 수 없습니다.